

ΦΥΛΗ ΣΦΑΚΙΩΝ



ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ ΚΑΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Το πρόβατο φυλής Σφακίων ανήκει στα λεπτόουρα αναμικτόμαλλα πρόβατα. Αποτελεί κλάδο της φυλής Τσάκελ της Ν.Α. Ευρώπης, τα οποία κάτω από την επίδραση των παραγόντων του περιβάλλοντος, της διατροφής καθώς και των ανεξέλεγκτων διασταυρώσεων δημιούργησαν δύο βασικούς τύπους, τον ορεινό και τον πεδινό. Το πρόβατο της φυλής Σφακίων περιλαμβάνεται στον ορεινό τύπο. Εκτρέφεται σε ένα αριθμό 66.000 ζώων από 480 εκτροφείς κυρίως στον Νομό Χανίων, σε ποιμνία μεγαλύτερα των 150 προβατινών.

Το πρόβατο της φυλής Σφακίων είναι λιτοδίαιτο και έχει προσαρμοστεί καλά στο νησί της Κρήτης αξιοποιώντας με τον καλύτερο δυνατό τρόπο την φυσική βλάστηση των υποβαθμισμένων βοσκοτόπων του νησιού.

ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΚΟΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΕΣ

Το πρόβατο Σφακίων παρουσιάζει μεγάλη ομοιομορφία στο χρωματισμό του τριχώματος, είναι λευκό με μικρούς μαύρους δακτυλίους γύρω από τους οφθαλμούς και μαύρες κηλίδες στο κάτω μέρος των άκρων. Το ποσοστό των μαύρων προβατινών είναι πολύ μικρό. Η κεφαλή του είναι επιμήκης με κυρτή μύτη.

Τα αυτιά του είναι μετρίου μεγέθους και οριζόντια και η ουρά του έχει μήκος 21 εκατ. Ο μαστός παρουσιάζει κατά κανόνα κανονική διάπλαση και οι θηλές έχουν οριζόντια ή διαγώνια διεύθυνση και σχετικά μικρό μήκος.

Είναι μικρόσωμο πρόβατο και τα σωματικά βάρη των αρσενικών κυμαίνονται στα 61 κιλά ενώ των θηλυκών στα 41 κιλά.

Η φυλή ανήκει στα αναμικτόμαλλα πρόβατα και η κεφαλή, η κάτω κοιλιακή χώρα και τα κάτω άκρα δεν καλύπτονται από μαλλί.

ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ

Η φυλή είναι σχετικά πρόιμη και οι τοκετοί πραγματοποιούνται ως επί το πλείστον τους μήνες Νοέμβριο και Δεκέμβριο. Τα κριάρια χρησιμοποιούνται συνήθως για συζεύξεις από την ηλικία των 18 μηνών ενώ οι αμνάδες ξεκινούν την αναπαραγωγική τους ζωή σε ηλικία 12 μηνών.

Η πολυδυμία ανέρχεται σε 1,4 αρνιά ανά τοκετό.

ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ

Ο απογαλακτισμός των αρνιών γίνεται συνήθως στην ηλικία των 70 ημερών και η απόδοση σε σφάγιο είναι της τάξης των 9-12 κιλών, ενώ εκείνα που σφάζονται στην ηλικία των 8 μηνών δίνουν σφάγια βάρους 17-20 κιλά.

Η γαλακτοπαραγωγή παρουσιάζει μεγάλες διακυμάνσεις και επηρεάζεται από την διατροφή, την ηλικία των προβατίνων, την εποχή των τοκετών και την διάρκεια αρμέγματος. Ο μέσος όρος γαλ/γης ανέρχεται σε 158 κιλά με διάρκεια αρμέγματος 185 ημέρες.

ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Η διατροφή των προβάτων στηρίζεται στις βοσκές των ημιορεινών και ορεινών εκτάσεων, κυρίως των Λευκών Ορέων, οι οποίες δεν είναι ιδιαίτερα πλούσιες σε φυσική βλάστηση. Έτσι κατά την περίοδο των τοκετών και της γαλουχίας η οποία συμπίπτει με την περίοδο του χειμώνα χορηγούνται συμπληρωματικές ζωοτροφές.