



Θεσσαλονίκη 21 Ιουνίου 2013
Αρ. Πρωτ.: 10323

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ
ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ Μ.Ε. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ ΚΑΙ
ΦΥΤΟΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

ΠΡΟΣ:

Ταχ. Διεύθυνση ✉ : Αλ. Παπαναστασίου 63
544 53 Θεσσαλονίκη
Πληροφορίες ✉ : Α. ΒΑΪΤΣΟΠΟΥΛΟΣ
Π. ΚΟΤΣΑΜΠΑΣΗΣ
Τηλέφωνο ☎ : 2310-984185, 984189
Telefax : 2310-914303
e-mail : u12862@minagric.gr
u12846@minagric.gr

Όπως Π.Δ.

**1^ο ΔΕΛΤΙΟ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΩΝ
ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΤΗ ΒΑΜΒΑΚΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΤΗΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
ΕΝΟΤΗΤΑΣ (ΜΕ) ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ**

1. Στόχοι

- 1.1 Το παρόν δελτίο γεωργικών προειδοποιήσεων απευθύνεται στους βαμβakoπαραγωγούς με στόχο την αποτελεσματική φυτοπροστασία στον πραγματικό καλλιεργητικό χρόνο.
- 1.2 Αφορά το διάστημα μέχρι την εμφάνιση πρώτων χτενιών και την οργάνωση αποτελεσματικής αυτοάμυνας κάθε βαμβakoφυτείας για όλη την καλλιεργητική περίοδο.
- 1.3 Ο βαμβakoπαραγωγός απαιτείται να παρακολουθεί τακτικά κάθε βαμβakoχώραφο και σύμφωνα με τα πραγματικά δεδομένα, να εφαρμόζει τις συγκεκριμένες καλλιεργητικές πρακτικές φυτοπροστασίας και στο σωστό χρόνο, όπως παρακάτω περιγράφονται κατά περίπτωση.

2. Διαπιστώσεις

- 2.1 Οι βαμβakoφυτείες βρίσκονται στο πρώτο στάδιο ανάπτυξης «Εναρξη φυτρώματος», από 6 έως 10 φύλλα. Το ύψος των φυτών είναι περίπου στα 20 cm και η πυκνότητα είναι στα 16 φυτά / m επί της γραμμής.
- 2.2 Από τα έντομα που προσβάλλουν το νεαρό βαμβάκι διαπιστώθηκαν μικρές πληθυσμιακές πυκνότητες τετρανύχου.

3. Συστάσεις –καλλιεργητικές πρακτικές

Στο στάδιο που βρίσκονται οι βαμβakoφυτείες συνίσταται γενική δόση άρδευσης 35 κ.μ. νερό /στρέμμα. Ιδιαίτερα, σε γόνιμα εδάφη με ύψος φυτών άνω των 35 εκατοστών η συνιστώμενη άρδευση είναι περίπου 25 κ.μ. νερού / στρέμμα έτσι ώστε να υπάρξει ισορροπημένη προοδευτική ανάπτυξη των φυτών.

4. Εφαρμογή ψεκασμών με Φυτοπροστατευτικά Προϊόντα.

Δεν απαιτείται χημική επέμβαση με εντομοκτόνα, η οποία πρέπει και κατά κανόνα να αποφεύγεται αυτή τη περίοδο γιατί αρχίζουν να εγκαθίστανται και αναπτύσσονται τα ωφέλιμα έντομα στα βαμβakoφύτα.

Παρά ταύτα πρέπει οι βαμβakoπαραγωγοί να παρακολουθούν τα φυτά 1-2 φορές την εβδομάδα για θρίπες, αφίδες και τετρανύχο και αν διαπιστωθούν υψηλές πυκνότητες

πληθυσμών και ζημιές, όπως συστροφές φύλλων, κατσάρωμα, φυλλόπτωση, σχισίματα κ.λ.π., να ενημερώσουν την αρμόδια διεύθυνση με σκοπό να δοθούν περαιτέρω οδηγίες.

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ

ΙΩΑΝΝΑ ΛΥΣΑΦΙΔΟΥ - ΔΙΓΚΑ