

ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ & ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΩΝ
ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ & ΦΥΤΟΪΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

Ταχ. Δ/ση: Καστοριάς 32Α, 71307 Ηράκλειο

Τηλ: 2810.282248, Fax: 2810.225616

Email: pkpfiraklio@minagric.gr

Τα δελτία αναρτώνται στην ιστοσελίδα του υπουργείου
www.minagric.gr και αποστέλλονται μέσω e-mail σε κάθε
ενδιαφερόμενο με αίτημα στο agrodeltiokriti@gmail.com



Εφαρμόζετε πιστά τις οδηγίες χρήσης των φαρμάκων.
Έτσι προστατεύετε εσείς, ο καταναλωτής και το περιβάλλον.

ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΕΣΠΕΡΙΔΟΕΙΔΩΝ

Πληροφορίες: MSc Μ. Ζ. Ροδιτάκη

4.

Παρατηρήσεις υπαίθρου: Ρ. Οικονομάκη, Δ. Τσαγκαράκης, Μ. Ροδιτάκη.



Διαλευρώδης: Αυγά και προνύμφες 1^{ου} και 2^{ου} σταδίου ευαίσθητες στη χημική καταπολέμηση.



Διαλευρώδης: Ανήλικα προνυμφικά στάδια στην κάτω επιφάνεια του φύλλου.



Διαλευρώδης: Καπνιά καλύπτει φύλλα και βλαστούς.



Ανθοτρήτης: Προνύμφη προσβάλλει νεαρό λεμόνι.

<p>ΔΙΑΛΕΥΡΩΔΗΣ (<i>Dialeurodes citri</i>)</p> <p><i>Οδηγίες:</i></p>	<p>Παρατηρούνται νέες προσβολές σε δέντρα με πλούσια τρυφερή βλάστηση, πυκνό φύλλωμα που βρίσκονται σε περιβάλλον με μεγάλη σχετική υγρασία.</p> <p>Τα μελιτώδη εκκρίματα των αλευρωδών ευνοούν την ανάπτυξη μυκήτων της καπνιάς και ρυπαίνουν τα δέντρα υποβαθμίζοντας εμπορικά τους καρπούς.</p> <p>– Οι προσβολές περιορίζονται σημαντικά με καλλιεργητικούς χειρισμούς όπως αφαίρεση και άμεση απομάκρυνση των λείμαργων βλαστών, ισορροπημένες αρδεύσεις και περιορισμένες αζωτούχες λιπάνσεις.</p> <p>– Στα προσβεβλημένα δέντρα συστήνεται επέμβαση με εγκεκριμένα σκευάσματα στο διάστημα: 12-15 Σεπτεμβρίου. <u>Για να είναι αποτελεσματική η καταπολέμηση πρέπει να γίνεται καλή διαβροχή του εσωτερικού των δέντρων διότι μεγάλοι πληθυσμοί αναπτύσσονται στα σκιερά μέρη και στην κάτω επιφάνεια των φύλλων.</u></p>
<p>ΑΝΘΟΤΡΗΤΗΣ : (<i>Prays citri</i>)</p> <p>Λεμονιές</p> <p><i>Διαπιστώσεις:</i></p> <p><i>Οδηγίες:</i></p>	<p>Προσβάλλει κατά προτίμηση τις λεμονιές σε περιοχές με μεγάλη σχετική υγρασία. Οι λεμονιές ανθίζουν επανειλημμένα διευκολύνοντας την ανάπτυξη και τη διαβίωση του εντόμου. Οι προνύμφες προκαλούν ζημιές στα κλειστά άνθη και στους νεαρούς καρπούς. Ανοίγουν οπές και στοές και καταστρέφουν το εσωτερικό συνδέοντας με νημάτια τα προσβεβλημένα μέρη.</p> <p>Παρατηρήσεις φερομονικής παγίδευσης ακμαίων από την ΔΑΟΚ Χανίων δείχνουν αύξηση του πληθυσμού στην Π.Ε. Χανίων.</p> <p>– <u>Ελέγχετε τα άνθη και τους νεαρούς καρπούς στις δίφορες λεμονιές που έχουν ικανοποιητική για την εποχή ανθοφορία</u>. Συστήνεται αυτή την περίοδο χημική καταπολέμηση εάν τα προσβεβλημένα άνθη είναι σε ποσοστό μεγαλύτερο από 50% ή τα προσβεβλημένα καρπίδια πάνω από 3%.</p>

* **ΠΡΟΣΟΧΗ:** Χρησιμοποιείτε μόνο φυτοπροστατευτικά σκευάσματα εγκεκριμένα για την καλλιέργεια. Στην ιστοσελίδα: http://www.minagric.gr/syspest/syspest_ENEMY_crops.aspx βρίσκεται κατάλογος εγκεκριμένων εντομοκτόνων και ακαρεοκτόνων των εσπεριδοειδών ο οποίος δέχεται τροποποιήσεις καθ' όλη τη διάρκεια της χρονιάς. Διαβάζετε και ακολουθείτε τις οδηγίες της ετικέτας κατά την εφαρμογή των σκευασμάτων. Τηρείτε αυστηρά τον χρόνο μεταξύ τελευταίας επέμβασης και συγκομιδής.

- Μια επέμβαση πραγματοποιείται μόνο όταν ο επιβλαβής οργανισμός προκαλεί οικονομική ζημιά στην καλλιέργεια. Οι αλόγιστοι ψεκασμοί εξοντώνουν τα ωφέλιμα και δημιουργούν αντιστοιχα εξάρσεις βλαβερών εντόμων.
- Εφαρμόζετε την πρακτική των αφέκαστων ζωνών για τη διατήρηση των ωφέλιμων εντόμων. Οι ζώνες αυτές αποτελούν το 15-20 % του συνόλου των δέντρων της καλλιέργειας και εναλλάσσονται μέσα στον οπωρώνα από χρονιά σε χρονιά.
- Για την προστασία των υδρόβιων οργανισμών αφήνετε μια αφέκαστη ζώνη προστασίας 21 μέτρων από τα επιφανειακά ύδατα.

Ηράκλειο 9 Σεπτεμβρίου 2019

Η Προϊσταμένη Τμήματος

Κληρονόμου Ευφροσύνη