

ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΗΠΕΙΡΟΥ &
Δ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΤΜΗΜΑ ΠΕΡ/ΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΩΝ &
ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

Οδός: Πανεπιστημίου (τέρμα) Τ.Κ.: 451 10 Ιωάννινα
Τηλ.: 26510 44055 – 26510 40707. Fax: 26510 41902.




ΠΑΤΑΤΑ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Βάντζιος Κωνσταντίνος

Πατάτα 4: 4/4/2017

Ασθένεια	Περωνόσπορος Phytophthora infestans
Περιοχή	ΚΕΡΚΥΡΑ –Σταθμός Λιβάδι Ρόπα
	Πατάτα πρώιμη: Έξοδος βλαστών από το έδαφος στις 1/2/2017
Περιοχή	ΠΡΕΒΕΖΑ - Σταθμός ΚΕΓΕ ΠΡΕΒΕΖΑ
	Πατάτα πρώιμη: Έξοδος βλαστών από το έδαφος στις 3/3/2017



Στην περιοχή της **Πρέβεζας** από 22/3 έως και 27/3 οι συνθήκες διύγρανσης φύλλου για μεγάλα διαστήματα με ταυτόχρονα σχετικά υψηλές θερμοκρασίες παρέμειναν εξαιρετικά ευνοϊκές για εκδήλωση μολύνσεων όπως ευνοϊκές ήταν και στο διάστημα πριν τις 22/3 (Βλ ΔΓΠ 3/21-3-2017).

Από 28/3 τα διαστήματα με συνθήκες υψηλής υγρασίας περιορίστηκαν σε 2 δωδεκάωρα κατά το βράδυ μεταξύ 31/3&1/4 και 1/4&2/4.

Η βροχή το τελευταίο 24-ωρο ανήλθε συνολικά σε 14,8 mm, πολύ κοντά στο να θεωρείται ότι κάθε σκεύασμα επαφής που έχει εφαρμοστεί κατά το προηγούμενο διά-

στημα έχει ξεπλυθεί.

Αντίστοιχη βελτίωση των συνθηκών που επηρεάζουν τον περονόσπορο, σημειώθηκε και στην **Κέρκυρα** στο διάστημα από 28/3 μέχρι και τις 3/4. Το τελευταίο 24-ωρο όμως η **επιδείνωση του καιρού κρατά τα φύλλα πρακτικά συνεχώς βρεγμένα**. Η συνολική βροχή από 3/4 στο Λιβάδι Ρόπα ανήλθε στα 7,2 mm.





Σχηματικά παραθέτουμε παρακάτω την πίεση προσβολής για τις δύο περιοχές από το μοντέλο Ullrich-Schroedter. Παρατηρούμε την πρόσκαιρη μείωση της πίεσης προσβολής μόλις για 2 ημέρες στην Πρέβεζα και την λίγο μεγαλύτερης διάρκειας βελτίωση για την Κέρκυρα.

Η προστασία των πατατοκαλλιεργειών πρέπει να παραμείνει στο πρόγραμμα επαναλήψεων με ημερολογιακό τρόπο (δηλαδή επανάληψη προστατευτικού σκευάσματος στην λήξη της διάρκειάς δράσης του προηγούμενου σκευάσματος ήτοι συνήθως 7 ημέρες).

Σε καλλιέργειες που βρέθηκαν «μη καλυμμένες» το τελευταίο διάστημα των βροχοπτώσεων (δηλαδή ψεκασμένες πριν από τις 27/3) πρέπει να γίνει άμεσα εφαρμογή

θεραπευτικού σκευάσματος.



Συμβουλευτείτε την λίστα φαρμάκων, που έχει αποσταλεί με το ΔΓΠ Πατάτας 2/14-3-2017, για την εκλογή κατάλληλων σκευασμάτων για την διαχείριση και την αποφυγή ανάπτυξης ανθεκτικότητας του περonosπόρου στα χρησιμοποιούμενα φάρμακα. Τα διασυστηματικά και διεισδυτικά σκευάσματα είναι καταλληλότερα για την εποχή της έντονης παραγωγής φύλλων και βλαστών.

Ο Αναπληρωτής Προϊστάμενος
του Π.Κ.Π.Φ. και Π.Ε. Ιωαννίνων κ.α
Δρ. Χρήστος Ρούκος
Γεωπόνος

Το δελτίο παράγεται με βάση τοπικές παρατηρήσεις και γενικά μετεωρολογικά δεδομένα. Παρέχει μια τάση της περιφερειακής κατάστασης και δεν μπορεί να μεταφερθεί ως έχει σε κάθε αγροτεμάχιο. Οι παραγωγοί καλούνται συνεπώς, για τις αποφάσεις που λαμβάνουν να ενσωματώνουν τις δικές τους παρατηρήσεις στηριζόμενοι στα ενημερωτικά δελτία.

Όλα τα δελτία μας υπάρχουν στο διαδίκτυο: <http://www.minagric.gr/index.php/el/for-farmer-2/agricultural-warnings/>