

ΔΡΑΣΤΙΚΗ ΟΥΣΙΑ	Γλοιοσπόρι	Σηψιρριζία(Armillaria mellea)	Καρκίνωση	Κυκλοκόνιο	ΜΕΓΙΣΤΟΣ ΑΡ. ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ /ΕΤΟΣ	ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΠΕΜΒΑΣΗ ΠΡΙΝ ΤΗ ΣΥΓΚΟΜΙΔΗ (ΗΜΕΡΕΣ)
Azoxystrobin+ difenoconazole	✓			✓	1	Επιτραπέζιες & ελαιοποιήσιμες(εφαρμογή έως και πριν την άνθηση)
Bacillus amyloliquefaciens	✓				1/6	Από την έναρξη της άνθησης μέχρι και την πλήρη ωρίμανση.
Bordaeux mixture	✓		✓	✓	2	21
Copper hydroxide	✓		✓	✓	2/3	14/15/21
Copper oxychloride	✓		✓	✓	2	21
Copper oxychloride + Copper hydroxide	✓			✓	2	Πριν την ανθοφορία ή μετά τη συγκομιδή.
Copper oxide	✓			✓	2	21
Difenoconazole	✓			✓	2	30
Dodine	✓			✓	2	7 Επιτραπέζιες & ελαιοποιήσιμες
Eugenol +thymol +geraniol	✓				2	7
Kresoxym methyl				✓	3(ελαιοπ/μες) 2(επιτραπέζιες)	Ελαιοποιήσιμες 30 Επιτραπέζιες πριν την άνθηση
Kresoxym methyl				✓	2	Πριν την άνθηση
Kresoxym methyl + Difenoconazole	✓			✓	2	Πριν την άνθηση
Pyraclostrobin	✓			✓	3(επιτραπέζιες) 2(ελαιοπ/μες)	105
Tebuconazole				✓	1	Επιτραπέζιες & ελαιοποιήσιμες(εφαρμογή έως και πριν την άνθηση)
Tri-basic copper sulfate	✓		✓	✓	2	21
Trichoderma		✓			2	3
Trifloxystrobin	✓			✓	2	14 (2εφαρμογές / 1μόνο κατά τη διάρκεια του φθινοπώρου)

ΔΡΑΣΤΙΚΗ ΟΥΣΙΑ	Γλοιοσπόρι ο	Σηψιρριζία(Armillaria mellea)	Καρκίνωση	Κυκλοκόνιο	ΜΕΓΙΣΤΟΣ ΑΡ. ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ /ΕΤΟΣ	ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΠΕΜΒΑΣΗ ΠΡΙΝ ΤΗ ΣΥΓΚΟΜΙΔΗ (ΗΜΕΡΕΣ)
Trifloxystrobin+tebuconazole				✓	1	Προληπτική εφαρμογή από την έναρξη της βλάστησης μέχρι πριν την άνθηση.

Ο πίνακας είναι ενδεικτικός και υπόκειται σε τροποποιήσεις (οδηγία 91/414/Ε.Ε.)

Εφαρμόζετε πιστά τις οδηγίες χρήσης των φυτοπροστατευτικών προϊόντων

Καβάλα, Μάρτιος 2023