



Τ. Δ. : Τέρμα Αμυνταίου – Άγιος Λουκάς
 Τ. Κ. : 651 10 Τ.Θ.: 1235
 Τηλ. : 2510 600421
 Fax: 2510 600430
 E mail : miliadou@minagric.gr

Το παρόν δελτίο εκδίδεται μόνο ηλεκτρονικά σε συνεργασία με τις ΔΑΟΚ ΑΜΘ και τη ΔΑΟΚ Σερρών και το ΙΓΒ & ΦΠ

No 19/11-06-2018

Πληροφορίες : Μαρία Ηλιάδου, Στέλλα Σπύρογλου, Δημήτρης Συρόπουλος,

2^ο Τεχνικό Δελτίο Γεωργικών Προειδοποιήσεων για την μηλιά

Καρπόκαψα Μηλιάς (*Cydia pomonella*)

Διαπιστώσεις

Από την καταγραφή των συλλήψεων στις φερομονικές παγίδες, διαπιστώνουμε ότι η πτήση της 2^{ης} γενεάς του εντόμου ξεκίνησε από τις 01-06-2018 και συνεχίζεται με ανοδική πορεία.

Τα ενήλικα της 2^{ης} γενεάς ωτοκοούν κατευθείαν επάνω στους καρπούς και ανάλογα με τη σοβαρότητα της προσβολής στην περιοχή κατά τα προηγούμενα έτη, μπορεί να χρειασθεί ιδιαίτερη προσοχή για την αποφυγή των ζημιών από τα μέσα Ιουνίου και μετά.

Η γενεά αυτή διαρκεί περίπου 25 ημέρες και η νεαρή προνύμφη περιτλανάται 2-3 ημέρες επί του καρπού πριν εισχωρήσει εντός αυτού. Η περίοδος αυτή είναι η πιο αποτελεσματική για την καταπολέμησή της.



Συστάσεις

Συνιστάται να γίνει ψεκασμός τις επόμενες ημέρες, με τη χρήση κατάλληλων φυτοπροστατευτικών προϊόντων

Επανάληψη του ψεκασμού μετά από 10 -12 ημέρες περίπου και σύμφωνα πάντοτε με τις οδηγίες της ετικέτας των φυτοπροστατευτικών προϊόντων που θα χρησιμοποιηθούν.

Γενική παρατήρηση

Οι παραγωγοί θα πρέπει να τηρούν τα αναγραφόμενα στις ετικέτες έγκρισης των φυτοπροστατευτικών προϊόντων και ιδιαίτερα τον προβλεπόμενο μέγιστο αριθμό επεμβάσεων με το ίδιο εντομοκτόνο.

Οι επόμενοι ψεκασμοί θα πρέπει να γίνονται με σκευάσματα που έχουν διαφορετικό τρόπο δράσης.

Η χρήση των φυτοπροστατευτικών προϊόντων να περιορίζεται μόνο στους απαραίτητους ψεκασμούς με βάση την παρακολούθηση του εντόμου.

Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δοθεί στη χρήση των υποπροστατευτικών προϊόντων τα οποία θα πρέπει να έχουν όσο το δυνατόν λιγότερες ημέρες υπολειμματικής διάρκειας τελευταίας επέμβασης πριν τη συγκομιδή.


Συνδυασμός καλλιεργητικών μέτρων και χημικής καταπολέμησης όπου απαιτείται δίνει τα καλύτερα αποτελέσματα.

Οι ψεκασμοί πρέπει να είναι επιμελημένοι με διαβροχή όλης της φυλλικής επιφάνειας και στα ψηλά τμήματα των δένδρων.

Οι καλλιεργητές μπορούν να συμβουλευούνται για τα εγκεκριμένα φυτοπροστατευτικά προϊόντα ανά καλλιέργεια και παθογόνο στην ηλεκτρονική διεύθυνση του Υπ.Α.Α.Τ.

http://www.minagric.gr/syspest/syspest_bfuncs_crops.aspx

το δελτίο αναρτάται στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων www.minagric.gr



Η Προϊσταμένη Τμήματος

Μαρία Ηλιάδου