



- Η σωστή χρήση φυτοφαρμάκων είναι η αποτελεσματικότερη φυτοπροστασία.
- Η καλύτερη γεωργία είναι η σωστή διαχείριση της φύσης.

**ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ**  
**ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ**  
**ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ & ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ**  
**ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΩΝ**  
**ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΦΥΤΟΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΝΑΥΠΛΙΟΥ**  
Ταχ. Διεύθυνση : Παραλιακή οδός Ναυπλίου – Ν. Κίου  
Τ.Κ. 21100 Ναύπλιο  
Τηλ.: 2752026241  
Πληροφορίες: Στ. Τσόλη  
email: [stsoli@minagric.gr](mailto:stsoli@minagric.gr)

Αρ. Δελτίου 3 /12-7-21

## **ΑΜΠΕΛΙ**

### **1. ΕΥΔΕΜΙΔΑ**

**Διαπιστώσεις:** Ξεκίνησε νέα πτήση του εντόμου. Επακόλουθο των προσβολών είναι οι σήψεις.

**Οδηγίες:** Επέμβαση επιλέγοντας έναν από τους παρακάτω τρόπους:  
**Φυτ/κά προϊόντα:** Α. Άμεσα και μέχρι τις 15 Ιουλίου ψεκασμός με χρήση σκευάσματος με ωοκτόνο δράση και ρυθμιστές ανάπτυξης εντόμων.  
Β. Από 16-18 Ιουλίου ψεκασμός με τα υπόλοιπα εγκεκριμένα εντομοκτόνα.  
Είναι χρήσιμη μια ελαφριά αποφύλλωση. Η ταχύτητα των ψεκαστικών μηχανημάτων να είναι τέτοια που να επιτρέπει την καλή διασπορά του ψεκαστικού υγρού.

### **2. ΨΕΥΔΟΚΟΚΚΟΣ**

**Οδηγίες:** Συνδυασμένη καταπολέμηση με την ευδεμίδα, όπου υπάρχουν προσβολές.

### **3. ΜΥΓΑ ΜΕΣΟΓΕΙΟΥ**

**Διαπιστώσεις:** Τα τελευταία χρόνια δημιουργεί προβλήματα στις επιτραπέζιες ποικιλίες. Οι πληθυσμοί του εντόμου είναι αυξημένοι (προσβάλλει όλα σχεδόν τα φρούτα) και ο κίνδυνος προσβολών μεγάλος.

**Οδηγίες:** Για το επόμενο χρονικό διάστημα ως την συγκομιδή αμπελώνες που έχουν εμφανίσει προσβολές τα προηγούμενα χρόνια, να ελέγχονται συχνά για την έγκαιρη αντιμετώπιση.

### **4. ΩΙΔΙΟ**

**Οδηγίες:** Οι καιρικές συνθήκες ευνοούν τον μύκητα. Υπάρχουν ήδη προσβολές σε αρκετούς αμπελώνες. Κίνδυνος προσβολών για τις ρόγες υπάρχει μέχρι το στάδιο του γυαλισματος. Βλαστοί, ποδίσκοι και άξονες των σταφυλιών, είναι ευπαθείς καθ' όλη την καλλιεργητική περίοδο. Απαιτείται συστηματικός έλεγχος των αμπελώνων για τον έγκαιρο εντοπισμό προσβολών.

### **5. ΒΟΤΡΥΤΗΣ**

**Οδηγίες:** Αμπελώνες που βρίσκονται σε περιοχές με υγρασία να ελέγχονται συστηματικά.

## **6. ΞΗΡΑΝΣΗ ΡΑΧΗΣ**

**Οδηγίες:** Καλλιεργητικά μέτρα που μπορεί να επιδράσουν θετικά στην προληπτική αντιμετώπισή της:

- Βελτίωση της υφής και της γονιμότητας του εδάφους με προσθήκη οργανικής ουσίας για την καλύτερη τροφοδοσία των πρέμνων με νερό.
- Κατάλληλο κλάδεμα και βλαστολόγημα (ζωηρά πρέμνα με γρήγορα αναπτυσσόμενη βλάστηση παρουσιάζουν μεγαλύτερη ευαισθησία.
- Αποφυγή πλούσιας λίπανσης (ιδιαίτερα της καλιούχου).

Σε αμπελώνες που υπάρχει το πρόβλημα να γίνει επέμβαση με κατάλληλο σκεύασμα, η οποία να επαναληφθεί μετά από 10-15 μέρες. Να γίνεται καλή διαβροχή των σταφυλιών.

## **7 .ΟΞΙΝΗ ΣΗΨΗ**

Η ασθένεια ευνοείται από υψηλές θερμοκρασίες και υγρασία κατά τη διάρκεια της ωρίμανσης, υπερβολικό φορτίο, την ύπαρξη πληγών στις ράγες και την αύξηση του πληθυσμού της Δροσόφιλας (μύγα του ξιδιού). Η Δροσόφιλα είναι ο κύριος φορέας των παθογόνων της ασθένειας.

**Οδηγίες:**

- Βασική προϋπόθεση για την αντιμετώπιση της ασθένειας είναι η αποφυγή δημιουργίας πληγών στις ράγες. Επομένως η καταπολέμηση του ωιδίου και της ευδεμίδας, πρέπει να γίνεται με μεγάλη επιμέλεια.
- Κλάδεμα, στήριξη σε πολλά σύρματα, με σκοπό την μείωση της υγρασίας και την καλύτερη δυνατή έκθεση των σταφυλιών στον ήλιο.
- Προσοχή στις αρδεύσεις και στις λιπάνσεις, για τον έλεγχο της ζωηρότητας του πρέμνου.
- Τα χαλκούχα σκευάσματα σκληραίνουν την επιδερμίδα των ραγών.

**Σημειώσεις:**

- Στις παρακάτω ιστοσελίδες του ΥΠ.Α.Α.Τ:
- [http://www.minagric.gr/syspest/syspest\\_crops.aspx](http://www.minagric.gr/syspest/syspest_crops.aspx)
- **Εντομοκτόνα**  
[http://www.minagric.gr/syspest/SYSPEST\\_ENEMY\\_dron.aspx](http://www.minagric.gr/syspest/SYSPEST_ENEMY_dron.aspx)
- **Μυκητοκτόνα**  
[http://www.minagric.gr/syspest/syspest\\_bfuncs\\_crops.aspx](http://www.minagric.gr/syspest/syspest_bfuncs_crops.aspx)  
μπορείτε να ενημερωθείτε για τις εγκεκριμένες δραστικές ουσίες ουσίες στο αμπέλι.
- Να διαβάζετε τις οδηγίες που αναγράφονται στην ετικέτα των φυτοπροστατευτικών προϊόντων και να **τηρείτε αυστηρά το χρόνο ανάμεσα στην τελευταία επέμβαση και την συγκομιδή.**
- Χρησιμοποιείτε φυτοπροστατευτικά προϊόντα με εκλεκτική δράση για την προστασία των ωφέλιμων εντόμων.
- Τα δελτία μας αναρτώνται στην ιστοσελίδα του Υπουργείου [www.minagric.gr](http://www.minagric.gr)
- Όσοι ενδιαφέρονται να λαμβάνουν τα δελτία γεωργικών προειδοποιήσεων ηλεκτρονικά μπορούν να το δηλώσουν στην Υπηρεσία μας.

**Η ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ**

**ΣΤ. ΤΣΟΛΗ**