



- Η σωστή χρήση φυτοφαρμάκων είναι η αποτελεσματικότερη φυτοπροστασία.
- Η καλύτερη γεωργία είναι η σωστή διαχείριση της φύσης.

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ & ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΩΝ
ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΦΥΤΟΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΝΑΥΠΛΙΟΥ
Ταχ. Διεύθυνση : Παραλιακή οδός Ναυπλίου – Ν. Κίου
Τ.Κ. 21100 Ναύπλιο
Τηλ.: 2752026241

Πληροφορίες: Στ. Τσόλη
email: tsoli@minagric.gr

Αρ. Δελτίου 2 /7-7-21

ΕΣΠΕΡΙΔΟΕΙΔΗ

1.ΚΟΚΚΙΝΗ ΨΩΡΑ - ΜΥΤΙΛΟΜΟΡΦΗ ΨΩΡΑ

Διαπιστώσεις: Η έξοδος των ερπουσών είναι σε εξέλιξη.

Οδηγίες: Στους οπωρώνες που υπάρχουν προσβολές, να γίνει επέμβαση στις εξής ημερομηνίες:
α) Πρώιμες περιοχές: Άμεση επέμβαση
β) Όψιμες περιοχές: **Από 11 ως 14 Ιουλίου.**

2. ΨΕΥΔΟΚΟΚΚΟΣ

Διαπιστώσεις: Οι εκκολάψεις είναι σε εξέλιξη. Οι υπάρχοντες πληθυσμοί βρίσκονται κυρίως κάτω από τον κάλυκα, στα σημεία που ενώνονται καρποί και στο εσωτερικό της κόμης.

Οδηγίες: Να γίνει **καταπολέμηση στις ημερομηνίες που αναφέρονται στην κόκκινη ψώρα** . Ο ψεκασμός πρέπει να είναι επιμελημένος, με έμφαση στο εσωτερικό της κόμης των δένδρων.

3. ΛΕΚΑΝΙΟ –ΚΟΚΚΟΣ (Coccus hesperidum)- ΙΣΕΡΥΑ Ή ΒΑΜΒΑΚΑΔΑ

Οδηγίες: Σε οπωρώνες που υπάρχουν προσβολές από τα ανωτέρω κοκκοειδή, να γίνει επέμβαση στις ημερομηνίες που αναφέρονται στην κόκκινη ψώρα.

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ: Στους οπωρώνες που υπάρχουν προσβολές από Ισέρυα , πριν αποφασίσετε για επέμβαση, καλό είναι να ελεγχθεί η ύπαρξη του ωφέλιμου αρπακτικού. ►

4. ΜΥΓΑ ΜΕΣΟΓΕΙΟΥ

Οδηγίες: Ο κίνδυνος προσβολών είναι μεγάλος. Να συνεχιστεί η προστασία σε ασυγκόμιστες όψιμες ποικιλίες πορτοκαλιών και μανταρινών. Οι επεμβάσεις να επαναλαμβάνονται ανάλογα με την διάρκεια του φ.π που χρησιμοποιείτε.

5. ΘΡΙΠΕΣ

Είναι είδη πολυφάγα με αρκετές γενιές μέσα στο έτος. Ενήλικα και ανήλικα άτομα νύσσουν και μυζούν τα επιφανειακά κύτταρα φύλλων και καρπών αυτήν την εποχή, προκαλώντας νεκρωτικά στίγματα, εσχαρώσεις, δερματώσεις και κηλιδώσεις κυρίως πορτοκαλιών και λεμονιών.

Οδηγίες: Συνδυασμένη καταπολέμηση με την Κόκκινη ψώρα.

6. ΦΥΛΛΟΚΝΙΣΤΗΣ

Διαπιστώσεις: Ο Φυλλοκνίστης βρίσκεται σε έντονη δραστηριότητα. **Τα νεαρά Οδηγίες:** δένδρα, φυτώρια και εμβόλια πρέπει να είναι προστατευμένα με επανάληψη των επεμβάσεων ανάλογα με το ΦΠ που χρησιμοποιείτε.

7. ΕΡΙΩΔΗΣ ΑΛΕΥΡΩΔΗΣ

Εφαρμόστε τα ακόλουθα καλλιεργητικά μέτρα:

Καλλιεργητικά μέτρα:

- α) αποφυγή θερινών αζωτούχων λιπάνσεων.
- β) αφαίρεση απομάκρυνση και καταστροφή των λαιμαργών βλαστών.
- γ) περιορισμός των αρδεύσεων στις απολύτως αναγκαίες.

8. ΑΦΙΔΕΣ - ΤΕΤΡΑΝΥΧΟΙ

Οδηγίες: **Επέμβαση απαιτείται όταν διαπιστώνετε προσβολές.**

Η χρήση *θερινού πολτού* να μην γίνεται σε θερμοκρασίες άνω των 32⁰C γιατί μπορεί να εμφανιστούν φυτοτοξικότητες. Επειδή αυτήν την εποχή συνυπάρχουν όλα τα βιολογικά στάδια των κοκκοειδών και οι θερμοκρασίες είναι υψηλές, περισσότερο αποτελεσματικός είναι ο συνδυασμός θερινού πολτού με ένα από τα υπόλοιπα φυτοπροστατευτικά προϊόντα που μπορούν να συνδυαστούν με αυτόν.

Τα δέντρα που θα ψεκαστούν με σκέτο θερινό πολτό ή συνδυασμό του, πρέπει να είναι σε καλή θρεπτική κατάσταση, ποτισμένα και η επέμβαση να γίνει πρωινές ώρες ή αργά το απόγευμα.

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ :

- Στην παρακάτω ιστοσελίδα του ΥΠ.Α.Α.Τ: http://www.minagric.gr/syspest/SYSPEST_ENEMY_crops.aspx μπορείτε να ενημερωθείτε για τα εγκεκριμένα εντομοκτόνα για χρήση στα εσπεριδοειδή.
- Να διαβάζετε τις οδηγίες που αναγράφονται στην ετικέτα των φυτοπροστατευτικών προϊόντων και να τηρείτε αυστηρά το χρόνο ανάμεσα στην τελευταία επέμβαση και την συγκομιδή.
- Χρησιμοποιείτε φυτοπροστατευτικά προϊόντα με εκλεκτική δράση για την προστασία των ωφέλιμων εντόμων. Η απομάκρυνση και η καταστροφή των προσβεβλημένων καρπών από το χωράφι βοηθάει στην καταπολέμηση.

- Τα δελτία μας αναρτώνται στην ιστοσελίδα του Υπουργείου www.minagric.gr
- Όσοι ενδιαφέρονται να λαμβάνουν τα δελτία γεωργικών προειδοποιήσεων ηλεκτρονικά μπορούν να το δηλώσουν στην Υπηρεσία μας.

Η ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

ΣΤ. ΤΣΟΛΗ