

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΩΝ
ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

Ταχ.Δ/ση: Μ.Γουβερνέτου 17, 71307 Ηράκλειο

Τηλ: 2810224948 ,Fax: 2810225616

Email: pkpfhgpr@otenet.gr

ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ

Χρησιμοποιείτε σωστά τα φυτοφάρμακα.
Έτσι προστατεύονται:

- Ο χρήστης
- Ο καταναλωτής
- Το περιβάλλον

Ε Χ Θ Ρ Ο Ι Τ Ω Ν Ε Σ Π Ε Ρ Ι Δ Ο Ε Ι Δ Ω Ν


Πληροφορίες: Μαρία Ζ. Ροδιτάκη – Νίκος Ι. Μπαγκής

2.

ΜΥΓΑ ΜΕΣΟΓΕΙΟΥ:	Οι συλλήψεις στο δίκτυο παγίδευσης συνεχίζονται. Σε όψιμα πορτοκάλια και γκρέιπ φρούτ που δεν έχουν συγκομισθεί, να συνεχιστεί η καταπολέμηση.
ΚΟΚΚΙΝΗ ΨΩΡΑ ΚΑΙ ΠΑΡΛΑΤΟΡΙΑ: (μαύρη ψώρα)	Η δεύτερη γενιά και στα δύο κοκκοειδή είναι σε εξέλιξη. Συνήθως σοβαρές προσβολές αναπτύσσονται σε δέντρα με πυκνή βλάστηση και παραμελημένα.
<i>Οδηγίες:</i>	Καθάρισμα των δένδρων για να αερίζονται και να λιάζονται εσωτερικά. Σε δενδροκομεία που οι προσβολές είναι σοβαρές να γίνει καταπολέμηση:
<i>Χρόνος επέμβασης:</i>	– Στην πεδιάδα της Μεσσαράς (Τυμπάκι - Μοίρες): 25 -28 Ιουλίου. – Στις υπόλοιπες περιοχές (Φόδελε-Σίτσες - Χανιά): 28 -31 Ιουλίου.
<i>Συστάσεις:</i>	Οι θερινοί πολτοί πρέπει να χρησιμοποιούνται <u>σε θερμοκρασίες κάτω των 30°C</u> , νωρίς το πρωί ή αργά το απόγευμα και σε δένδρα που είναι σε καλή θρεπτική κατάσταση και ποτισμένα. Σε έντονες προσβολές μπορούν να συνδυαστούν με ένα από τα άλλα εγκεκριμένα φυτοπροστατευτικά εντομοκτόνα.
ΠΛΑΝΟΚΟΚΚΟΣ:	Σε υγρές και δροσερές περιοχές και όπου πέρυσι διαπιστώθηκαν σοβαρές προσβολές συνιστάται να γίνει καταπολέμηση στις ίδιες ημερομηνίες με την κόκκινη ψώρα ή συνδυασμένη αντιμετώπιση.
ΦΥΛΛΟΚΝΙΣΤΗΣ :	Διαπιστώνεται έντονη δραστηριότητα στη νεαρή βλάστηση και σε λαιμαργούς βλαστούς.
<i>Οδηγίες:</i>	Για τα δέντρα που βρίσκονται σε παραγωγική ηλικία συστήνονται μόνο καλλιεργητικά μέτρα όπως αναφέρθηκαν στο προηγούμενο δελτίο μας. Να συνεχιστεί η προστασία μόνο σε φυτώρια και σε νεαρά δέντρα με ψεκασμούς κάλυψης σε διαστήματα ανάλογα με τη διάρκεια δράσης των σκευασμάτων που χρησιμοποιούνται.

ΔΙΑΛΕΥΡΩΔΗΣ: <i>Οδηγίες:</i>	Από δειγματοληψίες σε νεαρή βλάστηση καταγράφονται ευαίσθητα στάδια. Στις περιοχές που διαπιστώνονται επιζήμιοι πληθυσμοί συστήνεται μια επέμβαση στο διάστημα 25 - 27 Ιουλίου .
ΕΡΙΩΔΗΣ ΑΛΕΥΡΩΔΗΣ: <i>Οδηγίες:</i>	Παρατηρούνται περιορισμένες προσβολές στη νεαρή βλάστηση. Συστήνεται να αποφεύγονται άσκοπες χημικές επεμβάσεις που περιορίζουν το αποκλειστικό παράσιτο του εριώδη, το υμενόπτερο <u>Cales noacki</u> .

ΠΡΟΣΟΧΗ: Επιλέγεται τα κατάλληλα φάρμακα από τις λίστες των φυτοπροστατευτικών προϊόντων που σας έχουμε αποστείλει. Να προτιμηθούν φάρμακα με περιορισμένη δράση στα ωφέλιμα έντομα (παράσιτα, αρπακτικά). Διαβάζετε προσεκτικά τις οδηγίες στις ετικέτες των φαρμάκων πριν τη χρήση.

 Το δελτίο εμφανίζεται σε ηλεκτρονική μορφή στην ιστοσελίδα: www.minagric.gr

Ηράκλειο 22 Ιουλίου 2011

Ο Προϊστάμενος Δ/σης

Τρουλλάκης Ιωάννης