

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΩΝ
ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

Ταχ.Δ/ση: Μ.Γουβερνέτου 17, 71307 Ηράκλειο

Τηλ: 2810224948 ,Fax: 2810225616

Email: pkpfhgpr@otenet.gr

ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ


ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ

Χρησιμοποιείτε σωστά τα φυτοφάρμακα.

Έτσι προστατεύονται:

- Ο χρήστης
- Ο καταναλωτής
- Το περιβάλλον

ΕΧΘΡΟΙ -ΑΣΘΕΝΕΙΕΣ ΑΧΛΑΔΙΑΣ ΚΑΙ ΜΗΛΙΑΣ



Πληροφορίες: Νίκος Ι. Μπαγκής - Μαρία Ζ. Ροδιτάκη

1.

ΦΟΥΖΙΚΛΑΔΙΟ : (ΜΗΛΙΑ-ΑΧΛΑΔΙΑ)	Την προηγούμενη καλλιεργητική περίοδο δεν ευνοήθηκε η εκδήλωση πρωτογενών μολύνσεων, με αποτέλεσμα η ασθένεια να έχει περιορισμένη εξέλιξη κυρίως σε αχλαδιές των υγρών περιοχών. Με μειωμένο το αρχικό μόλυσμα ο κίνδυνος εμφάνισης προσβολών περιορίζεται σε περιοχές όπου επικρατούν ιδιαίτερα υγρές συνθήκες και η βλάστηση παραμένει βρεγμένη για περισσότερο από 9 - 10 ώρες συνεχώς. Η επικίνδυνη περίοδος μόλυνσης των δέντρων είναι από το στάδιο Γ3 της πράσινης κορυφής (μπουμπούκι 1,5 εκ.) μέχρι το στάδιο του καρπιδίου.
Οδηγίες:	Παρακολουθείτε τα δελτία καιρού. Σε περίπτωση βροχοπτώσεων ή έντονων δροσιών στα κρίσιμα στάδια, να επεμβαίνετε προληπτικά πριν την εκδήλωση των βροχών ή θεραπευτικά εντός 48 ωρών. Σοβαρότερες προσβολές σημειώνονται συνήθως στις αχλαδιές.

<p>ΒΑΚΤΗΡΙΑΚΟ ΚΑΨΙΜΟ : (ΜΗΛΙΑ-ΑΧΛΑΔΙΑ)</p>	<p>Την περασμένη Άνοιξη διαπιστώθηκαν διάσπαρτες προσβολές σε μηλοειδή διαφόρων περιοχών: Δαμάστα, Μάραθος, Δόξα, Λειβάδι Κρουσσώνα, Οροπέδιο Λασιθίου.</p> <p>Το βακτήριο προκαλεί την καταστροφή ανθέων, κλαδίσκων, κλάδων ή και ολόκληρου του δέντρου. Τα δέντρα είναι πολύ ευαίσθητα στη μόλυνση και ιδιαίτερα οι αχλαδιές, όταν επικρατεί βροχερός καιρός στην άνθηση (θερμοκρασίες μεγαλύτερες από 18°C και σχετική υγρασία πάνω από 60%).</p> <p><i>Οδηγίες:</i> Προληπτικοί ψεκασμοί μέχρι το στάδιο της πράσινης κορυφής με χαλκούχα σκευάσματα και από την πράσινη κορυφή μέχρι και την πτώση των πετάλων με Λαμιναρίν, περιορίζουν την ανάπτυξη του βακτηρίου.</p> <p><i>Συστάσεις:</i> Επιθεωρείτε τα δέντρα τακτικά μετά την άνθηση. Αν διαπιστώνετε ύποπτα συμπτώματα (μικρά ή μεγάλα τμήματα σαν καμένα από φωτιά) να τα αφαιρείτε προσεκτικά μαζί με υγιές τμήμα 20 – 25 εκ. κάτω από την προσβολή και να τα καταστρέφετε άμεσα.</p> <p>Τα εργαλεία κοπής θα πρέπει να απολυμαίνονται συνεχώς με χλωρίνη του εμπορίου ή οινόπνευμα.</p>
<p>ΜΑΤΟΨΕΙΡΑ : (Εριόσωμα) <i>Οδηγίες:</i></p>	<p>Τα τελευταία χρόνια διαπιστώνονται διάσπαρτα τοπικές προσβολές σε μηλιές του οροπεδίου Λασιθίου.</p> <p>Συνιστάται ψεκασμός με ένα εγκεκριμένο σκεύασμα στο στάδιο Ε2 της ρόδινης κορυφής, στα δέντρα που διαπιστώθηκε.</p>

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ: Σας αποστέλλουμε τις λίστες των εγκεκριμένων δραστικών ουσιών των εχθρών και ασθενειών των μηλοειδών για το έτος 2011. Κατά τη διάρκεια της καλλιεργητικής περιόδου να επιλέγετε τα κατάλληλα σκευάσματα από τις λίστες αυτές.

- Διαβάζετε προσεκτικά τις οδηγίες στις ετικέτες των φαρμάκων πριν τη χρήση. Ορισμένα σκευάσματα μπορούν να προκαλέσουν φυτοτοξικότητα σε κάποιες ποικιλίες.
- Να προτιμούνται σκευάσματα με χαμηλή τοξικότητα για την μέλισσα.

☞ Το δελτίο εμφανίζεται σε ηλεκτρονική μορφή στην ιστοσελίδα: www.minagric.gr

Ηράκλειο 11 Απριλίου 2011
Ο Προϊστάμενος Δ/σης
Τρουλλάκης Γιάννης