

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΩΝ
ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

Ταχ.Δ/νση : Μ.Γουβερνέτου 17, 71307 Ηράκλειο

Τηλ: 2810224948 ,Fax: 2810225616

Email: pkpfhgpr@otenet.gr

ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ

Χρησιμοποιείτε σωστά τα φυτοφάρμακα.

Έτσι προστατεύονται:

- Ο χρήστης
- Ο καταναλωτής
- Το περιβάλλον

ΕΧΘΡΟΙ - ΑΣΘΕΝΕΙΕΣ ΑΜΠΕΛΙΟΥ ΚΑΙ ΕΛΙΑΣ

Α Μ Π Ε Λ Ι

Πληροφορίες: Νίκος Ι. Μπαγκής - Μαρία Ζ. Ροδιτάκη

15

ΕΥΔΕΜΙΔΑ: <i>Οδηγίες:</i>	<p>Η δραστηριότητα του εντόμου ευνοείται από τις καιρικές συνθήκες σε όλες τις περιοχές. Στις όψιμες περιοχές η πτήση της ευδεμίδας εξελίσσεται με υψηλούς πληθυσμούς.</p> <p>Συνιστάται <u>επαναληπτικός ψεκασμός</u> στις παρακάτω ημερομηνίες:</p> <ul style="list-style-type: none">– Όψιμες περιοχές Επιτραπέζια: 2 - 4 Ιουλίου Σταφιδάμπελα – κρασάμπελα: 4 - 6 Ιουλίου <p>Στην πρώιμη, στην ενδιάμεση και στη μεσοπρώιμη ζώνη καταγράφονται ακόμα πληθυσμοί και ωτοκίες της δεύτερης πτήσης. Σε αμπέλια που προορίζονται για επιτραπέζια και βρίσκονται στις συγκεκριμένες περιοχές συνιστάται καταπολέμηση το διάστημα:</p> <ul style="list-style-type: none">– Πρώιμες - Ενδιάμεσες περιοχές - Κάτω Μεσσαρά: 1 - 3 Ιουλίου.– Μεσοπρώιμες περιοχές : 5 - 7 Ιουλίου.
<i>Τρόπος επέμβασης :</i>	Ψεκασμός ή σκόνισμα. Το φάρμακο να κατευθύνεται στα σταφύλια.
ΤΖΙΤΖΙΚΑΚΙ:	Σε αμπέλια με συμπτώματα να γίνει συνδυασμένη αντιμετώπιση με την ευδεμίδα.
ΨΕΥΔΟΚΟΚΚΟΣ:	Σε επιτραπέζια αμπέλια με εμφάνιση κόλλας στα ρυτιδώματα να γίνει επιμελημένος και κατευθυνόμενος ψεκασμός στους κορμούς και στους βραχίονες.
ΩΪΔΙΟ: <i>Διαπιστώσεις:</i> <i>Συστάσεις:</i>	<ul style="list-style-type: none">- Συνεχείς κύκλοι της ασθένειας είναι σε εξέλιξη.- Οι θερμοκρασίες της εποχής (20-23°C) κι η υψηλή σχετική υγρασία ευνοούν την ασθένεια.- Τα σταφύλια είναι ευαίσθητα μέχρι το γυάλισμα. <p>Να συνεχιστεί η προστασία των αμπελιών. Για την αποφυγή ανθεκτικότητας συνιστάται η εναλλαγή σκευασμάτων με διαφορετικό τρόπο δράσης σύμφωνα με τις λίστες που σας έχουμε αποστείλει.</p>

Συνέχεια στην πίσω σελίδα

<p>ΛΕΚΑΝΙΟ:</p> <p><i>Διαπιστώσεις:</i></p> <p><i>Οδηγίες:</i></p> <p><i>Συστάσεις:</i></p> <p><i>Χρόνος επέμβασης:</i></p>	<p>Είναι κοκκοειδές (ψώρα) που προσβάλει τους βλαστούς και τα φύλλα της ελιάς. Ευνοείται από την υψηλή σχετική υγρασία που συχνά συναντάται όταν το φύλλωμα είναι πυκνό και δεν αερίζεται. Σοβαρές προσβολές παρουσιάζονται σε δέντρα υγρών περιοχών, ποτιστικά και ακλάδευτα. Προξενεί εξασθένιση άμεσα λόγω της απομύζησης των χυμών και έμμεσα λόγω της καπνιάς που αναπτύσσεται πάνω στα μελιτώματα του.</p> <p>Οι προσβολές περιορίζονται με κατάλληλο κλάδεμα που εξασφαλίζει καλό αερισμό των δέντρων και με την αποφυγή υπερβολικών ποτισμάτων και αζωτούχων λιπάνσεων.</p> <p>Στις πρώιμες περιοχές οι εκκολάψεις αυγών των μητρικών λεκανίων ολοκληρώνονται. Σε δέντρα που παρατηρούνται σοβαρές προσβολές συνιστάται καταπολέμηση. Τα ωφέλιμα έντομα, παρασιτοειδή και αρπακτικά, συμβάλλουν αποτελεσματικά στην μείωση του πληθυσμού του. Για την προστασία των ωφέλιμων εντόμων να χρησιμοποιηθούν εκλεκτικά εντομοκτόνα.</p> <p>- Πρώιμες και παραλιακές περιοχές : 4 - 6 Ιουλίου. Για τις μεσοπρώιμες και όψιμες περιοχές θα ενημερωθείτε αργότερα.</p>
<p>ΠΟΛΛΙΝΙΑ:</p>	<p>Παρατηρείται εξάπλωση του κοκκοειδούς και ένταση των προσβολών. Σε ελαιώνες με σοβαρή προσβολή να γίνει άμεση καταπολέμηση σε όλες τις περιοχές.</p>
<p>ΜΑΡΓΑΡΟΝΙΑ:</p> <p><i>Διαπιστώσεις:</i></p> <p><i>Συστάσεις:</i></p> <p><i>Χρόνος επέμβασης:</i></p>	<p>Στις πρώιμες και στις μεσοπρώιμες περιοχές έχει ξεκινήσει μια νέα γενιά. Το καλοκαίρι και το φθινόπωρο οι προνύμφες προσβάλουν εκτός από τα φύλλα και τους καρπούς. Σε φυτώρια, νεαρά δέντρα και δέντρα που έχει γίνει κλάδεμα ανανέωσης, η μαργαρόνια μπορεί να προκαλέσει αξιόλογη ζημιά λόγω της ζωηρής βλαστικής τους κατάστασης.</p> <p>Όταν διαπιστώνεται έντονη προσβολή στην τρυφερή βλάστηση και στους καρπούς, συνιστάται επέμβαση φροντίζοντας να λούζονται οι λαιμαργοί στη βάση του δέντρου. Η αντιμετώπιση είναι δύσκολη γιατί οι προνύμφες προστατεύονται μέσα στα τυλιγμένα φύλλα ή στη σάρκα του καρπού και επιπλέον όσο μεγαλώνουν γίνονται πιο ανθεκτικές στα εντομοκτόνα.</p> <p>- Πρώιμες και παραλιακές περιοχές : 4 - 6 Ιουλίου. - Μεσοπρώιμες περιοχές : 8 - 10 Ιουλίου. Για τις όψιμες περιοχές θα ενημερωθείτε σε επόμενο δελτίο.</p>
<p>ΑΚΑΡΕΑ: (Eriophyidae)</p>	<p>Συνιστάται άμεση καταπολέμηση για όλες τις περιοχές σε φυτώρια, νεαρά δέντρα, αυστηρά κλαδεμένα δέντρα και δέντρα που ποτίζονται.</p>

ΦΑΡΜΑΚΑ: Οι επεμβάσεις για την αντιμετώπιση των παραπάνω εχθρών και ασθενειών να γίνονται με την επιλογή κατάλληλων σκευασμάτων από τις λίστες που σας έχουμε αποστείλει.

📧 Το δελτίο εμφανίζεται σε ηλεκτρονική μορφή στην ιστοσελίδα: www.minagric.gr

Ηράκλειο 30 Ιουνίου 2011
Ο Προϊστάμενος Δ/σης
Τρουλλάκης Γιάννης