

ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΩΝ
ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
Ταχ. Δ/ση: Καστοριάς 32Α, 71307 Ηράκλειο
Τηλ: 2810224948, Fax: 2810225616
Email: pkpfhgpr@otenet.gr



Τα δελτία διανέμονται δωρεάν στους ενδιαφερόμενους
και δημοσιεύονται στην ιστοσελίδα www.minagric.gr

Εφαρμόζετε πιστά τις οδηγίες χρήσης των φαρμάκων.
Έτσι προστατεύετε τον καταναλωτή και το περιβάλλον

ΜΗΛΙΑ - ΑΧΛΑΔΙΑ - ΚΑΡΥΔΙΑ (ΟΡΕΙΝΕΣ – ΟΨΙΜΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ)

Πληροφορίες: Νίκος Ι. Μπαγκής

2.

ΚΑΡΠΟΚΑΨΑ : Μηλιά – Αχλαδιά - Καρυδιά Χρόνος ψεκασμού:	<p>Η καρπόδεση έχει ολοκληρωθεί. Η πρώτη γενιά του εντόμου ξεκίνησε. Στο δίκτυο παγίδευσης οι πρώτες συλλήψεις αρσενικών καταγράφονται το τελευταίο δεκαήμερο του Απριλίου.</p> <p>Συνιστάται ψεκασμός στις ορεινές περιοχές (Δαμάστα, Δόξα, Οροπέδιο Λασιθίου, Οροπέδιο Κρουσώνα, κ.α.):</p> <ul style="list-style-type: none">- Με ωοκτόνα σκευάσματα : μέχρι 10 Μαΐου. (ΦΕΝΟΞΥΚΑΡΜΠ)- Με ρυθμιστές ανάπτυξης: από τη λήψη του δελτίου μέχρι 12 Μαΐου. (ΧΛΩΡΑΝΘΑΝΙΛΙΠΡΟΛ, ΝΤΙΦΛΟΥΜΠΕΝΖΟΥΡΟΝ, ΤΕΜΠΟΥΦΕΝΟΖΕΙΝΤ, ΜΕΘΟΞΥΦΕΝΟΖΕΙΝΤ, ΦΛΟΥΦΕΝΟΞΟΥΡΟΝ)- Με κλασικά εντομοκτόνα ή ιολογικά τύπου κοκκιώσεων: 12 - 14 Μαΐου. (ΦΟΣΜΕΤ, ΧΛΟΡΠΥΡΙΦΟΣ, ΧΛΟΡΠΥΡΙΦΟΣ-ΜΕΘΥΛ, ΔΕΛΤΑΜΕΘΡΙΝ, ΜΠΕΤΑ-ΣΥΦΛΟΥΘΡΙΝ, ΣΥΦΛΟΥΘΡΙΝ, ΣΠΙΝΟΣΑΝΤ, Τ-ΦΛΟΥΒΑΛΙΝΕΙΤ, ΙΝΤΟΞΑΚΑΡΜΠ, ΘΕΙΑΚΛΟΠΡΙΝΤ, ΕΤΟΦΕΝΠΡΟΞ)
Οδηγίες:	<p>Ο ψεκασμός να επαναληφθεί μετά από 15 – 20 ημέρες ανάλογα με τη διάρκεια δράσης του φαρμάκου. Τα ιολογικά σκευάσματα χρησιμοποιούνται στην βιολογική καλλιέργεια και επαναλαμβάνονται κάθε 8-10 μέρες με τρεις εφαρμογές ανά γενιά του εντόμου. Στην βιολογική καλλιέργεια μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί και το ΣΠΙΝΟΣΑΝΤ.</p> <p>Επειδή σε αυτήν τη γενιά ωοτοκεί και στις κορυφές των δέντρων , να γίνει επιμελημένος ψεκασμός καρπών και φυλλώματος.</p>
ΣΕΖΙΑ :	<p>Είναι έντομο ξυλοφάγο που προκαλεί σοβαρές ζημιές κυρίως στις μηλιές. Η πτήση του εντόμου στις ορεινές περιοχές ξεκίνησε στο δεύτερο δεκαπενθήμερο του Απριλίου. Οι ωοτοκίες που ξεκινούν την περίοδο αυτή, συνεχίζονται σε όλη τη διάρκεια του καλοκαιριού.</p> <p>Τοποθετεί τα αυγά σε κορμούς ή χοντρούς κλάδους με πληγές, σχισμές, έλκη ή σε τομές κλαδεύματος. Η καταπολέμηση στοχεύει στις νεαρές προνύμφες πριν αυτές εισέλθουν εντός του ξύλου.</p>
Οδηγίες:	<p>Το ασβέστωμα των κορμών σε δέντρα ηλικίας πάνω από δύο ετών επιδρά απωθητικά στο έντομο για την εναπόθεση αυγών.</p> <p>Συνιστάται με τη λήψη του δελτίου ψεκασμός κορμού και βραχιόνων με εντομοκτόνο μεγάλης υπολειμματικής διάρκειας (ΧΛΟΡΠΥΡΙΦΟΣ).</p> <p>Ο ψεκασμός να επαναλαμβάνεται κάθε 15-20 ημέρες.</p>

Συνέχεια στην επόμενη σελίδα

ΦΟΥΖΙΚΛΑΔΙΟ : <i>Οδηγίες:</i>	<p>Οι καιρικές συνθήκες ευνόησαν την εμφάνιση της ασθένειας κυρίως στις αχλαδιές.</p> <p>Σε περιόδους με έντονες δροσιές ή βροχές, που το φύλλωμα και οι καρποί παραμένουν βρεγμένα για αρκετές ώρες τα δέντρα πρέπει να προστατεύονται.</p>
ΩΙΔΙΟ (Μηλιά) : <i>Οδηγίες:</i>	<p>Οι καιρικές συνθήκες ευνοούν την ασθένεια και διαπιστώνονται προσβολές στην τρυφερή βλάστηση σε μηλιές.</p> <p>Συνιστάται να γίνει συνδυασμένη αντιμετώπιση με την καρπόκαψα.</p>
ΒΑΚΤΗΡΙΑΚΟ ΚΑΨΙΜΟ : (Αχλαδιά) <i>Οδηγίες:</i>	<p>Αυξημένη σχετική υγρασία κατά τη διάρκεια της άνθησης σε συνδυασμό με συνεχή επικράτηση υψηλών θερμοκρασιών εκδήλωσαν την ασθένεια και διαπιστώνονται σοβαρές προσβολές κυρίως σε αχλαδιές.</p> <p><u>Συμπτώματα:</u> μαύρισμα ανθέων, καρπιδίων, φύλλων και βλαστών που μοιάζουν σαν «κάψιμο από φωτιά».</p> <p>Τα προσβεβλημένα τμήματα να αφαιρούνται μαζί με υγιές τμήμα 20-25 εκατοστών και να καταστρέφονται. Τα εργαλεία κλαδέματος πρέπει να απολυμαίνονται συνεχώς κατά τις εργασίες αφαίρεσης με οινόπνευμα του εμπορίου. Να ακολουθήσει ψεκασμός με χαλκούχο σκεύασμα ή <i>LAMINAPIN</i>. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Σε ορισμένες ποικιλίες υπάρχει κίνδυνος φυτοτοξικότητας.</p>

ΦΑΡΜΑΚΑ: Να επιλέγονται σύμφωνα με τις λίστες δραστικών ουσιών που σας έχουμε αποστείλει. Διαβάστε και εφαρμόζετε πιστά τις οδηγίες χρήσης.

Ηράκλειο 8 Μαΐου 2012
 Ο Προϊστάμενος Δ/σης
 Τρουλλάκης Ιωάννης