

ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΩΝ
ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
Ταχ. Δ/ση: Καστοριάς 32Α, 71307 Ηράκλειο
Τηλ: 2810224948, Fax: 2810225616
Email: pkpfhgpr@otenet.gr



Τα δελτία διανέμονται δωρεάν στους ενδιαφερόμενους
και δημοσιεύονται στην ιστοσελίδα www.minagric.gr

Εφαρμόζετε πιστά τις οδηγίες χρήσης των φαρμάκων.
Έτσι προστατεύετε τον καταναλωτή και το περιβάλλον

ΕΧΘΡΟΙ ΤΩΝ ΕΣΠΕΡΙΔΟΕΙΔΩΝ

Ανεπτυγμένη προνύμφη και αυγά Διαλευρώδη στην κάτω επιφάνεια των νεαρών φύλλων.	Προνύμφη του Διαλευρώδη (αριστερά) και προνύμφη Εριώδη Αλευρώδη (δεξιά).	Αποικία προνυμφών και αυγά του Εριώδη Αλευρώδη.	Προσβολή από Φυλλοκνίστη (στοές προνυμφών στην κάτω επιφάνεια των φύλλων και εξέλιξη των φύλλων).

Πληροφορίες: MSc Μαρία Ζ. Ροδιτάκη

2.

<p>ΜΥΓΑ ΜΕΣΟΓΕΙΟΥ:</p> <p>Διαπιστώσεις:</p> <p>Οδηγίες:</p>	<p>Οι συλλήψεις στο δίκτυο φερομονικών παγίδων των περιοχών καλλιέργειας δείχνουν αυξημένη δραστηριότητα του εντόμου. Οι υψηλοί πληθυσμοί που καταγράφονται μπορεί να προκαλέσουν σοβαρές προσβολές σε όψιμα πορτοκάλια και γκρέιφ φρούτ που δεν έχουν συγκομιστεί.</p> <p>Να συνεχιστεί η προστασία των καρπών με ψεκασμούς δολωματικούς ή κάλυψης με ένα εγκεκριμένο εντομοκτόνο. <u>Οι δολωματικοί πρέπει να επαναλαμβάνονται περίπου ανά εβδομάδα.</u> Η καταπολέμηση της μύγας είναι προληπτική, στοχεύει στη θανάτωση των ακμαίων πριν ωτοκήσουν μέσα στους καρπούς. <u>Για λόγους προστασίας των ωφέλιμων εντόμων προτείνεται η εφαρμογή των δολωματικών ψεκασμών.</u></p>
<p>ΚΟΚΚΙΝΗ ΨΩΡΑ - ΜΑΥΡΗ ΨΩΡΑ: (Παρλατόρια)</p> <p>Οδηγίες:</p> <p>Συστάσεις:</p>	<p>Η δεύτερη γενιά βρίσκεται σε εξέλιξη Συνήθως σοβαρές προσβολές αναπτύσσονται σε δέντρα με πυκνή βλάστηση, παραμελημένα.</p> <p>Στα δέντρα που παρατηρείται προσβολή να γίνει καταπολέμηση:</p> <ul style="list-style-type: none"> – Στην πεδιάδα της Μεσσαράς (Τυμπάκι - Μοίρες): 26 - 29 Ιουλίου. – Στις υπόλοιπες περιοχές καλλιέργειας (Φόδελε - Σίσες - Χανιά): 30 Ιουλίου έως 2 Αυγούστου. <p>Σε περιπτώσεις έντονης προσβολής, οι θερινοί πολτοί μπορούν να συνδυαστούν με ένα εγκεκριμένο εντομοκτόνο. Όταν χρησιμοποιούνται σε ανάμειξη μπαίνουν στο 50% της συνιστώμενης δόσης, σε συνδυασμό με την κανονική δόση του εντομοκτόνου και τηρείται το μεγαλύτερο διάστημα “ανάμονής πριν τη συγκομιδή” ανάμεσα στα δύο σκευάσματα.</p> <p><u>Όταν εφαρμόζονται θερινοί πολτοί, πρέπει τα δένδρα να είναι καλά ποτισμένα και να βρίσκονται σε καλή θρεπτική κατάσταση. Ο ψεκασμός πρέπει να γίνεται νωρίς το πρωί ή αργά το απόγευμα σε θερμοκρασίες κάτω των 32°C.</u></p>

<p>ΨΕΥΔΟΚΟΚΚΟΣ :</p> <p><i>Οδηγίες:</i></p>	<p>Σε περιοχές υγρές και δροσερές και <u>όπου πέρυσι διαπιστώθηκαν σοβαρές προσβολές</u> να γίνει καταπολέμηση στις ίδιες ημερομηνίες με την κόκκινη ψώρα. Εάν συνυπάρχουν και τα δύο έντομα συνιστάται συνδυασμένη αντιμετώπιση.</p>
<p>ΦΥΛΛΟΚΝΙΣΤΗΣ :</p> <p><i>Διαπιστώσεις:</i></p> <p><i>Οδηγίες:</i></p> <p><i>Συστάσεις:</i></p>	<p>Αυτή την εποχή παρατηρείται έντονη δραστηριότητα του εντόμου στην τρυφερή βλάστηση και στους λαίμαργους βλαστούς. Τα φύλλα αποκτούν αργυρόχρωμη όψη και καρουλιάζουν. <u>Η ζημιά μπορεί να είναι ιδιαίτερα σοβαρή στις νεαρές φυτείες και στα τρυφερά εμβόλια, όπου κυρίως επιδιώκεται η βλαστική ανάπτυξη.</u></p> <p>–<u>Να προστατευτούν φυτώρια και νεαρά δέντρα</u> με ψεκασμούς κάλυψης ή και ριζοποτίσματα (imidacloprid, thiamethoxam) σε διαστήματα ανάλογα με τη διάρκεια δράσης των σκευασμάτων που χρησιμοποιούνται.</p> <p><u>Τα δέντρα που βρίσκονται σε παραγωγική ηλικία ανέχονται προσβολές στο φύλλωμα τους χωρίς ιδιαίτερες επιπτώσεις.</u> Προτεινόμενοι χειρισμοί, όπως κοπή των λαίμαργων βλαστών, αποφυγή όψιμης λίπανσης και περιορισμός των αρδεύσεων το καλοκαίρι και το φθινόπωρο περιορίζουν την νέα βλάστηση αυτή την περίοδο που αναμένονται υψηλοί πληθυσμοί.</p>
<p>ΔΙΑΛΕΥΡΩΔΗΣ :</p> <p><i>Διαπιστώσεις:</i></p> <p><i>Οδηγίες:</i></p>	<p>Πυκνό φύλλωμα και υψηλή σχετική υγρασία ευνοούν την δημιουργία μεγάλων πληθυσμών. Ο διαλευρώδης εκτός από απομυζήσεις χυμών στο φύλλωμα, συμβάλλει στην ανάπτυξη των μυκήτων της καπνιάς από τα μελιτώδη εκκρίματα των προνυμφών του.</p> <p>Στις περιοχές που διαπιστώνονται επιζήμιοι πληθυσμοί, κυρίως στις βόρειες περιοχές καλλιέργειας της Κρήτης, συστήνεται ψεκασμός κάλυψης στο διάστημα: 30 Ιουλίου έως 2 Αυγούστου.</p>
<p>ΕΡΙΩΔΗΣ ΑΛΕΥΡΩΔΗΣ :</p> <p><i>Οδηγίες:</i></p>	<p>Παρατηρούνται προσβολές στη <u>νεαρή βλάστηση</u>. Η αντιμετώπιση του εριώδη αποκλειστικά με εντομοκτόνα δεν είναι πάντα επιτυχής.</p> <p>Συστήνουμε να αποφεύγονται οι χημικές επεμβάσεις για την προστασία του αποκλειστικού παράσιτου του εριώδη, του υμενόπτερου <u>Cales noacki</u>, που ασκεί ικανοποιητικό έλεγχο.</p>

ΠΡΟΣΟΧΗ: Επιλέγετε τα κατάλληλα φάρμακα από τις λίστες των φυτοπροστατευτικών που σας έχουμε αποστείλει. Να προτιμηθούν φάρμακα με περιορισμένη δράση στα ωφέλιμα έντομα (παράσιτα, αρπακτικά). Διαβάζετε προσεκτικά τις οδηγίες στις ετικέτες των φαρμάκων πριν τη χρήση και τηρείτε τις ημέρες αναμονής πριν τη συγκομιδή.

Ηράκλειο 24 Ιουλίου 2012

Ο Προϊστάμενος Δ/σης

Τρουλλάκης Ιωάννης