

ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ & ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΩΝ
ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ & ΦΥΤΟΪΓΚΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

Ταχ. Δ/ση: Καστοριάς 32Α, 71307 Ηράκλειο
Τηλ: 2810.282248, Fax: 2810.225616 Email: pkpfhgpr@otenet.gr



Τα δελτία αναρτώνται στην ιστοσελίδα του υπουργείου www.minagric.gr
και αποστέλλονται σε κάθε ενδιαφερόμενο μέσω e-mail με αίτημα στο
agrodeltiokriti@gmail.com

Εφαρμόζετε πιστά τις οδηγίες χρήσης των φαρμάκων.
Έτσι προστατεύετε εσείς, ο καταναλωτής και το περιβάλλον.

ΕΧΘΡΟΙ - ΑΣΘΕΝΕΙΕΣ ΤΟΥ ΑΜΠΕΛΙΟΥ Δελτίο Ν° 24

(Το δελτίο αφορά τις μεσοπρώιμες και όψιμες περιοχές Ηρακλείου - Λασιθίου)

Ευδεμίδα: Αντιμετώπιση στην μεσοπρώιμη και όψιμη ζώνη Ηρακλείου - Λασιθίου.

Ωίδιο: Καταπολέμηση στην όψιμη ζώνη. Συνδυασμένη επέμβαση με την ευδεμίδα.

Μόγα Μεσογείου: Επιτραπέζια σταφύλια . Συνδυασμένη αντιμετώπιση με την ευδεμίδα.





Μην υποτιμάτε τα καλλιεργητικά μέτρα. Είναι η πρώτη γραμμή άμυνας στη φυτοπροστασία.

Η αποτελεσματικότητα των χημικών επεμβάσεων εξαρτάται άμεσα από τις καλλιεργητικές πρακτικές. Η ζώνη των σταφυλιών να διατηρείται ελεύθερη ώστε να υπάρχει επαρκής αερισμός και να φτάνει το φάρμακο στα σταφύλια. Σταφύλια κρυμμένα όπως και τα συμπαγή (οφιχτά) κατά κανόνα προσβάλλονται από κάποιο έντομο (ευδεμίδα, ψευδόκοκκο) ή κάποιο μύκητα (βοτρυτή, όξινη σήψη) που δεν αντιμετωπίζονται εύκολα.

Περιορίστε τις καταπολεμήσεις στις απολύτως αναγκαίες όσο πλησιάζει η συγκομιδή και τηρείτε αυστηρά τους χρόνους αναμονής από την τελευταία επέμβαση.

Λόγω των υψηλών θερμοκρασιών της περιόδου και των ανέμων, που συνήθως πνέουν ισχυροί κατά την διάρκεια της ημέρας, συνιστάται οι ψεκασμοί να γίνονται κοντά στο σούρουπο.

Πιν. 1. Βλαστικά στάδια αμπέλου στην ποικιλία σουλτανίνα

Βλαστικά στάδια που επικρατούν ανά ζώνη καλλιέργειας	Κλίμακα Baggjolini				
		Στάδιο Μ αρχή γυαλισματος - γυάλισμα		Στάδιο Ν έναρξη - πλήρης ωρίμανσης ωρίμανση	
Πρώιμη ζώνη				ωρίμανση σταφυλιών	
Μεσοπρώιμη		έναρξη ωρίμανσης			
Όψιμη ζώνη		γυάλισμα			


Πληροφορίες: Νίκος Ι. Μπαγκής

Παρατηρήσεις υπαίθρου : Ρ.Οικονομάκη, Σ.Λούρου, Ν.Μπαγκής,
Δ.Α.Ο.Κ. Χανίων, Δίκτυο Οινοποιών Κρήτης.

Αμπέλι Δελτίο Ν° 24 - 24/7/2018

Σελίδα 1 από 2

ΕΥΔΕΜΙΔΑ:
(*Lobesia botrana*)



Γενικές πληροφορίες - Διαπιστώσεις :

- Στους ν. Ηρακλείου - Λασιθίου στην μεσοπρώιμη και στην όψιμη ζώνη, η δραστηριότητα της ευδεμίδας είναι σε εξέλιξη (συλλήψεις, ωτοκίες).

Οδηγίες :

- Στα σταφύλια που θα τρυγηθούν πριν το τέλος του μήνα δεν χρειάζεται καταπολέμηση.
- Στα υπόλοιπα σταφύλια της μεσοπρώιμης και όψιμης ζώνης συνιστάται επαναληπτικός ψεκασμός στις παρακάτω ενδεικτικές ημερομηνίες:

Μεσοπρώιμη ζώνη Ηρακλείου - Λασιθίου	• Επιτραπέζια : 25 - 26 Ιουλίου
	• Σουλτανίνα - οινάμπελα : 27 - 28 Ιουλίου
Όψιμη ζώνη Ηρακλείου - Λασιθίου	• Επιτραπέζια : 27 - 28 Ιουλίου
	• Σουλτανίνα - οινάμπελα : 29 - 30 Ιουλίου

Προσοχή. Να επιλέγονται σκευάσματα μικρής υπολειμματικής διάρκειας και να τηρούνται αυστηρά οι χρόνοι αναμονής πριν τη συγκομιδή.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την [ευδεμίδα πατήστε εδώ](#)

ΩΙΔΙΟ:
(*Erysiphe necator*)



Γενικές πληροφορίες - Διαπιστώσεις :

- Οι ράγες είναι ευαίσθητες μέχρι το γυάλισμα, οι μίσχοι - άξονες των σταφυλιών μέχρι τη συγκομιδή ενώ το φύλλωμα όλη την καλλιεργητική περίοδο.

Οδηγίες :

- Στην όψιμη ζώνη, συνιστάται συνδυασμένη επέμβαση με την ευδεμίδα.
- Μετά το γυάλισμα, μεγαλύτερη ανάγκη προστασίας έχουν τα επιτραπέζια.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το [ωίδιο πατήστε εδώ](#)

ΜΥΓΑ ΜΕΣΟΓΕΙΟΥ:
(*Ceratitis capitata*)



Γενικές πληροφορίες - Διαπιστώσεις :

- Οι υψηλοί πληθυσμοί που καταγράφονται την φετινή περίοδο στο δίκτυο παγίδευσης των εσπεριδοειδών (κύριοι ξενιστές) σε συνδυασμό με τις σημαντικές προσβολές στα φρούτα που προηγούνται των σταφυλιών (βερίκοκα, ροδάκινα, αχλάδια, δαμάσκηνα, σύκα κλπ), δίνουν αυξημένο κίνδυνο εμφάνισης προσβολών σε χονδρόρωγα επιτραπέζια σταφύλια.
- Προσβολές σε επιτραπέζια σταφύλια έχουν εμφανιστεί κατά θέσεις.

Οδηγίες :

- Τα επιτραπέζια σταφύλια που εμφανίζουν συμπτώματα και τα επιτραπέζια χονδρόρωγα σταφύλια που βρίσκονται σε περιοχές με ιστορικό ζημιών συνιστάται να προστατευτούν. Οι αμπελουργοί μπορούν να κάνουν συνδυασμένη αντιμετώπιση με την ευδεμίδα.

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη [μύγα μεσογείου πατήστε εδώ](#)

Φάρμακα : Χρησιμοποιείτε σκευάσματα από τις λίστες εγκεκριμένων φυτοπροστατευτικών προϊόντων. Σε κάθε περίπτωση διαβάστε προσεκτικά και εφαρμόζετε πιστά την ετικέτα.

Ηράκλειο 24 Ιουλίου 2018

Η Προϊσταμένη Τμήματος

Κληρονόμου Ευφροσύνη

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Τα Δελτία για το αμπέλι εκδίδονται με δεδομένα που προέρχονται από συγκεκριμένο δίκτυο βιολογικών, φαινολογικών και μετεωρολογικών παρατηρήσεων σε τρεις αντιπροσωπευτικές ζώνες προαιμότητας: **πρώιμη** (παραλιακή), **μεσοπρώιμη** (ενδοχώρα) και **όψιμη** (ορεινή). Αν και περιγράφουν με μεγάλη ακρίβεια την γενική τάση που επικρατεί ως προς την εξέλιξη των φυτοπαρασίτων, στις τελικές αποφάσεις φυτοπροστασίας που λαμβάνετε, στηριζόμενοι στις συστάσεις των Δελτίων και σε συνεργασία με τον τοπικό γεωργικό σας σύμβουλο, οφείλετε να ενσωματώνετε τις παρατηρήσεις σας και να συνεκτιμάτε τις τοπικές ιδιαιτερότητες του αμπελώνα (ανάγλυφο, μικροκλίμα, έκθεση, ιστορικό κ.ά).

Πληροφορίες: Νίκος Ι. Μπαγκής

Παρατηρήσεις υπαίθρου : Ρ.Οικονομάκη, Σ.Λούρου, Ν.Μπαγκής,

Δ.Α.Ο.Κ. Χανίων, Δίκτυο Οινοποιών Κρήτης.

Αμπέλι Δελτίο Ν° 24 - 24/7/2018

Σελίδα 2 από 2