

ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ & ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΩΝ
ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ & ΦΥΤΟΪΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

Ταχ. Δ/ση: Καστοριάς 32Α, 71307 Ηράκλειο

Τηλ: 2810.282248, Fax: 2810.225616

Email: pkpfiraklio@minagric.gr

Τα δελτία αναρτώνται στην ιστοσελίδα του υπουργείου
www.minagric.gr και αποστέλλονται μέσω e-mail σε κάθε
ενδιαφερόμενο με αίτημα στο agrodeltiokriti@gmail.com



Εφαρμόζετε πιστά τις οδηγίες χρήσης των φαρμάκων.
Έτσι προστατεύετε εσείς, ο καταναλωτής και το περιβάλλον.

ΕΧΘΡΟΙ - ΑΣΘΕΝΕΙΕΣ ΤΟΥ ΑΜΠΕΛΙΟΥ

Δελτίο Ν° 17

Ευδεμίδα: Έναρξη αντιμετώπισης για την 3^η πτήση (2^η καρπόβια γενιά) σε :

- όψιμες περιοχές των ν. Ηρακλείου - Λασιθίου
- Επαναληπτικός ψεκασμός για την 3^η πτήση (2^η καρπόβια γενιά) σε :
- πρώιμες περιοχές των ν. Ηρακλείου - Λασιθίου (σουλτανίνα - οινάμπελα)
- ενδιάμεση ζώνη (μεταξύ πρώιμης και μεσοπρώιμης του ν. Ηρακλείου) και κάτω Μεσοαρά
- μεσοπρώιμες περιοχές των ν. Ηρακλείου - Λασιθίου (επιτραπέζια)

Μύγα Μεσογείου: Επιτραπέζια σταφύλια. Τακτικοί έλεγχοι και προσοχή κοντά στην ωρίμαση.






Ωίδιο: Τα σταφύλια παραμένουν ευαίσθητα μέχρι το γυάλισμα → θέλει προσοχή.

Τζιτζικάκια: Κατά θέσεις δυναμικοί οι πληθυσμοί → να γίνονται έλεγχοι στη βλάστηση.

Βλάστηση και φαινολογία

Σε ένα μέσο όρο, η πρωιμότητα σε σχέση με το 2020 είναι στις 10 ημέρες περίπου.

Βλαστικά στάδια αμπελιού στην ποικιλία σουλτανίνα στο ν. Ηρακλείου

Βλαστικά στάδια που επικρατούν ανά ζώνη καλλιέργειας					
Κλίμακα Baggiolini	Στάδιο L κλείσιμο σταφυλιών	Στάδιο M αρχή γυαλισματος - γυάλισμα	Στάδιο N έναρξη - πλήρης ωρίμασης ωρίμαση		
Κλίμακα BBCH	77	81	85		
Πρώιμη ζώνη		τα σταφύλια ωριμάζουν			
Μεσοπρώιμη		γυάλισμα - ωρίμαση σταφυλιών			
Όψιμη ζώνη	έναρξη γυαλισματος				

Γενικές πληροφορίες - Διαπιστώσεις:

- Η 3^η πτήση (2^η καρπόβια γενιά) έχει ξεκινήσει σε αρκετές αμπελουργικές περιοχές του νησιού. Σε αυτές τις περιοχές, γενικά, η δραστηριότητα (πτήση, ωτοκίες) εμφανίζει μια μικρή αύξηση σε σχέση με την περασμένη εβδομάδα. Παραμένει ωστόσο αρκετά πιο χαμηλή σε σύγκριση με την προηγούμενη γενιά ενώ ταυτόχρονα διαφοροποιείται σημαντικά από αμπέλι σε αμπέλι (ανάλογα με το ποσοστό προσβολών που σημειώθηκε στην περασμένη γενιά).

- Ο συνδυασμός υψηλών θερμοκρασιών & χαμηλής σχετικής υγρασίας στο τέλος Ιουνίου - αρχές Ιουλίου φαίνεται να έχουν επηρεάσει αρνητικά τη δραστηριότητα της ευδεμίδας, ιδιαίτερα στο ν. Χανίων, όπου τα καιρικά φαινόμενα είχαν πιο έντονο χαρακτήρα. Για την εξέλιξη της ευδεμίδας σε αυτές τις περιοχές θα ενημερωθείτε με νεότερο δελτίο στις επόμενες ημέρες.

Οδηγίες:

1. Έναρξη ψεκασμών 2^{ης} καρπόβιας γενιάς :

➤ Όψιμες περιοχές ν. Ηρακλείου - Λασιθίου:

- Επιτραπέζια : 22 - 23 Ιουλίου.
- Σουλτανίνα - οινάμπελα : 24 - 26 Ιουλίου.

2. Επαναληπτικός ψεκασμός 2^{ης} καρπόβιας γενιάς :

➤ Πρώιμες περιοχές ν. Ηρακλείου - Λασιθίου:

- Σουλτανίνα - οινάμπελα : 21 - 22 Ιουλίου.

➤ Ενδιάμεση ζώνη ν. Ηρακλείου (μεταξύ πρώιμης και μεσοπρώιμης) και κάτω Μεσσαρά:

- Επιτραπέζια : 21 - 22 Ιουλίου.
- Σουλτανίνα - οινάμπελα : 23 - 24 Ιουλίου.

➤ Μεσοπρώιμες περιοχές ν. Ηρακλείου - Λασιθίου:

- Επιτραπέζια : 22 - 24 Ιουλίου.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την [ευδεμίδα πατήστε εδώ](#)

ΜΥΓΑ ΜΕΣΟΓΕΙΟΥ:
(*Ceratitis capitata*)
Γενικές πληροφορίες - Διαπιστώσεις:

- Είδος πολυφάγο. Ζημιώνει περιστασιακά χονδρόραγα επιτραπέζια σταφύλια.

Οδηγίες:

Τα επιτραπέζια σταφύλια που βρίσκονται σε περιοχές με ιστορικό ζημιών (όπως Μαλάδες, Φοινικιά, Σταυράκια, Αθάνατοι, Προφ. Ηλίας, Αρχάνες κλπ) να ελέγχονται τακτικά για εμφάνιση προσβολών.

Οι αμπελουργοί μπορούν να προστατεύσουν τα σταφύλια:

- με τοποθέτηση από νωρίς παγίδων μαζικής προσέλκυσης και θανάτωσης,
- σε ψεκασμούς για την ευδεμίδα που γίνονται κοντά στην ωρίμαση να χρησιμοποιούν σκευάσματα με έγκριση και για τη μύγα.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη [μύγα μεσογείου πατήστε εδώ](#)

ΩΙΔΙΟ:
(*Erysiphe necator*)
(χολέρα, σίρικας)
Γενικές πληροφορίες - Διαπιστώσεις:

- Οι ράγες είναι ευαίσθητες μέχρι το γυάλισμα ενώ οι άξονες και οι μίσχοι των σταφυλιών καθώς και η νέα βλάστηση σε όλη την καλλιεργητική περίοδο.

- Οι θερμοκρασίες και η αυξημένη σχετική υγρασία της εποχής σε συνδυασμό με τα μελτέμια ευνοούν νέες μολύνσεις.

Οδηγίες:

- Μεγαλύτερος κίνδυνος υπάρχει για τα αμπέλια που έχει εμφανιστεί ο μύκητας (άρα διατηρούνται αυξημένα μολύσματα) και για αυτά που επικρατούν ευνοϊκές συνθήκες (αυξημένη υγρασία λόγω άρδευσης ή τοποθεσίας, καλή σκίαση).
- **Να γίνεται συνδυασμένη επέμβαση με την ευδεμίδα.**

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το [ωίδιο πατήστε εδώ](#)

ΤΖΙΤΖΙΚΑΚΙΑ : (Empoasca spp)



Πτερωτό



Άπτερο



Γενικές πληροφορίες - Διαπιστώσεις :

- Υπάρχουν πολλά αμπέλια με πληθυσμούς πάνω από το όριο επέμβασης.
- Υπενθυμίζεται ότι η αντιμετώπιση στοχεύει τις άπτερες μορφές του εντόμου.

Οδηγίες :

- Να μην γίνονται ψεκασμοί χωρίς ελέγχους για το όριο επέμβασης : **τα τζιτζικάκια αναπτύσσουν εύκολα ανθεκτικότητα στα εντομοκτόνα για αυτό και η χρήση τους πρέπει να είναι η απολύτως αναγκαία.**
- Να γίνονται συστηματικοί έλεγχοι : Ελέγχονται 100 τυχαία φύλλα στην κάτω πλευρά τους (2 - 3 φύλλα/πρέμνο) τα οποία βρίσκονται στο κορυφαίο τμήμα του βλαστού (όχι όμως τα πρώτα, ένα - δυο πολύ τρυφερά φύλλα της κορυφής). Όριο επέμβασης μετά από έλεγχο : 50 - 100 άπτερα άτομα στα 100 φύλλα.
- Όπου χρειαστεί αντιμετώπιση μπορεί να συνδυάζεται με αυτήν για την ευδεμίδα. Ο ψεκασμός για τα τζιτζικάκια στοχεύει στη βλάστηση.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το [τζιτζικάκια πατήστε εδώ](#)

Επισημάνση για τα χρησιμοποιούμενα φυτοπροστατευτικά :

- ✓ Να τηρείτε αυστηρά τους χρόνους αναμονής πριν τη συγκομιδή.
- ✓ Να επιλέγετε σκευάσματα μικρής υπολειμματικής διάρκειας κοντά στη συγκομιδή.
- ✓ Προτιμήστε φυτοπροστατευτικά φιλικότερα για τον χρήστη, το περιβάλλον και το προϊόν.
- ✓ Χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα φυτοπροστατευτικά για την καλλιέργεια.
- ✓ Σε κάθε περίπτωση διαβάζετε προσεκτικά και εφαρμόζετε πιστά την ετικέτα.

Εγκεκριμένα σκευάσματα ανά καλλιέργεια και ασθένεια στην ιστοσελίδα του ΥΠΑΑΤ [πατώντας εδώ](#)

Εγκεκριμένα σκευάσματα ανά καλλιέργεια και εχθρό στην ιστοσελίδα του ΥΠΑΑΤ [πατώντας εδώ](#)

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Τα δελτία Γεωργικών Προειδοποιήσεων και πολλά άλλα θέματα ενδιαφέροντος μπορείτε να τα λαμβάνετε με ειδοποιήσεις - ενημερώσεις σε συσκευές smartphones / tablets μέσα από τη νέα εφαρμογή «i-AGRIC» του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

- Για κατέβασμα σε Android Play Store

<https://play.google.com/store/apps/details?id=gr.bsmapps.collectives>

- Για κατέβασμα σε Apple Store

<https://apps.apple.com/gr/app/i-agric/id1545820080>



Νέος κορωνοϊός SARS CoV- 2

Ακολουθείτε πιστά τις οδηγίες της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας και του Υπουργείου Υγείας για τον περιορισμό της εξάπλωσης της ασθένειας Covid-19.

Ηράκλειο 20 Ιουλίου 2021
Η Προϊσταμένη Τμήματος
Κληρονόμου Ευφροσύνη