



# ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ



ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΩΝ  
ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΝΑΥΠΛΙΟΥ  
Ταχ. Δ/ση: Παραλιακή οδός Ναυπλίου Νέας Κίου  
Τ.Κ. 21100  
Τηλ.: 27520 26241 Fax.: 27520 27629

– Η σωστή χρήση φυτοφαρμάκων είναι η αποτελεσματικότερη φυτοπροστασία.  
– Η καλύτερη γεωργία είναι η σωστή διαχείριση της φύσης.

Πληροφορίες: Α. Μπαλωμένου

43 /02-11-12

## ΜΗΛΙΑ – ΑΧΛΑΔΙΑ

### 1.ΦΟΥΖΙΚΛΑΔΙΟ

#### Διαπιστώσεις:

Τα μέτρα, που συνιστώνται παρακάτω στοχεύουν στη σοβαρή μείωση μέχρι και πλήρη καταστολή της παραγωγής των ασκοσπορίων που δημιουργούν τις πρωτογενείς μολύνσεις την ερχόμενη Άνοιξη. Λόγω της ευκολίας μεταφοράς των ασκοσπορίων με τον αέρα, σε μεγάλες αποστάσεις, τα μέτρα αυτά είναι περισσότερο αποτελεσματικά όταν εφαρμόζονται σε όλα τα δενδροκομεία μιας περιοχής.

#### Οδηγίες:

#### 1. Αφαίρεση με κλάδεμα και κάψιμο των προσβλημένων από το προηγούμενο έτος βλαστών.

Ψεκασμός, λίγο πριν την έναρξη πτώσης των φύλλων με ένα κατάλληλο μυκητοκτόνο σε λίγο αυξημένη δόση, εμποδίζει το σχηματισμό περιθηκίων και την παραγωγή ασκοσπορίων.

ή

#### 2. Συγκέντρωση και κάψιμο ή παράχωμα των φύλλων των δένδρων (όπου είναι δυνατόν) , μόλις ολοκληρωθεί η πτώση τους ή ψεκασμός με διάλυμα ουρίας στα πεσμένα φύλλα.

Μπορεί επίσης να γίνει ψεκασμός των δένδρων με σκευάσματα ουρίας, λίγο πριν την έναρξη της πτώσης των φύλλων, που ευνοεί την μετέπειτα αποσύνθεση τους στο έδαφος. Σε αυτή την περίπτωση να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στο σκεύασμα που θα χρησιμοποιηθεί, για την αποφυγή δημιουργίας τοξικότητας .

#### Φυτ/κά προϊόντα:

Βλέπε προηγούμενα δελτία.

### 2.ΒΑΚΤΗΡΙΑΚΟ ΚΑΨΙΜΟ

#### Οδηγίες :

- 1) Αφαίρεση και κάψιμο όλων των προσβεβλημένων τμημάτων των δένδρων, με αφαίρεση και αρκετού υγιούς τμήματος 20-30 εκ..
- 2) Κατά το κλάδεμα ή καθαρισμό των δένδρων, τα εργαλεία να απολυμαίνονται συνεχώς με εμβάπτιση σε καθαρό οινόπνευμα ή διάλυμα φορμόλης 5%.
- 3) Άμεση επέμβαση με χαλκούχο σκεύασμα σε όλα τα κτήματα (και σε εκείνα που δεν έχουν εμφανιστεί συμπτώματα). Επανάληψη του ψεκασμού μετά από δύο εβδομάδες. ►

### **3. ΣΕΖΙΑ**

#### **Οδηγίες :**

Την περίοδο αυτή το έντομο βρίσκεται στο στάδιο της προνύμφης. Οι προσβολές εντοπίζονται κυρίως στο κορμό και στη βάση των βραχιόνων των δένδρων. Συνιστάται επέμβαση στα τμήματα προσβολών, με σκοπό την θανάτωση των προνυμφών του εντόμου.

#### **Φυτ/κά**

#### **προϊόντα:**

Εγκεκριμένα σκευάσματα για Σέζια.

Να προτιμηθεί σκεύασμα με μεγάλη υπολειμματική διάρκεια.

### **4. ΨΥΛΛΑ (ΑΧΛΑΔΙΑ)**

#### **Οδηγίες :**

**Στους οπωρώνες που υπάρχουν προσβολές, να γίνει άμεσος και επιμελημένος ψεκασμός, για να μειωθούν τα ακμαία του εντόμου που θα διαχειμάσουν. Ο ψεκασμός να γίνει μια ζεστή ηλιόλουστη μέρα και να γίνει καλή διαβροχή των δένδρων.**

#### **Φυτ/κά**

#### **προϊόντα:**

*Δελταμεθρίν, Μπέτα συφλουθρίν, Λάμδα Συαλοθρίν, Συφλουθρίν, Τ-Φλουβαλινέιτ, Φοσμέτ, Χλωρπυριφός μεθύλ .*

#### **ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ:**

1. Να διαβάζετε και να εφαρμόζετε πιστά τις οδηγίες χρήσης που αναγράφονται στην ετικέτα των φυτοπροστατευτικών προϊόντων.
2. Όλα τα δελτία μας υπάρχουν στο διαδίκτυο ([www.minagric.gr](http://www.minagric.gr))

**Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ  
& Α.Α**

**Θ. ΜΗΤΣΙΝΙΚΟΣ**