



ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΩΝ
ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΝΑΥΠΛΙΟΥ
Ταχ. Δ/ση: Παραλιακή οδός Ναυπλίου Νέας Κίου
Τ.Κ. 21100
Τηλ.: 27520 26241 Fax.: 27520 27629

— Η σωστή χρήση φυτοφαρμάκων είναι η αποτελεσματικότερη φυτοπροστασία.
— Η καλύτερη γεωργία είναι η σωστή διαχείριση της φύσης.



Πληροφορίες: **Α. Μπαλωμένου**

18 / 2-5-12

Α. ΒΕΡΙΚΟΚΙΑ

1. ΑΝΑΡΣΙΑ

Οι προνύμφη του εντόμου προσβάλει βλαστούς και καρπούς.

Διαπιστώσεις: Ξεκίνησε η πρώτη πτήση της ανάρσιας σε όλες τις περιοχές.

Οδηγίες: Στους οπωρώνες βερικοκιάς των πρώιμων και μεσοπρώιμων περιοχών να γίνει επέμβαση από 5 -9 Μάη.

Στις όψιμες περιοχές η επέμβαση να γίνει από 15-19 Μάη.

Περιοχή Ήρας 5-7 Μάη

Φυτ/κά προϊόντα: *Βάκιλλος Θουριγγίας (βιολογικό σκεύασμα), { Δελταμεθρίν, Σπινোসάντ 7 ημέρες πριν τη συγκομιδή }, { Ιντοξακάρμπ 10 ημέρες πριν τη συγκομιδή }, { Χλωραντράνιλιπρόλ 14 ημέρες πριν τη συγκομιδή }.*

2. ΚΙΤΡΙΝΟΣ ΤΕΤΡΑΝΥΧΟΣ

Οδηγίες: Ελέγχετε συστηματικά τους οπωρώνες. Ενδεικτικά σημεία για προσβολή είναι οι λαιμαργοί βλαστοί της βάσης και η αυτοφυής βλάστηση. Σε οπωρώνες που μετά από έλεγχο διαπιστωθούν προσβολές, να γίνει καταπολέμηση.

Φυτ/κά προϊόντα: *{ Θερινά λάδια 20-21 ημέρες πριν τη συγκομιδή }, { Ετοξαζόλ, 14 ημέρες πριν τη συγκομιδή }.*

3. ΚΟΡΥΝΕΟ- ΜΟΝΙΛΙΑ

Διαπιστώσεις: Στους επιτόπιους ελέγχους μας διαπιστώνουμε προσβολές.

Οδηγίες: Να γίνει συνδυασμένη καταπολέμηση με την ανάρσια.

Φυτ/κά προϊόντα: Βλέπε προηγούμενο δελτίο.

Β. ΡΟΔΑΚΙΝΙΑ – ΝΕΚΤΑΡΙΝΙΑ - ΔΑΜΑΣΚΗΝΙΑ

1.ΑΝΑΡΣΙΑ

Οι προνύμφες του εντόμου προσβάλουν βλαστούς και καρπούς κυρίως της ροδακινιάς και νεκταρινιάς και δευτερευόντως της δαμασκηνιάς.

Διαπιστώσεις: Ξεκίνησε η πρώτη πτήση της ανάρσιας σε όλες τις περιοχές. ►

Οδηγίες: **Στους οπωρώνες των πρώιμων και μεσοπρώιμων περιοχών να γίνει επέμβαση από 5-9 Μάη.**
Στις όψιμες περιοχές η επέμβαση να γίνει από 15-19 Μάη.

Φυτ/κά προϊόντα: **Ροδακινιά:** *Βάκιλλος Θουριγγίας (βιολογικό σκεύασμα), { Δελταμεθρίν, Εμαμεκτίν Μπενζοείτ, Μπέτα-συφλουθρίν, Σπινোসάντ, Συφλουθρίν **7 ημέρες πριν τη συγκομιδή** }, { Ιντοξακάρμπ **10 ημέρες πριν τη συγκομιδή** }, { Χλωραντраниλιπρόλ **14 ημέρες πριν τη συγκομιδή** }, { Χλωρπυριφός μεθύλ **21 ημέρες πριν τη συγκομιδή** } { Χλωρπυριφός **20 και 30 ημέρες πριν τη συγκομιδή ανάλογα με το σκεύασμα** } { Ντιφλουμπενζουρόν, **30 ημέρες πριν τη συγκομιδή** }, { Τα-Φλουβαλινέιτ **56 ημέρες πριν τη συγκομιδή** }.*

Νεκταρινιά: Δελταμεθρίν, Εμαμεκτίν Μπενζοείτ, Ιντοξακάρμπ, Μπέτα-συφλουθρίν, Σπινোসάντ, Συφλουθρίν, Χλωραντраниλιπρόλ. Χλωρπυριφός μεθύλ

Δαμασκηνιά: Βάκιλλος Θουριγγίας (βιολογικό σκεύασμα), Δελταμεθρίν, Χλωραντраниλιπρόλ. Χλωρπυριφός

2. ΩΙΔΙΟ - ΕΞΩΑΣΚΟΣ

Οδηγίες: Βλέπε προηγούμενα δελτία

Γ. ΚΕΡΑΣΙΑ

1.ΑΦΙΔΕΣ

Οδηγίες: **Ελέγχετε τους οπωρώνες. Με την έναρξη των προσβολών να γίνεται επέμβαση.**

Φυτ/κά προϊόντα: *Ασεταμιπρίντ, Δελταμεθρίν, Θιακλοπρίντ, Θιαμεθοξάμ,, Πιριμικάρμπ, Πυρεθρίνς, Θερινά λάδια.*

ΠΡΟΣΟΧΗ: **Στις πρώιμες ποικιλίες βερικοκιάς και ροδακινιάς, να δοθεί μεγάλη προσοχή στην υπολειμματική διάρκεια του σκευάσματος που θα χρησιμοποιηθεί.**

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ:

1. Να διαβάζετε και να εφαρμόζετε πιστά τις οδηγίες χρήσης που αναγράφονται στην ετικέτα των φυτοπροστατευτικών προϊόντων.
2. Όλα τα δελτία μας υπάρχουν στο διαδίκτυο (www.minagric.gr).