



ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ



ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΩΝ
ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΝΑΥΠΛΙΟΥ
Ταχ. Δ/ση: Παραλιακή οδός Ναυπλίου Νέας Κίου
Τ.Κ. 21100
Τηλ.: 27520 26241 Fax.: 27520 27629

- Η σωστή χρήση φυτοφαρμάκων είναι η αποτελεσματικότερη φυτοπροστασία.
- Η καλύτερη γεωργία είναι η σωστή διαχείριση της φύσης.

Πληροφορίες: Α. Μπαλωμένου

20 / 04-05-12

ΑΜΠΕΛΙ

1.ΠΕΡΟΝΟΣΠΟΡΟΣ

Διαπιστώσεις: Οι καιρικές συνθήκες που επικράτησαν τον Απρίλη δεν ευνόησαν την ασθένεια. Μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν προσβολές.

Οδηγίες:

Τα αμπέλια να ελέγχονται συστηματικά και επιμελημένα, ιδιαίτερα αυτά που βρίσκονται σε περιοχές με υγρασία και περιοχές που υπάρχει δεδομένο προσβολών, για καταστροφή των κηλίδων «ελαίου» πριν εμφανιστούν οι καρποφορίες του μύκητα (εξανθήσεις).

Τα αμπέλια λίγο πριν την άνθηση (βλαστικό στάδιο μούρου) είναι ευαίσθητα στις προσβολές από περονόσπορο και ο Μάης επικίνδυνος μήνας.

Λόγω της γρήγορης αύξησης της βλάστησης οι προληπτικές επεμβάσεις εξασφαλίζουν προστασία για μικρό χρονικό διάστημα (4-7 ημέρες).

Φυτ/κά προϊόντα:

Αζοξυστρομπίν+Φολπέντ, Μανέμπ, Μανκοζέμπ, Μανκοζέμπ +Ζοξαμίντ, Μαντιπροπαμίντ, Μαντιπροπαμίντ+Μανκοζέμπ, Μπεναλαξύλ+Μανκοζέμπ, Μπεναλαξύλ-μ+Μανκοζέμπ, Μπεναλαξύλ+Χαλκός, Μεταλαξύλ-μ+Χαλκός, Μεταλαξύλ-μ+Μανκοζέμπ, Μεταλαξύλ+Μανκοζέμπ, Μεταλαξύλ+Χαλκός, Μπεντθιαβαλικάρμπ-ισοπροπύλ+Μανκοζέμπ, Ντιθιανόν, Ντιμεθομόρφ+Χαλκός, Ντιμεθομόρφ+Ντιθιανόν, Ντιμεθομόρφ+Φολπέντ, Προπινέμπ, Προπινέμπ+Τριαντιμενόν, Ντιμεθομόρφ+Πυρακλοστρομπίν, Συμοξανίλ+Χαλκός, Συμοξανίλ+Μανέμπ, Συμοξανίλ+Φοσετύλ-αλ+Μανκοζέμπ, Συμοξανίλ+Μανκοζέμπ, Συμοξανίλ+Φαμοξαντόν, Συμοξανίλ+Χαλκός, Φαμοξαντόν+Μανκοζέμπ, Φεναμιντόν+Φοσετύλ-αλ, Φλουοπικολίντ+Φοσετύλ-αλ, Φολπέντ, Φολπέντ+Μεταλαξύλ, Φολπέντ+Τριαντιμενόν, Φολπέντ+Φοσετύλ-αλ, Φοσετύλ-αλ, Χαλκός, Χαλκός+Θείο, Χαλκός+Μανκοζέμπ, Χαλκός+Φοσετύλ-αλ, Χαλκός+ Φολπέντ .



2.ΩΙΔΙΟ

Διαπιστώσεις: Οι καιρικές συνθήκες είναι ευνοϊκές για την ασθένεια.

Οδηγίες:

Από το στάδιο της άνθησης , καρπόδεσης και 2-3 βδομάδες μετά την καρπόδεση, τα αμπέλια πρέπει να είναι προστατευμένα.

Φυτ/κά

προϊόντα:

A. Με προληπτική ή κυρίως προληπτική δράση:

Σκόνη θειαφιού ή βρέξιμο θειάφι, Θείο + Οξυχλωριούχος χαλκός, Μεπτυλντινοκάπ, Προκουιναζίντ

B. Με προληπτική και θεραπευτική δράση:

Αζοξυστρομπίν+Φολπέτ(μόνο για οиноποιήσιμες ποικιλίες), Κυνοξιφέν, Μυκλομπουτανίλ, Μετραφενόν, Μπουπιριμέιτ, Ντιμεθομόρφ+Πυρακλостρομπίν, Πενκοναζόλ, Προπινέμπ+Τριαντιμενόλ, Σπιροξαμίν, Συπροκοναζόλ, Τεμπουκοναζόλ, Τριαντιμενόλ, Τριφλοξιστρομπίν, Φενμπουκοναζόλ, Φολπέτ+Τριαντιμενόλ, Ampelomyces quisqualis (AQ 10) παράσιτο του ωίδιου, σε χαμηλές δόσεις έχει προληπτική δράση και σε υψηλές δόσεις θεραπευτική δράση.

Για την αποφυγή ή καθυστέρηση δημιουργίας ανθεκτικότητας:

1.Εναλλαγή των δραστικών ουσιών μέσα στην ίδια καλλιεργητική περίοδο.

2.Οι παρεμποδιστές βιοσύνθεσης εργοστερόλης (Μυκλομπουτανίλ,Πενκοναζόλ,Σπιροξαμίν, Συπροκοναζόλ,Τεμπουκοναζόλ,Τριαντιμενόλ,Φενμπουκοναζόλ), να μην εναλλάσσονται μεταξύ τους και οι επεμβάσεις με τα ανωτέρω να μην υπερβαίνουν τις (2) ανά καλλιεργητική περίοδο.

3.Να χρησιμοποιείται η μικρότερη αποτελεσματική δόση εφαρμογής.

3.ΕΥΔΕΜΙΔΑ

Διαπιστώσεις:

Οι συλλήψεις στο δίκτυο παγίδευσης είναι ελάχιστες. Τα στοιχεία των τριών τελευταίων ετών δείχνουν χαμηλούς πληθυσμούς για όλες τις γενιές.

Οδηγίες:

Δεν απαιτείται καταπολέμηση. Το ανεκτό όριο προσβολής αυτής της γενιάς είναι υψηλό και οι ζημιές που ίσως προκληθούν από την πρώτη γενιά του εντόμου, αναπληρώνονται συνήθως από την αύξηση του βάρους των ραγών που απομένουν.

4. ΘΡΙΠΑΣ (Καλιφόρνιας)

Οδηγίες:

Στις ποικιλίες που προορίζονται για επιτραπέζια χρήση και υπάρχει δεδομένο προσβολών από θρίπα να γίνει επέμβαση στις αρχές της άνθησης.

Φυτ/κά

προϊόντα:

Μεθιοκάρμπη, Σπινοςάντ.

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ:

1.Να διαβάζετε και να εφαρμόζετε πιστά τις οδηγίες χρήσης που αναγράφονται στην ετικέτα των φυτοπροστατευτικών προϊόντων.
2.Όλα τα δελτία μας υπάρχουν στο διαδίκτυο (www.minagric.gr)

**Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ
Η. ΦΟΥΣΚΑΡΗΣ**