



ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΩΝ
ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΝΑΥΠΛΙΟΥ
Ταχ. Δ/ση: Παραλιακή οδός Ναυπλίου Νέας Κίου
Τ.Κ. 21100
Τηλ.: 27520 26241 Fax.: 27520 27629



- Η σωστή χρήση φυτοφαρμάκων είναι η αποτελεσματικότερη φυτοπροστασία.
- Η καλύτερη γεωργία είναι η σωστή διαχείριση της φύσης.

Πληροφορίες: Α. Μπαλωμένου

31/2-7-12

ΜΗΛΙΑ-ΑΧΛΑΔΙΑ (ΟΡΕΙΝΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ)

1.ΚΑΡΠΟΚΑΨΑ

Διαπιστώσεις:

Οδηγίες:

Φυτοπρ/κά προϊόντα:

Άρχισε η πτήση της δεύτερης γενιάς του εντόμου στις ορεινές περιοχές.
Μπορείτε να επέμβετε επιλέγοντας έναν από τους παρακάτω τρόπους:

1.Αμέσως με τη λήψη του δελτίου με: Φενοξυκάρμπ, Χλورانτράνιλιπρόλ.

2.Μέχρι τις 7 Ιουλίου με:

Μεθοξυφenoζάιντ, Ντιφλουμπενζουρόν, Φλουφenoξουρόν.

3.Από 8 ως 12 Ιουλίου με:

Τα βιολογικά σκευάσματα (ιός τύπου κοκκιώσεων) - επανάληψη μετά από 8-10 μέρες, Δελταμεθρίν, (Εμαμεκτίν μπενζοείτ-μόνο στη μηλιά), Θιακλοπρίντ, Ιντοξακάρμπ, Μπέτα συφλουθρίν, Σπινοςάντ, Συφλουθρίν, Τ-Φλουβαλινέιτ, Φοσμέτ, Χλωρπυριφός, Χλωρπυριφός μεθύλ.

Ο ψεκασμός να επαναληφθεί μετά από δύο εβδομάδες.

Στις αχλαδιές των ορεινών περιοχών ισχύουν τα αναφερόμενα στη μηλιά.

Η δραστική ουσία Θιακλοπρίντ δεν έχει έγκριση για την αχλαδιά και επομένως δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί.

Στους οπωρώνες αχλαδιάς των πρώιμων περιοχών να γίνει επαναληπτικός ψεκασμός από 15-18 Ιουλίου.

2. ΝΑΡΚΗ – ΣΕΣΙΑ (ΜΗΛΙΑ)

Οδηγίες:

Φυτ/κά

προϊόντα:

Να γίνει συνδυασμένη καταπολέμηση με την καρπόκαψα.

Νάρκη: Θιακλοπρίντ, Μπέτα συφλουθρίν, Ντιφλουμπενζουρόν, Σπινοςάντ, Συφλουθρίν Τ-φλουβαλινέιτ, Φενοξυκάρμπ, Φλουφenoξουρόν, Φοσμέτ, Χλورانτράνιλιπρόλ, Χλωρπυριφός.

Σέσια: Χλωρπυριφός.

3. ΦΟΥΖΙΚΛΑΔΙΟ (ΜΗΛΙΑ-ΑΧΛΑΔΙΑ)

Οδηγίες:

Βλέπε προηγούμενο δελτίο.



4. ΠΙΚΡΗ ΚΗΛΙΔΩΣΗ (ΜΗΛΙΑ)

Είναι μη παρασιτική ασθένεια που οφείλεται σε ανεπαρκή εφοδιασμό των καρπών με ασβέστιο. Η έλλειψη ασβεστίου στους καρπούς προέρχεται από τον ανταγωνισμό κυρίως αζώτου, καλίου, μαγνησίου. Η «ασθένεια» είναι σοβαρότερη σε καρπούς νεαρών δένδρων με μικρή καρποφορία και σε μεγάλου μεγέθους καρπούς.

Οδηγίες:

Όπου υπάρχει δεδομένο εμφάνισης της «ασθένειας» από την προηγούμενη χρονιά, να γίνει ψεκασμός με εγκεκριμένα σκευάσματα ασβεστίου με προσθήκη διαβρεκτικού.

Να γίνει καλή διαβροχή των δένδρων και ο ψεκασμός να επαναληφθεί μετά από 15 ημέρες.

Προσοχή στις οδηγίες χρήσης των σκευασμάτων για την αποφυγή δημιουργίας εγκαυμάτων στους καρπούς.

Η αποτελεσματικότητα των ψεκασμών αυξάνεται αν συγχρόνως αποφεύγονται συνθήκες που αυξάνουν την ευπάθεια των καρπών, όπως, ακανόνιστα ποτίσματα, απότομη έκπτυξη ζωηρής βλάστησης, πλούσια αζωτούχος και καλιούχος λίπανση και συγκομιδή καρπών σε πολύ πρόωρο στάδιο ωρίμανσης.

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

- 1. ΠΡΟΣΟΧΗ στην υπολειμματική διάρκεια των σκευασμάτων που θα χρησιμοποιηθούν στις αχλαδιές.**
- 2. Να διαβάζετε και να εφαρμόζετε πιστά τις οδηγίες που αναγράφονται στην ετικέτα των φυτοπροστατευτικών προϊόντων.**
- 3. Όλα τα δελτία μας βρίσκονται στο διαδίκτυο (www.minagric.gr)**

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

Η. ΦΟΥΣΚΑΡΗΣ