



ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ



ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΩΝ
ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΝΑΥΠΛΙΟΥ
Ταχ. Δ/ση: Παραλιακή οδός Ναυπλίου Νέας Κίου
Τ.Κ. 21100
Τηλ.: 27520 26241 Fax.: 27520 27629

— Η σωστή χρήση φυτοφαρμάκων είναι η αποτελεσματικότερη φυτοπροστασία.
— Η καλύτερη γεωργία είναι η σωστή διαχείριση της φύσης.

Πληροφορίες: Α. Μπαλωμένου

4 /17-2-16


ΠΥΡΗΝΟΚΑΡΠΑ Α. ΒΕΡΙΚΟΚΙΑ

Βλαστικά Στάδια Βερικοκιάς



A

BBCH SCALE



B

51



Γ

53



Δ

57



E

59



Z

65

Β.ΡΟΔΑΚΙΝΙΑ – ΝΕΚΤΑΡΙΝΙΑ

Βλαστικά στάδια



A

BBCH SCALE



B

51



Γ

53



Δ

57



E

59



Z

65

1.ΜΟΝΙΛΙΑ

Η ευαισθησία στις προσβολές από την ασθένεια, ξεκινάει από το στάδιο Γ (Ροζ μπουμπούκι) και συνεχίζεται σε όλη την περίοδο της ανθοφορίας, μέχρι την πτώση των πετάλων.

Βροχερός, νεφροσκεπής καιρός και θερμοκρασίες πάνω από 5⁰ C, είναι κατ' εξοχήν ευνοϊκός για την ανάπτυξη της ασθένειας και την πραγματοποίηση μολύνσεων.

Διαπιστώσεις: Οι υπερπρώιμες και πρώιμες ποικιλίες βρίσκονται σε στάδια ευπρόσβλητα από την ασθένεια.

Οδηγίες : Τα δέντρα πρέπει να είναι προστατευμένα από την μονίλια, καθ' όλη τη διάρκεια της άνθησης .

**Φυτ/κά
προϊόντα :**

1.Βερικοκιά: Θιράμ, Θειοφανεΐτ-μεθύλ (1 επέμβαση ανά καλλιεργητική περίοδο), Ιπροντιόν, Κάπταν, Μποσκαλίντ+Πυρακλοστρομπίν, Μυκλομπουτανίλ, Ντιθιανόν, Προπικοναζόλ, Προχλωράζ, Συπροντινίλ, Συπροντινίλ+Φλουντιοξονίλ (1 επέμβαση ανά καλλιεργητική περίοδο), Τεμπουκοναζόλ+Τριφλοξιστρομπίν, Φλουοπιράμ+Τεμπουκοναζόλ, {Χαλκούχο σκεύασμα -μόνο μέχρι το στάδιο Γ}.

2.Ροδακινιά: Ζιράμ, Θειοφανεΐτ-μεθύλ(1 επέμβαση ανά καλλιεργητική περίοδο), Θιράμ, Ιπροντιόν, Κάπταν ►

Μποσκαλίντ+Πυρακλοστρομπίν, Μυκλομπουτανίλ, Ντιθιανόν, Ντιφenoκoναζόλ-(από την πλήρη άνθηση BBCH 65), Προπικoναζόλ, Προχλoράζ(μέχρι την πτώση πετάλων), Συπροντινίλ, Συπροντινίλ+Φλουντιoξονίλ (1 επέμβαση ανά καλλιεργητική περίοδο), Συπροκoναζόλ, Τεμπουκoναζόλ+Τριφλοξιστρομπίν, Φλουoπυράμ+ Τεμπουκoναζόλ {Χαλκούχο σκεύασμα -μόνο μέχρι το στάδιο Γ}.

3. Νεκταρινιά: *Θειοφανέιτ –μεθύλ (1 επέμβαση ανά καλλιεργητική περίοδο), Ιπροντιόν, Κάπτan, Μποσκαλίντ+Πυρακλοστρομπίν, Μυκλομπουτανίλ, Ντιθιανόν, Ντιφenoκoναζόλ-(από την πλήρη άνθηση BBCH 65), Προπικoναζόλ, Συπροντινίλ+Φλουντιoξονίλ (1 επέμβαση ανά καλλιεργητική περίοδο), Τεμπουκoναζόλ+Τριφλοξιστρομπίν Φλουoπυράμ+ Τεμπουκoναζόλ, {Χαλκούχο σκεύασμα -μόνο μέχρι το στάδιο Γ}.*

2.ΕΞΩΑΣΚΟΣ

Οδηγίες:

Η περίοδος που μεσολαβεί από την έκπτυξη του ακραίου φυλλοφόρου οφθαλμού και μέχρι τα φύλλα να αποκτήσουν το τελικό μέγεθος είναι κρίσιμη για την ασθένεια. Τα δένδρα πρέπει να είναι καλά προστατευμένα σ'αυτή την περίοδο εφόσον οι θερμοκρασίες υπερβαίνουν τους 7⁰ C.

Φυτ/κά

προϊόντα:

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ:

Οι δραστικές ουσίες για την μονίλια που προλαμβάνουν τις προσβολές από τον εξώασκο.

- ✓ Κατά τον πρώτο ψεκασμό για την μονίλια, να προτιμάται η χρήση χαλκούχου σκευάσματος.
- ✓ Επειδή έχουν παρατηρηθεί ανθεκτικά στελέχη σε διάφορες κατηγορίες φυτοπροστατευτικών προϊόντων, καλό είναι να **εναλλάσσονται** στη σειρά των ψεκασμών, για την αποφυγή δημιουργίας ανθεκτικότητας.
- ✓ Μετά από βροχόπτωση συνιστάται η επανάληψη του ψεκασμού.
- ✓ Να διαβάζετε και να εφαρμόζετε πιστά τις οδηγίες χρήσης που αναγράφονται στην ετικέτα των φυτοπροστατευτικών προϊόντων.

Όλα τα δελτία μας τα βρίσκετε στο διαδίκτυο (**www.minagric.gr**).

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

ΣΤ. ΤΣΟΛΗ