



ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΩΝ
ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΝΑΥΠΛΙΟΥ
Ταχ. Δ/ση: Παραλιακή οδός Ναυπλίου Νέας Κίου
Τ.Κ. 21100
Τηλ.: 27520 26241 Fax.: 27520 27629



- Η σωστή χρήση φυτοφαρμάκων είναι η αποτελεσματικότερη φυτοπροστασία.
- Η καλύτερη γεωργία είναι η σωστή διαχείριση της φύσης.

Πληροφορίες: Α. Μπαλωμένου

37/23-7-18

ΑΜΠΕΛΙ

1.ΕΥΔΕΜΙΔΑ

Διαπιστώσεις: Ξεκίνησε νέα πτήση του εντόμου στις μεσοπρώιμες περιοχές (Καλέτζι, Στιμάγγα, Κούτσι κλπ). Επακόλουθο των προσβολών, αυτής της γενιάς, είναι οι σήψεις.

Οδηγίες: Επέμβαση στις ανωτέρω περιοχές, καθώς και σε πρώιμα κλαδεμένους αμπελώνες των μεσοπρώιμων περιοχών, επιλέγοντας έναν από τους παρακάτω τρόπους:

Φυτ/κά **Α. Άμεσα με Φενοξικάρμπ -20 μέρες.**

προϊόντα: **Β. Μέχρι τις 25 Ιουλίου :**

{ Μεθοξυφenoζάιντ -14 μέρες για οιν/μα & 7 μέρες για επιτρ.},

{ Τεμπουφenoζάιντ -21 μέρες},

{ Χλοραντρανιλιπρόλ -30 μέρες οιν/μα & 3 μέρες επιτρ.}.

{ Χλοραντρανιλιπρόλ+Θιαμεθοξάμ -30 μέρες οιν/μα,14 μέρες επιτρ.}

Γ. Από 26 ως 29 Ιουλίου με:

{Άλφα υπερμεθρίν, Δελταμεθρίν, Εμαμεκτίν- μπενζοεϊτ, Λάμδα Συαλοθρίν, Σπινετοράμ, Σπινοςάντ -7 μέρες}, {Ιντοξακάρμπ -10 μέρες}, {Ετοφενπρόξ, Εσφενβαλερέϊτ, Μπέτα Συφλουθρίν, Σπινοςάντ, Συπερμεθρίν -14 μέρες}, {Ακριναθρίν+Αμπαμεκτίν, Ταυ φλουβαλινείτ, Χλωρπυριφός μεθύλ -21 μέρες}.

Είναι χρήσιμη μια ελαφριά αποφύλλωση. Η εφαρμογή του ψεκαστικού υγρού να είναι αμφίπλευρη. Η ταχύτητα των ψεκαστικών μηχανημάτων να είναι τέτοια που να επιτρέπει την καλή διασπορά του ψεκαστικού υγρού.

Στους αμπελώνες κρασοστάφυλων να γίνει επέμβαση όπου υπάρχει δεδομένο προσβολών.

2. ΨΕΥΔΟΚΟΚΚΟΣ

Οδηγίες: Συνδυασμένη καταπολέμηση με την ευδεμίδα, όπου υπάρχουν προσβολές.

Φυτ/κά *Άλφα λιπαρών οξέων -3 μέρες, {Ασεταμιπρίντ, Σπιροτετραμάτ-14 μέρες},*
προϊόντα: *Σουλφοξαλόρ -7 μέρες, Φενοξικάρμπ -20 μέρες, Χλωρπυριφός – μεθύλ -21 μέρες.*

3. ΜΥΓΑ ΜΕΣΟΓΕΙΟΥ

Διαπιστώσεις: Για το επόμενο χρονικό διάστημα ως την συγκομιδή αμπελώνες που έχουν εμφανίσει προσβολές τα προηγούμενα χρόνια, να ελέγχονται συχνά για την έγκαιρη αντιμετώπιση. ►

**Φυτ/κά
προϊόντα:**

Ασεταμιπρίντ, Δελταμεθρίν, Λάμπντα σουαλοθρίν, παγίδες Δελταμεθρίν (5-8 παγίδες/στρέμμα).

**4.ΩΙΔΙΟ
Οδηγίες:**

Από εδώ και στο εξής κίνδυνος προσβολής υπάρχει για βλαστούς, ποδίσκους και άξονες των σταφυλιών. Απαιτείται συστηματικός έλεγχος των αμπελώνων για τον έγκαιρο εντοπισμό προσβολών.

**Φυτ/κά
προϊόντα:**

Βλέπε δελτίο 36/16-7-18.

5. ΠΕΡΟΝΟΣΠΟΡΟΣ

**Διαπιστώσεις-
Οδηγίες:**

Υπάρχουν σοβαρές προσβολές στους αμπελώνες της ΠΕ Αρκαδίας και σποραδικές προσβολές στην ευρύτερη περιοχή της Νεμέας.

Στους αμπελώνες των περιοχών αυτών αμέσως μετά την προβλεπόμενη βροχόπτωση το επόμενο τριήμερο, να γίνει επέμβαση με σκεύασμα που έχει και θεραπευτική δράση.

**Φυτ/κά
προϊόντα:**

Βλέπε δελτίο 12/10-4-18.

6.ΒΟΤΡΥΤΗΣ

Οδηγίες:

Αμπελώνες που βρίσκονται σε περιοχές με υγρασία να ελέγχονται συστηματικά.

**Φυτ/κά
προϊόντα:**

Βλέπε δελτίο 31/27-6-18

7.ΞΗΡΑΝΣΗ ΡΑΧΗΣ- ΟΞΙΝΗ ΣΗΨΗ

Οδηγίες: Βλέπε δελτίο 36/16-7-18.

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ:

- Οι ημέρες που αναφέρονται δίπλα στις δραστικές ουσίες είναι το χρονικό διάστημα που πρέπει να μεσολαβήσει από την τελευταία επέμβαση έως τη συγκομιδή.**
- Οι επεμβάσεις κοντά στη συγκομιδή εμπεριέχουν κινδύνους εύρεσης υπολειμμάτων άνω των επιτρεπόμενων ορίων στα σταφύλια. Να τηρούνται αυστηρά τα χρονικά όρια που αναφέρονται στην ετικέτα, μεταξύ τελευταίας επέμβασης και συγκομιδής. Λόγω της πρωιμότητας απαιτείται φέτος ιδιαίτερη προσοχή.
- Να διαβάζετε και να εφαρμόζετε πιστά τις οδηγίες χρήσης που αναγράφονται στην ετικέτα των φυτοπροστατευτικών προϊόντων.
Όλα τα δελτία μας τα βρίσκετε στο διαδίκτυο www.minagric.gr

Η ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

ΣΤ. ΤΣΟΛΗ