

ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ
**ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΩΝ
& ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΧΑΪΑΣ**
Πανεπιστημίου 334
ΤΚ: 26443 ΠΑΤΡΑ, ΤΘ: 2459 ΠΑΤΡΑ
Τηλ.: 2610.224.629
Fax: 2610.623.238
Email: pkpfpatr@otenet.gr

ΑΧΑΪΑΣ
ΗΛΕΙΑΣ
ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ
ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
ΖΑΚΥΝΘΟΥ
ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ
ΙΘΑΚΗΣ

Πληροφορίες: ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΣΑΚΚΟΥΛΗ

ΕΣΠ: 4/20-6-12

ΕΣΠΕΡΙΔΟΕΙΔΗ

ΨΕΥΔΟΚΟΚΚΟΣ - ΚΟΚΚΙΝΗ ΨΩΡΑ:

Διαπιστώσεις: Μετά τα μέσα Ιουνίου παρατηρείται μία αύξηση των συλλήψεων και στα δύο έντομα, όμως ο πληθυσμός τους εξακολουθεί να παραμένει χαμηλός.

Συστάσεις: **Η καταπολέμηση είναι απαραίτητη μόνο στα δενδροκομεία που παρουσίασαν σοβαρές προσβολές την προηγούμενη χρονιά.**

Χρόνος Πρώιμες περιοχές: 27 - 30 Ιουνίου.

ψεκασμού: Μεσοπρώιμες περιοχές: 2 - 5 Ιουλίου.

Φάρμακα: Στη λίστα των εντομοκτόνων που έχει αποσταλεί.

Οι θερινοί πολτοί και τα λάδια χρησιμοποιούνται μόνο τους ή σε συνδυασμό με ένα εντομοκτόνο. Όταν χρησιμοποιούνται μόνο τους δεν καταστρέφουν τα ωφέλιμα έντομα και ενδείκνυνται για τις περιπτώσεις που εφαρμόζεται βιολογική καταπολέμηση.

Παράλληλα με τη χημική καταπολέμηση συνιστώνται κλαδέματα που συντελούν στον καλύτερο αερισμό και φωτισμό των δένδρων.

ΛΕΚΑΝΙΟ:

Διαπιστώσεις: Γενικά η παρουσία του εντόμου στα εσπεριδοειδή είναι πολύ περιορισμένη κυρίως σε δενδροκομεία υγρά, πυκνά, ακλάδευτα που δεν αερίζονται καλά.

Συστάσεις: **Μόνο εκεί που διαπιστώνονται σοβαρές προσβολές να γίνει συνδυασμένη καταπολέμηση με τον Ψευδόκοκκο ή την Κόκκινη Ψώρα, στις ημερομηνίες που αναφέρονται παραπάνω.**

Φάρμακα: Στη λίστα των εντομοκτόνων που έχει αποσταλεί.

ΕΡΙΩΔΗΣ ΑΛΕΥΡΩΔΗΣ:

Διαπιστώσεις: Οι προσβολές από το έντομο δεν έχουν ακόμη εμφανιστεί.

Συστάσεις: **Να μην γίνεται καμία επέμβαση με εντομοκτόνα εφόσον δεν υπάρχει σοβαρό πρόβλημα από κάποιον άλλο εχθρό στα εσπεριδοειδή.**

Στις περιπτώσεις που διαπιστώνονται προσβολές από Ψευδόκοκκο, Κόκκινη Ψώρα ή Λεκάριο, να προτιμηθούν θερινοί πολτοί ή λάδια που δεν έχουν δυσμενείς επιπτώσεις στο παράσιτο του Εριώδη Αλευρώδη.

ΦΥΛΛΟΚΝΙΣΤΗΣ:

Συμπτώματα: Η προνύμφη του εντόμου προσβάλλει την τρυφερή βλάστηση των δένδρων, δημιουργώντας στοές. Στη συνέχεια τα φύλλα παίρνουν αργυρόχρωμη όψη και καρουλιάζουν.

Διαπιστώσεις: Προς το παρόν δεν έχουν ξεκινήσει προσβολές.

Συστάσεις: **Καλλιεργητικά μέτρα:**

1. Αποφυγή θερινών αζωτούχων λιπάνσεων.

2. Αφαίρεση και καταστροφή των λαίμαργων βλαστών που αποτελούν εστίες προσβολής.

3. Περιορισμός των αρδεύσεων στις απόλυτα αναγκαίες.

Φάρμακα:

Χημική καταπολέμηση:

Όταν ξεκινήσουν οι προσβολές, συνιστώνται επεμβάσεις κάθε 15 ημέρες κυρίως στα φυτώρια και στις νέες καλλιέργειες.

Στη λίστα των εντομοκτόνων που έχει αποσταλεί.

ΓΕΝΙΚΗ ΟΔΗΓΙΑ ΓΙΑ ΨΕΚΑΣΜΟΥΣ ΕΣΠΕΡΙΔΟΕΙΔΩΝ

Στην καλλιέργεια των εσπεριδοειδών υπάρχουν πολλοί φυσικοί εχθροί (*C. noacki*, *Eretmocerus deBacki*, *Aphytis melinus* κ.α.) οι οποίοι ρυθμίζουν ικανοποιητικά τους πληθυσμούς των βλαβερών εντόμων. Είναι λοιπόν χρήσιμο πάντα να γίνεται προσπάθεια να διατηρούνται οι πληθυσμοί τους σε μια ισορροπία.

Οι αλόγιστοι ψεκασμοί έχουν σαν συνέπεια την εξόντωση των ωφέλιμων εντόμων και κατά συνέπεια την έξαρση των βλαβερών εντόμων της καλλιέργειας.

- Ψεκασμοί πρέπει να γίνονται μόνο οι απαραίτητοι και στον καλύτερο δυνατό χρόνο.
- Μία χρήσιμη πρακτική ώστε να βοηθήσουμε στη διατήρηση των ωφέλιμων εντόμων είναι να αφήνουμε ζώνες απέκαστες. **Οι ζώνες αυτές να αποτελούν το 15-20% του συνόλου των δέντρων και να εναλλάσσονται σε διάφορα σημεία του αγροκτήματος από χρονιά σε χρονιά.**

ΣΗΜ: Ακολουθείτε τις οδηγίες των φαρμάκων.

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ
Π. ΟΡΦΑΝΟΣ
MSc/MSc ΓΕΩΠΟΝΟΣ-ΤΕΧΝ.ΤΡΟΦΙΜΩΝ