

ΕΣΠΕΡΙΔΟΕΙΔΗ

Φαινολογικά στάδια: Σε όλες τις περιοχές έχει ξεκινήσει η βλάστηση, η οποία καθυστέρησε πολύ φέτος λόγω των ιδιαίτερα χαμηλών θερμοκρασιών που επικράτησαν κατά τη διάρκεια του χειμώνα.

ΠΑΡΑΜΟΡΦΩΤΙΚΟΣ ΤΕΤΡΑΝΥΧΟΣ:

Συμπτώματα: Το άκαρι προσβάλλει κυρίως τις λεμονιές και προκαλεί σοβαρές ζημιές στα ανθοφόρα και ξυλοφόρα μάρτια, με αποτέλεσμα την εμφάνιση παραμορφωμένων φύλλων και καρπών.

Συστάσεις: **Στις περιπτώσεις που διαπιστώνονται προσβολές από την προηγούμενη χρονιά, να γίνει ψεκασμός μέχρι η νέα βλάστηση να αποκτήσει μήκος 3-5 εκ. και οπωσδήποτε πριν την άνθηση.**

Φάρμακα: 1. Φενμπουτατίν Οξάιντ

ΚΟΚΚΙΝΟΣ ΤΕΤΡΑΝΥΧΟΣ:

Διαπιστώσεις: Στα δένδροκομεία που γίνονται πολλές επεμβάσεις με εντομοκτόνα συχνά παρατηρούνται προσβολές από Κόκκινο τετράνυχο.

ΨΕΚΑΣΜΟΣ ΣΤΙΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΠΟΥ ΔΙΑΠΙΣΤΩΝΟΝΤΑΙ ΠΡΟΣΒΟΛΕΣ.

Συστάσεις:	1. Ασεκουινοσίλ (εκτός λεμονιάς)	4. Πυρινταμπέν (μόνο	6. Τεμπουφενπυρέιντ
Φάρμακα:	2. Κλοφεντεζίν (σε συνδυασμό με ένα ακμαιοκτόνο ακαρεοκτόνο)	πορτοκαλιά)	7. Φενμπουτατίν Οξάιντ
	3. Μιλμπεμεκτίν (εκτός λεμονιάς)	5. Σπιροντικλοφέν (εκτός	8. Φενπυροζιμέιτ
		μανταρινιάς)	

ΕΡΙΩΔΗΣ ΑΛΕΥΡΩΔΗΣ - ΦΥΛΛΟΚΝΙΣΤΗΣ:

Συστάσεις: Αυτή την εποχή δεν συνιστάται καμιά χημική επέμβαση, παρά μόνον καλλιεργητικά μέτρα για περιορισμό της φυλλικής επιφάνειας, όπως αφαίρεση των λαίμαργων και προσβεβλημένων βλαστών καθώς και αποφυγή υπερβολικών αζωτούχων λιπάνσεων.

ΚΑΠΝΙΑ:

Συστάσεις, Φάρμακα: Στα δένδροκομεία που έχει δημιουργηθεί Καπνιά (μαυρίλα) από προσβολές του Εριώδη αλευρώδη ή διάφορων κοκκοειδών, χρειάζεται να γίνει ψεκασμός πριν την άνθηση με ένα χαλκούχο σκεύασμα.

ΣΗΜ 1: Ακολουθείτε τις οδηγίες των φαρμάκων.

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
Π. ΟΡΦΑΝΟΣ
MSc/MSc ΓΕΩΠΟΝΟΣ-ΤΕΧΝ.ΤΡΟΦΙΜΩΝ