

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΠΕΛΟΠΟΝΗΣΟΥ ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ & ΙΟΝΙΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΩΝ & ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΧΑΪΑΣ

Τηλ. Κέντρο Δηλητηριάσεων: 210-77.93.777

Πάτρα, 29/03/2017

Πληρ.: Δρ. Γεώργιος Χρ. Λυκοκανέλλος
Τηλ: 2610-224629 , e: pkax-gp@otenet.gr

Φυτοπροστατευτικά προϊόντα (μυκητοκτόνα) με έγκριση στην καλλιέργεια της ελιάς

Εγγυημένη Σύμβαση	Γλοιοσπώριο	Καρκίνωση	Κυκλοκόνιο	Σηψιρριζίες	Δράση	Χημική Ομάδα	Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο / μεσοδιάστημα επεμβάσεων	Τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή (Ημέρες)	Παρατηρήσεις
					Προληπτική, Θεραπευτική				
Copper oxide Ανόργανα άλατα χαλκού			•		Π	Μεταλλικός χαλκός σε μορφή υποξειδίου του χαλκού	2	21	
Bordeaux mixture Ανόργανα άλατα χαλκού	•	•	•		Π	Μεταλλικός χαλκός σε μορφή βορδιγάλειου πολτού	2	21	
Copper hydroxide Ανόργανα άλατα χαλκού	•	•	•		Π	Μεταλλικός χαλκός σε μορφή υδροξειδίου του χαλκού	2	21	
Copper oxychloride Ανόργανα άλατα χαλκού	•	•	•		Π	Μεταλλικός χαλκός σε μορφή οξυχλωριούχου χαλκού	2	21	
Tribasic copper sulfate Ανόργανα άλατα χαλκού	•	•	•		Π	Μεταλλικός χαλκός σε μορφή τριβασικού θειϊκού χαλκού	2	21	
Difenoconazole (ντιφεκοναζόλ)			•		Π, Θ	Τριαζόλες	2 / 14	30	
Dodine (ντοντίν)	•		•		Π, Θ	Γουανιδίνες	2 / 7	15	
Mancozeb (μανκοζέμπ)			•		Π	Διθειοκαρβαμιδικά	1	21	<u>ΕΚΤΟΣ</u> των ποικιλιών «Καλαμών» και «Κορωνέϊκη»
Kresoxim methyl (κρεσοξιμ-μεθύλ)			•		Π, Θ	Στρομπιλουρίνες	2 (βρώσιμη) 3 (ελαιοποίηση)	**	** Τελευταία επέμβαση: - Βρώσιμες ποικιλίες: Πριν την άνθηση - Ελαιοποιήσιμες ποικιλίες : 30 ημέρες
Trifloxystrobin (τριφλοξιστρομπίν)			•		Π, Θ	Ομάδα δρώντος QoIs	2	14	Φθινόπωρο: <u>μόνο</u> μία εφαρμογή
Tebuconazole (τεμπουκοναζόλ)			•		Π, Θ	Τριαζόλες	1	Δ.Ε.	

Εγγυημένη Σύμβαση	Γλοιστόριο	Καρκίνωση	Κυκλοκόνιο	Σηψιρριζίες	Δράση	Χημική Ομάδα	Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο / μεσοδιάστημα επεμβάσεων	Τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή (Ημέρες)	Παρατηρήσεις
					Προληπτική, Θεραπευτική				
Tebuconazole + Trifloxystrobin			•		Π, Θ	Συνθετικό παράγωγο φυσικών στρομπιλουρινών	1	Δ.Ε.	Προληπτική εφαρμογή - από την έναρξη της βλάστησης μέχρι την άνθηση
Trichoderma (τριχοδερμα)				•	Π	Σκεύασμα με βάση από επιλεγμένα στελέχη μυκήτων με ανταγωνιστική δράση σε εδαφογενείς φυτοπαθογόνους μύκητες εδάφους	2	3	Ειδικότερη εφαρμογή : • <u>Πριν και κατά τη μεταφύτευση</u> • <u>Σε εγκατεστημένες φυτείες</u>
Pyraclostrobin (πυρακλостρομπίν)	•		•		Π, Θ	Στρομπιλουρίνες (μεθόξυ-καρβαμιδικά)	3 / 21	28	• <u>Μόνο σε επιτραπέζιες ποικιλίες</u> • <u>Άνοιξη</u> : 1-2 εφαρμογές, μέχρι το 10% του τελικού μεγέθους καρπών. • <u>Φθινόπωρο</u> : μόνο μία εφαρμογή

Ο πίνακας είναι ενδεικτικός και υπόκειται σε τροποποιήσεις (Καν. 1107/2009 ΕΕ).

Για την προστασία του χρήστη, του καταναλωτή και του Περιβάλλοντος: Διαβάστε σχολαστικά τις ετικέτες στις συσκευασίες των Φυτοπροστατευτικών Προϊόντων (ΦΠ).

Τηρείτε πιστά και εφαρμόζετε με σύνεση τα ΦΠ, σύμφωνα πάντα με τις οδηγίες χρήσης και τους Κανόνες Ορθής Γεωργικής Πρακτικής. Συνδυαστική χρήση καλλιεργητικών τεχνικών, φυσικών και βιολογικών μεθόδων, περιορίζει τις προσβολές και μειώνει τον αριθμό των εφαρμογών στις απολύτως απαραίτητες. Εφαρμόζετε εναλλαγή μεταξύ των ΦΠ (διαφορετικές χημικές ομάδες) όπου αυτό είναι δυνατό, με σκοπό την αποφυγή στην ανάπτυξη ανθεκτικότητας. Διαχειριστείτε τις κενές συσκευασίες με σεβασμό προς το περιβάλλον.

Για νέες εγκρίσεις, τροποποιήσεις ή ανακλήσεις ΦΠ, μπορείτε να ενημερώνεστε και από την ιστοσελίδα του Υπ.Α.Α.Τ. (<http://1click.minagric.gr:8080/oneClickUI/frmFytoPro.zul>).