



# ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ - ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Μηλιά - Αχλαδιά - Ροδακινιά - Αμπέλι - Ελιά

Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ  
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΩΝ & ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ  
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΟΛΑ ΤΑ ΔΕΛΤΙΑ ΜΑΣ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ  
([www.minagric.gr](http://www.minagric.gr) και [www.agrotypos.gr](http://www.agrotypos.gr))

Τ.Θ. 436 570 01 Θέρμη  
Τηλ. 2310 476662  
pkrfpet1@otenet.gr

**Νο 13 / 11 Μαΐου 2011**

Βάιος Πολυμέρου  
Ευγενία Μακρίδου

**ΙΣΧΥΕΙ ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ**

## ΠΥΡΗΝΟΚΑΡΠΑ - ΜΗΛΟΕΙΔΗ

### ΦΥΛΛΟΔΕΤΗΣ

Σε όσους οπωρώνες δεν έγινε, ή έγινε ανεπιτυχώς η καταπολέμηση, όπως συστήθηκε με τα Δελτία μας Νο4/2-3-2011, Νο8/6-4-2011 και Νο9/13-4-2011, και υπήρχε πρόβλημα κατά το πρώτο δεκαπενθήμερο του Απρίλη, καθώς και σε κτήματα που παρουσιάζουν κάθε χρόνο προσβολές, συνιστάται να γίνει ψεκασμός:

- Στις πεδινές – πρόιμες περιοχές

α. με ρυθμιστές [ΦΕΝΟΞΥΚΑΡΜΠ (Μηλοειδή και Ροδακινιά), ΜΕΘΟΞΥΦΕΝΟΖΑΪΝΤ] μέχρι 22 Μαΐου ή

β. με ΙΝΤΟΞΑΚΑΡΜΠ στις 20-22 Μαΐου ή

γ. με ΒΑΚΙΛΛΟ ΘΟΥΡΙΓΓΙΑΣ ή κλασσικά, ΧΛΩΡΠΥΡΙΦΟΣ και ΧΛΩΡΠΥΡΙΦΟΣ ΜΕΘΥΛ (ΜΟΝΟ για Μηλοειδή, Ροδακινιά, Νεκταρινιά, Δαμασκηλιά), ΠΥΡΕΘΡΙΝΕΣ, κ.α. στις 23 - 25 Μαΐου.

- Στις ορεινές - όψιμες περιοχές

α. με ρυθμιστές [ΦΕΝΟΞΥΚΑΡΜΠ (Μηλοειδή και Ροδακινιά), ΜΕΘΟΞΥΦΕΝΟΖΑΪΝΤ] μέχρι 28 Μαΐου ή

β. με ΙΝΤΟΞΑΚΑΡΜΠ στις 27-28 Μαΐου ή

γ. με ΒΑΚΙΛΛΟ ΘΟΥΡΙΓΓΙΑΣ ή κλασσικά, ΧΛΩΡΠΥΡΙΦΟΣ και ΧΛΩΡΠΥΡΙΦΟΣ ΜΕΘΥΛ (ΜΟΝΟ για Μηλοειδή, Ροδακινιά, Νεκταρινιά, Δαμασκηλιά), ΠΥΡΕΘΡΙΝΕΣ, κ.α. στις 29 - 31 Μαΐου

Λόγω γρήγορης ανάπτυξης του φυλλώματος αυτή την εποχή και του εύρους πτήσης του εντόμου επιβάλλεται επανάληψη του ψεκασμού μετά από 12 - 14 ημέρες για τα κλασσικά και μετά από 18 -20 ημέρες για τους ρυθμιστές.

## ΣΑΝ ΖΟΖΕ

☞ Αναμένεται η εμφάνιση των κινητών προνυμφών (έρπουσες).

☞ ΜΟΝΟ στα κτήματα που παρουσιάζουν προσβολές, να γίνει ψεκασμός στις πεδινές περιοχές 26 - 28 Μαΐου και στις ορεινές - όψιμες περιοχές 31 Μαΐου- 6 Ιουνίου.

☞ Κατάλληλα εντομοκτόνα: ΧΛΩΡΠΥΡΙΦΟΣ (ΜΟΝΟ για Μηλοειδή), ΧΛΩΡΠΥΡΙΦΟΣ ΜΕΘΥΛ (ΜΟΝΟ για Μηλοειδή, Ροδακινιά, Νεκταρινιά, Δαμασκηλιά), ΘΕΡΙΝΑ ΛΑΔΙΑ, ΦΕΝΟΞΥΚΑΡΜΠ (ΜΟΝΟ για Ροδακινιά και Μηλοειδή), ΠΥΡΙΠΡΟΞΥΦΕΝ (ΜΟΝΟ για Ροδακινιά και Μηλοειδή) κ.α.

☞ Ο ψεκασμός αυτός να επαναληφθεί μετά από 12-14 ημέρες.

**ΤΑ ΑΓΡΟΧΗΜΙΚΑ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ  
ΠΑΝΤΟΤΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΤΙΚΕΤΤΑ.**

Η Προϊσταμένη Δ/σης

Δρ. Αικατερίνη Χονδρογιάννη