



# ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ - ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Μηλιά - Αχλαδιά - Ροδακινιά - Αμπέλι - Ελιά

Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ  
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΩΝ & ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ  
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΟΛΑ ΤΑ ΔΕΛΤΙΑ ΜΑΣ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ  
([www.minagric.gr](http://www.minagric.gr) και [www.agrotipos.gr](http://www.agrotipos.gr))

Τ.Θ. 436 570 01 Θέρμη  
Τηλ. 2310 476662  
[pkpfpet1@otenet.gr](mailto:pkpfpet1@otenet.gr)

**№ 23 / 11 Αυγούστου 2011**

Βάιος Πολυμέρου  
Ευγενία Μακρίδου

## ΙΣΧΥΕΙ ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ

### **A. ΣΑΝ ΖΟΖΕ ( ΜΗΛΟΕΙΔΗ - ΠΥΡΗΝΟΚΑΡΠΑ )**

Αναμένεται η εμφάνιση των προνυμφών της γ' γενεάς. Μόνο όπου δεν έγιναν ή απέτυχαν οι προηγούμενες εφαρμογές και υπάρχει προσβολή:

- ◆ Σε οπωρώνες με σοβαρές προσβολές συνιστάται ψεκασμός:
  - α. ΠΕΔΙΝΕΣ – ΠΡΩΪΜΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ 28 - 30 Αυγούστου
  - β. ΟΡΕΙΝΕΣ - ΟΨΙΜΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ 4 - 6 Σεπτέμβρηκαι επανάληψη του ψεκασμού σε 12 - 14 ημέρες .
- ◆ Σε ελαφρότερες προσβολές να γίνει μόνο μία εφαρμογή στα πεδινά 5 - 7 Σεπτέμβρη και στα ορεινά - όψιμα 11 - 14 Σεπτέμβρη.
- ◆ Κατάλληλα φάρμακα : ΧΛΩΡΠΥΡΙΦΟΣ (Μόνο για Μηλοειδή, Ροδακινιά, Νεκταρινιά, Δαμασκηλιά), ΧΛΩΡΠΥΡΙΦΟΣ ΜΕΘΥΛ (Μόνο για Μηλοειδή, Ροδακινιά, Νεκταρινιά), ΘΕΡΙΝΑ ΛΑΔΙΑ, ΦΕΝΟΞΥΚΑΡΜΠΙ (Μόνο για Ροδακινιά και Μηλοειδή), κ.α.

### **B. ΒΑΜΒΑΚΑΔΑ ΡΟΔΑΚΙΝΙΑΣ**

Αναμένεται η εμφάνιση των προνυμφών της γ' γενεάς. Μόνο όπου δεν έγιναν ή απέτυχαν οι προηγούμενες εφαρμογές:

- ◆ Σε οπωρώνες με σοβαρές προσβολές συνιστάται ψεκασμός:
  - α. ΠΕΔΙΝΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ 18 - 20 Αυγούστου
  - β. ΟΡΕΙΝΕΣ - ΟΨΙΜΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ 24 - 26 Αυγούστουκαι επανάληψη του ψεκασμού σε 12 - 14 ημέρες .
- ◆ Σε ελαφρότερες προσβολές συνιστάται μόνο ένας ψεκασμός στα πεδινά 25 - 27 Αυγούστου και στα ορεινά - όψιμα 1 - 3 Σεπτέμβρη.
- ◆ Κατάλληλα φάρμακα: ΧΛΩΡΠΥΡΙΦΟΣ, ΧΛΩΡΠΥΡΙΦΟΣ ΜΕΘΥΛ, ΦΕΝΟΞΥΚΑΡΜΠΙ, ΘΕΡΙΝΑ ΛΑΔΙΑ, κ.α.

**ΣΗΜ.:** Εάν γίνει ψεκασμός είτε για το Σαν Ζοζέ είτε για τη Βαμβακάδα με ΦΕΝΟΞΥΚΑΡΜΠΙ, αρκεί μόνο μία εφαρμογή .

### **Γ. ΣΚΟΛΥΤΗΣ :**(Κερασιά, Βερυκοκκιά, Ροδακινιά, Μηλιά).

- ◆ Συνιστάται κλαδοκάθαρο και απομάκρυνση και καύση των προσβεβλημένων μέχρι αρχές Σεπτεμβρίου, καθώς και ψεκασμός 10-15 Σεπτεμβρίου με κατάλληλο αγροχημικό. Εάν υπάρχει σοβαρή προσβολή ο ψεκασμός να επαναληφθεί σε 12-14 ημέρες.

### **Δ. ΜΗΛΟΛΟΝΘΕΣ:** (Αχλαδιά, μηλιά, ροδακινιά).

- ◆ Όπου σημειώθηκαν ζημιές από μηλολόνθες συνιστάται καταπολέμηση των νεαρών προνυμφών στα τέλη Αυγούστου με κατάλληλο αγροχημικό.
- ◆ ΤΡΟΠΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ: Ψεκασμός σε όλη την επιφάνεια και ενσωμάτωση με ελαφρό σβάρνισμα ή διασπορά με το νερό του ποτίσματος. (Αν εφαρμοστεί στη γραμμή φύτευσης και σε λωρίδες πλάτους 1 μέτρου εκατέρωθεν, χρειάζεται η μισή δόση εντομοκτόνου).

**E. ΑΡΓΥΡΟΦΥΛΛΙΑ & ΑΛΛΟΙ ΜΥΚΗΤΕΣ ΤΟΥ ΞΥΛΟΥ (Ροδακινιά)**

- ◆ Παρατηρούνται σοβαρές και εκτεταμένες προσβολές από μύκητες που προσβάλλουν το ξύλο στις περιοχές Βέροιας, Νάουσας, Σκύδρας, Έδεσσας, Γιαννιτσών κυρίως από τα γένη Stereum, Ganoderma, Trametes, Polyporus.
- ◆ Συνιστάται η αφαίρεση των ξερών-προσβεβλημένων και των καρποφοριών του μύκητα και η απομάκρυνση και καύση τους πριν αρχίσει η απελευθέρωση των σπορίων το Σεπτέμβριο. Απαραίτητη είναι η απολύμανση και η προστασία των πληγών.
- ◆ Λεπτομερείς οδηγίες για χειμερινούς χειρισμούς θα δοθούν σε επόμενο δελτίο.

**ΠΡΟΣΟΧΗ:** Τα αγροχημικά πρέπει να χρησιμοποιούνται σύμφωνα με τις οδηγίες της ετικέτας και με απόλυτη συμμόρφωση στην τελευταία ημερομηνία ψεκασμού πριν τη συγκομιδή.

Η Προϊσταμένη Δ/σης α/α

Πολυμέρου Βάϊος