



ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ - ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Μηλιά - Αχλαδιά - Ροδακινιά - Αμπέλι - Ελιά

Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΩΝ & ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΟΛΑ ΤΑ ΔΕΛΤΙΑ ΜΑΣ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
(www.minagric.gr και www.agrotypos.gr)

Τ.Θ. 436 570 01 Θέρμη
Τηλ. 2310 476662
pkpfpet1@otenet.gr

№ 28 / 20 Αυγούστου 2012

Βάιος Πολυμέρου
Ευγενία Μακρίδου

ΙΣΧΥΕΙ ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ

A. ΣΑΝ ΖΟΖΕ (ΜΗΛΟΕΙΔΗ - ΠΥΡΗΝΟΚΑΡΠΑ)

Αναμένεται η εμφάνιση των προνυμφών της γ' γενεάς. Μόνο όπου δεν έγιναν ή απέτυχαν οι προηγούμενες εφαρμογές και υπάρχει προσβολή:

- ◆ Σε οπωρώνες με σοβαρές προσβολές συνιστάται ψεκασμός:
 - α. ΠΕΔΙΝΕΣ – ΠΡΩΪΜΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ 11 - 12 Σεπτεμβρίου
 - β. ΟΡΕΙΝΕΣ - ΟΨΙΜΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ 15 - 16 Σεπτεμβρίουκαι επανάληψη του ψεκασμού σε 12 - 14 ημέρες .
- ◆ Σε ελαφρότερες προσβολές να γίνει μόνο μία εφαρμογή στα πεδινά 18 - 19 Σεπτεμβρίου και στα ορεινά - όψιμα 22 - 24 Σεπτεμβρίου.
- ◆ Κατάλληλα φάρμακα : ΧΛΩΡΠΥΡΙΦΟΣ, ΧΛΩΡΠΥΡΙΦΟΣ ΜΕΘΥΛ, ΘΕΡΙΝΑ ΛΑΔΙΑ, ΦΕΝΟΞΥΚΑΡΜΠΙ, κ.ά.
- ◆ ΣΗΜ.: Εάν γίνει ψεκασμός είτε για το Σαν Ζοζέ είτε για τη Βαμβακάδα (ΔΕΛΤΙΟ Νο27/14-8-12) με ΦΕΝΟΞΥΚΑΡΜΠΙ, αρκεί μόνο μία εφαρμογή .

B. ΣΚΟΛΥΤΗΣ : (Κερασιά, Βερυκοκκιά, Ροδακινιά, Μηλιά).

- ◆ Συνιστάται κλαδοκάθαρο και απομάκρυνση και καύση των προσβεβλημένων μέχρι αρχές Σεπτεμβρίου, καθώς και ψεκασμός 10-15 Σεπτεμβρίου με κατάλληλο αγροχημικό. Εάν υπάρχει σοβαρή προσβολή ο ψεκασμός να επαναληφθεί σε 12-14 ημέρες.

Γ. ΜΗΛΟΛΟΝΘΕΣ: (Αχλαδιά, μηλιά, ροδακινιά).

- ◆ Όπου σημειώθηκαν ζημιές από μηλολόνθες συνιστάται καταπολέμηση των νεαρών προνυμφών στα τέλη Αυγούστου - αρχές Σεπτεμβρίου με κατάλληλο αγροχημικό.
- ◆ ΤΡΟΠΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ: Ψεκασμός σε όλη την επιφάνεια και ενσωμάτωση με ελαφρό σβάρνισμα ή διασπορά με το νερό του ποτίσματος. (Αν εφαρμοστεί στη γραμμή φύτευσης και σε λωρίδες πλάτους 1 μέτρου εκατέρωθεν, χρειάζεται η μισή δόση εντομοκτόνου).

Α. ΑΡΓΥΡΟΦΥΛΛΙΑ & ΑΛΛΟΙ ΜΥΚΗΤΕΣ ΤΟΥ ΞΥΛΟΥ (Ροδακινιά)

- ◆ Παρατηρούνται σοβαρές και εκτεταμένες προσβολές από μύκητες που προσβάλλουν το ξύλο στις περιοχές Βέροιας, Νάουσας, Σκύδρας, Έδεσσας, Γιαννιτσών κυρίως από τα γένη Stereum, Ganoderma, Trametes, Polyporus.
- ◆ Συνιστάται η αφαίρεση των ξερών-προσβεβλημένων και των καρποφοριών του μύκητα και η απομάκρυνση και καύση τους πριν αρχίσει η απελευθέρωση των σπορίων το Σεπτέμβριο. Απαραίτητη είναι η απολύμανση και η προστασία των πληγών.
- ◆ Λεπτομερείς οδηγίες για χειμερινούς χειρισμούς θα δοθούν σε επόμενο δελτίο.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Τα αγροχημικά πρέπει να χρησιμοποιούνται σύμφωνα με τις οδηγίες της ετικέτας και με απόλυτη συμμόρφωση στην τελευταία ημερομηνία ψεκασμού πριν τη συγκομιδή.

Η Προϊσταμένη Δ/σης
Δρ. Αικατερίνη Χονδρογιάννη