



ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ - ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Μηλιά - Αχλαδιά - Ροδακινιά - Αμπέλι - Ελιά

Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΩΝ & ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΟΛΑ ΤΑ ΔΕΛΤΙΑ ΜΑΣ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
(www.minagric.gr και www.agrotypos.gr)

Τ.Θ. 436 570 01 Θέρμη
Τηλ. 2310 476662
pkpfpet1@otenet.gr

№ 17 / 5 Ιουνίου 2012

Βάιος Πολυμέρου
Ευγενία Μακρίδου

ΑΜΠΕΛΙ (Ισχύει για τους Νομούς Θεσ/νίκης-Χαλκιδικής)

1. ΕΥΔΕΜΙΔΑ :

- α. Ξεκίνησε η δεύτερη πτήση του εντόμου.
- β. Οι καιρικές συνθήκες (θερμοκρασία - σχετική υγρασία) ευνοούν τη δραστηριότητά του.
- γ. Οι διάφορες ποικιλίες βρίσκονται στο βλαστικό στάδιο J (καρπόδεση) που είναι ευαίσθητο για προσβολές.

ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ : Να γίνει ψεκασμός :

- α. **Μέχρι 12 Ιουνίου** με ΦΕΝΟΞΥΚΑΡΜΠΙ, ΧΛΩΡΑΝΤΡΑΝΙΛΙΠΡΟΛ ή
- β. **Μέχρι 15 Ιουνίου** με ρυθμιστές (ΤΕΜΠΟΥΦΕΝΟΖΑΪΝΤ, ΜΕΘΟΞΥΦΕΝΟΖΑΪΝΤ) ή
- γ. **16 - 18 Ιουνίου** με κλασσικά εντομοκτόνα όπως : ΣΠΙΝΟΣΑΝΤ, ΙΝΤΟΞΑΚΑΡΜΠΙ, ΧΛΩΡΠΥΡΙΦΟΣ, ΧΛΩΡΠΥΡΙΦΟΣ -ΜΕΘΥΛ, ΕΜΑΜΕΚΤΙΝ ΜΠΕΝΖΟΑΤΕ (Affirm), Βάκιλλος Θουριγκίας (Διάφορα σκευάσματα με την προσθήκη 3 % ζάχαρης) κ.α.

- Συνιστάται επανάληψη του ψεκασμού μετά 12 -18 μέρες, ανάλογα με το σκεύασμα.
- Ο ψεκασμός αυτός να κατευθύνεται στα σταφύλια και το ψεκαστικό υγρό να τα καλύπτει καλά.
- Η πίεση του ψεκαστήρα να είναι μέτρια (να μην σχηματίζεται νέφος).

ΣΗΜ.: Με την επέμβαση κατά της Ευδεμίδας με ΧΛΩΡΠΥΡΙΦΟΣ και ΧΛΩΡΠΥΡΙΦΟΣ –ΜΕΘΥΛ καταπολεμείται ταυτόχρονα και ο **Ψευδόκοκκος** στα κτήματα που έχουν προσβολές.

2. ΠΕΡΟΝΟΣΠΟΡΟΣ : Σημειώθηκαν σποραδικές προσβολές. Συνιστάται η προστασία των σταφυλιών στο στάδιο J (καρπόδεση) **μόνο** σε αμπέλια που παρατηρήθηκαν κηλίδες ή επάνθιση περionoσπόρου στα φύλλα και **εφόσον** επικρατεί βροχερός καιρός. **Κατάλληλα αγροχημικά:**

ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΑ

ΧΑΛΚΟΥΧΑ
ΜΑΝΚΟΖΕΜΠΙ
ΠΡΟΠΙΝΕΜΠΙ
ΦΑΜΟΧΑΝΤΟΝ+ΜΑΝΚΟΖΕΜΠΙ

ΜΑΝΤΙΠΡΟΠΑΜΙΝΤ

και άλλα

ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΑ - ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΑ

ΣΥΜΟΞΑΝΙΑ+ΜΑΝΚΟΖΕΜΠΙ
ΣΥΜΟΞΑΝΙΑ+ΧΑΛΚΟΣ
ΠΡΟΠΙΝΕΜΠΙ+ΤΡΙΑΝΤΙΜΕΝΟΛ
ΣΥΜΟΞΑΝΙΑ+ΦΑΜΟΧΑΝΤΟΝ

ΙΠΡΟΒΑΛΙΚΑΡΜΠΙ+ΧΑΛΚΟΣ
ΦΛΟΥΟΠΗΚΟΛΙΝΤ+ΦΟΖΕΤΥΛ-ΑΛ

ΦΟΖΕΤΥΛ-ΑΛ
ΦΟΖΕΤΥΛ-ΑΛ+ΦΟΛΠΕΤ
ΦΟΖΕΤΥΛ-ΑΛ+ΧΑΛΚΟΣ

ΦΟΖΕΤΥΛ-
ΑΛ+ΣΥΜΟΞΑΝΙΑ+ΜΑΝΚΟΖΕΜΠΙ
ΦΟΛΠΕΤ
ΦΟΛΠΕΤ+ΧΑΛΚΟΣ

και άλλα

3.ΩΙΔΙΟ: Συνιστάται η προστασία των σταφυλιών στο στάδιο J (καρπόδεση).
Κατάλληλα αγροχημικά: ΒΡΕΞΙΜΟ ΘΕΙΑΦΙ, ΝΤΙΝΟΚΑΠΗ+ΜΥΚΛΟΜΠΟΥΤΑΝΙΑ, ΤΡΙΑΝΤΙΜΕΝΟΛ, ΚΡΕΣΟΕΥΜ – ΜΕΘΥΛ, ΑΖΟΕΥΣΤΡΟΜΠΗΝ, ΚΟΥΪΝΟΕΥΦΕΝ, και άλλα.



ΕΛΙΑ (Ισχύει για τους Νομούς Θεσ/νίκης-Χαλκιδικής)

ΠΥΡΗΝΟΤΡΗΤΗΣ



- α. Η ελιά (ποικιλία Χαλκιδικής) μπαίνει στο βλαστικό στάδιο I (μέγεθος καρπού περίπου 3 χιλιοστά) που είναι ευαίσθητο για προσβολές από πυρηνοτρήτη.
- β. Η πτήση του εντόμου άρχισε σ' όλες τις περιοχές.
- γ. Οι καιρικές συνθήκες (θερμοκρασία, σχετική υγρασία) ευνοούν τη δραστηριότητα του εντόμου.
- δ. Οι πρώτες εκκολάψεις αναμένονται στις 14 - 16 Ιουνίου.

ΣΥΝΙΣΤΟΥΜΕ : Να γίνει ψεκάσμος σε ελαιοκτήματα ή περιοχές με αυξημένη συνήθως σχετική υγρασία και στα οποία για συνεχή χρόνια παρατηρούνται ζημιές από το έντομο.

Ημερομηνίες ψεκάσμου :

- α) στις **πρώιμες** παραθαλάσιες περιοχές (Κασσάνδρα, Σιθωνία) 14 - 16 Ιουνίου με κλασσικά (ΧΛΩΡΠΥΡΙΦΟΣ - ΜΕΘΥΛ, ΝΤΙΜΕΘΟΕΪΤ, ΣΥΝΘΕΤΙΚΕΣ ΠΥΡΕΘΡΙΝΕΣ) στις δόσεις που συνιστούν οι παρασκευαστές τους), εφόσον το 50% των καρπών έχει μέγεθος περίπου 3-5 χιλιοστά (μέγεθος κόκκου σίτου, Στάδιο I), διότι ο πυρηνοτρήτης δεν ωτοκεί σε ελιές μικρότερες από 3 χιλιοστά.
- β) στις **μεσοπρώιμες** και **όψιμες** περιοχές 16 - 18 Ιουνίου με κλασσικά (ΧΛΩΡΠΥΡΙΦΟΣ - ΜΕΘΥΛ, ΝΤΙΜΕΘΟΕΪΤ, ΣΥΝΘΕΤΙΚΕΣ ΠΥΡΕΘΡΙΝΕΣ) στις δόσεις που συνιστούν οι παρασκευαστές τους), και εφόσον το 50% των καρπών θα έχει μέγεθος περίπου 5-8 χιλιοστά (στάδιο I₁).

Σημ.: Ο ψεκάσμος να επαναληφθεί σε 12 - 18 ημέρες, ανάλογα με το αγροχημικό που έχει χρησιμοποιηθεί.



ΤΑ ΑΓΡΟΧΗΜΙΚΑ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΠΑΝΤΟΤΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΤΙΚΕΤΤΑ.

Η Προϊσταμένη Δ/σης α/α
 Πολυμέρου Βαϊός