



ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ - ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Μηλιά - Αχλαδιά - Ροδακινιά - Αμπέλι - Ελιά

Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΩΝ & ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΟΛΑ ΤΑ ΔΕΛΤΙΑ ΜΑΣ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
(www.minagric.gr και www.agrotypos.gr)

Τ.Θ. 436 570 01 Θέρμη
Τηλ. 2310 476662
pkpfpet1@otenet.gr

No 2 / 23 Φεβρουαρίου 2012

Βάιος Πολυμέρου
Ευγενία Μακρίδου

ΙΣΧΥΕΙ ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ

ΑΧΛΑΔΙΑ

ΨΥΛΛΑ ΤΗΣ ΑΧΛΑΔΙΑΣ

Λόγω των χαμηλών θερμοκρασιών που επικράτησαν μέσα στο Φεβρουάριο, η εξέλιξη του εντόμου επιβραδύνθηκε. Δεν παρατηρήθηκαν ακόμα ωτοκίες. Στις δειγματοληψίες που πραγματοποιήθηκαν διαπιστώθηκε ότι το 60% των θηλυκών εντόμων φέρει αυγά αλλά δεν είναι έτοιμα προς ωτοκία. Να ακολουθηθούν οι οδηγίες του Δελτίου Νο1/8-2-2012.

ΠΥΡΗΝΟΚΑΡΠΑ

A. ΜΟΝΙΛΙΑ ΠΥΡΗΝΟΚΑΡΠΩΝ

Η Μονίλια προσβάλλει τα άνθη όλων των πυρηνοκάρπων. Η ευαισθησία των διαφόρων τμημάτων έχει ως εξής:

ΕΙΔΟΣ	ΕΥΑΙΣΘΗΤΟ ΤΜΗΜΑ	ΠΡΩΤΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ (ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ)
Βερικοκκιά	Σέπαλα - Πέταλα - Ανθήρες - Στίγμα	Κόκκινο μπουμπούκι (Στάδιο C)
Κερασιά	Πέταλα - Ανθήρες - Στίγμα	Ασπρη κορυφή (Στάδιο D)
Ροδακινιά & Νεκταρινιά	Ανθήρες - Στίγμα	Ροζ κορυφή έως 5% άνθησης (Στάδιο C – D – E)
Δαμασκηλιά	Σέπαλα - Πέταλα - Ανθήρες - Στίγμα	Πράσινη κορυφή (Στάδιο C)
Αμυγδαλιά	Πέταλα - Ανθήρες - Στίγμα	Ρόδινο μπουμπούκι (Στάδιο C)

α. Οδηγίες για την πρώτη και απαραίτητη εφαρμογή στη ΒΕΡΙΚΟΚΚΙΑ έχουν ήδη δοθεί στο Δελτίο Νο1/8-2-2012.

β. Δεύτερος ψεκασμός μπορεί να χρειαστεί κατά την άνθηση, μόνο όταν ο καιρός είναι βροχερός και μόνο για τα βερίκοκκα, κεράσια, αμύγδαλα και βύσσινα.

γ. Τρίτος ψεκασμός στην πτώση των πετάλων απαιτείται σπάνια και μόνο με υγρό καιρό.


δ. Για δεύτερο ή τρίτο ψεκασμό, αν χρειαστεί, θα εκδοθεί σχετική προειδοποίηση.

Κατάλληλα αγροχημικά: ΧΑΛΚΟΥΧΑ (κατά τη διόγκωση των οφθαλμών και μέχρι τη ρόδινη κορυφή), ΚΑΙΤΑΝ, ΝΤΙΘΙΑΝΟΝ, ΘΙΡΑΜ, κ.α.

B. ΒΑΚΤΗΡΙΑΚΟ ΕΛΚΟΣ ΠΥΡΗΝΟΚΑΡΠΩΝ (Pseudomonas mors prunorum)

Σε όσα κτήματα παρουσιάζουν προσβολή, συνιστάται εφαρμογή σε συνδυασμό με την καταπολέμηση της Μονιλίας με χαλκούχο σκεύασμα.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Συνιστάται να γίνει στα πυρηνόκαρπα εφαρμογή χαλκούχων σκευασμάτων πριν την έκπτυξη των οφθαλμών για συνδυασμένη καταπολέμηση του Κορύνηου, της Μονιλίας και των Βακτηριώσεων. Με αυτή την εφαρμογή επιτυγχάνεται και περιορισμός του μολύσματος της Ανθράκωσης (Gnomonia erythrostoma) της Κερασιάς (τα προσβεβλημένα φύλλα παραμένουν στο δένδρο μετά την πτώση των υγιών το φθινόπωρο).



C	D	E	C	D	C
ΡΟΔΑΚΙΝΙΑ			ΒΕΡΙΚΟΚΚΙΑ	ΚΕΡΑΣΙΑ	ΔΑΜΑΣΚΗΝΙΑ

ΠΡΟΣΟΧΗ: Τα αγροχημικά θα πρέπει να χρησιμοποιούνται με βάση τους περιορισμούς που έχουν στις διάφορες καλλιέργειες (έγκριση και βλαστικά στάδια των καλλιεργειών).

Η Προϊσταμένη Δ/σης
Δρ. Αικατερίνη Χονδρογιάννη