



ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ - ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Μηλιά - Αχλαδιά - Ροδακινιά - Αμπέλι - Ελιά

Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΩΝ & ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΟΛΑ ΤΑ ΔΕΛΤΙΑ ΜΑΣ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
(www.minagric.gr και www.agrotypos.gr)

Τ.Θ. 436 570 01 Θέρμη
Τηλ. 2310 476662
pkpfpet1@otenet.gr

No 13 / 7 Μαΐου 2012

Βάιος Πολυμέρου
Ευγενία Μακρίδου

ΙΣΧΥΕΙ ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ

A. ΑΝΑΡΣΙΑ ΡΟΔΑΚΙΝΙΑΣ

Αρχισε η πρώτη πτήση του εντόμου σε όλες τις περιοχές και συνεχίζεται η πτήση της καρπόκαψας της ροδακινιάς.

- Η Ανάρσια είναι σπουδαιότερος εχθρός της ροδακινιάς σε σχέση με την Καρπόκαψα για την περιοχή μας. Η αντιμετώπιση της Καρπόκαψας της ροδακινιάς θα γίνει σε συνδυασμό με της Ανάρσιας.
- Οι πρώτες εκκολάψεις της γενιάς αυτής αναμένονται στις 13 - 15 Μαΐου.
- Η ζημιά είναι δύο ειδών:
 - α. προσβολή των κορυφαίων βλαστών (βλαστορύκτες)
 - β. προσβολή των καρπών

- Η προσβολή στους βλαστούς είναι σημαντική συνήθως μόνο στα φυτώρια και στις νέες φυτείες.

- Η προσβολή των καρπών αρχίζει να γίνεται σημαντική στην αρχή της ανάπτυξης του χρώματος, περίπου 4 εβδομάδες πριν τη συγκομιδή.

ΕΚΤΙΜΗΣΗ: Αν στην καλλιέργεια παρατηρήθηκαν πάνω από 3-4 κορυφές σε κάθε δένδρο με προσβολή από τη γενιά που διαχείμασε, τότε κρίνεται απαραίτητη η καταπολέμηση.

ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ:

1. Από σήμερα έως 12 Μαΐου με ΧΛΩΡΑΝΤΡΑΝΙΛΙΠΡΟΛ (σκεύασμα CORAGEN), ΝΤΙΦΛΟΥΜΠΙΕΝΖΟΥΡΟΝ
 2. 12 - 13 Μαΐου να χρησιμοποιηθούν σκευάσματα Βάκιλλου της Θουριγκίας (με επανάληψη στις 7 ημέρες), ΙΝΤΟΞΑΚΑΡΜΠ **ή**
 4. 13 - 15 Μαΐου κλασσικά εντομοκτόνα, όπως ΧΛΩΡΠΥΡΙΦΟΣ, ΧΛΩΡΠΥΡΙΦΟΣ ΜΕΘΥΛ, ΣΠΙΝΟΖΑΝΤ, κ.α.
- ΣΗΜΕΙΩΣΗ :** Ο ψεκασμός να επαναληφθεί μετά από 12 - 18 ημέρες, ανάλογα με το αγροχημικό.

B. ΑΦΙΑΕΣ (ΡΟΔΑΚΙΝΙΑ)

Σημειώνεται γενικά μια έξαρση των προσβολών. ΣΥΝΗΘΩΣ οι ψεκασμοί για καρπόκαψα - βαμβακάδα - φυλλοδέτη κτλ., τις ελέγχουν ικανοποιητικά. **ΜΟΝΟ** σε σοβαρές προσβολές συνιστάται ξεχωριστή καταπολέμηση με *ΙΜΙΝΤΑΚΛΟΠΡΙΝΤ*, *ΑΚΕΤΑΜΙΠΡΙΝΤ*, *ΧΛΩΡΠΥΡΙΦΟΣ ΜΕΘΥΛ*, *ΘΙΑΜΕΘΟΞΑΜ*, *ΚΛΟΘΙΑΝΙΝΤΙΝ*, κ.α.

Γ. ΘΡΙΠΕΣ (ΝΕΚΤΑΡΙΝΙΑ - ΔΑΜΑΣΚΗΝΑ)

Οπου παρατηρούνται αυξημένοι πληθυσμοί (συνιστάται η χρήση χρωματικών παγίδων για τον έλεγχο) και συνήθως παρατηρούνται ζημιές, να γίνει συνδυασμένη καταπολέμηση με την Ανάρσια στα ροδάκινα και με την Καρπόκαψα για τα δαμάσκηνα.

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Στα Δελτία του Π.Κ.Π.Φ.Π.Ε. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Νο 8 & Νο 9 προτείνεται από λάθος η δραστική ουσία «ΜΠΙΦΕΝΘΡΙΝ» για την καταπολέμηση της Βαμβακάδας στη Ροδακινιά. Η συγκεκριμένη δραστική ουσία έχει πλέον ανακληθεί και δεν επιτρέπεται η χρήση της.

**ΤΑ ΑΓΡΟΧΗΜΙΚΑ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ
ΠΑΝΤΟΤΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΤΙΚΕΤΤΑ.**

Η Προϊσταμένη Δ/σης α/α
Πολυμέρου Βάϊος