



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ  
ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ  
ΑΓΡ/ΚΗΣ ΟΙΚ/ΜΙΑΣ ΚΑΙ ΚΤΗΝ/ΚΗΣ  
Δ/ΝΣΗ ΑΓΡ/ΚΗΣ ΟΙΚ/ΜΙΑΣ & ΚΤΗΝ/ΚΗΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΕΒΡΟΥ  
ΤΜΗΜΑ ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ & ΦΥΤ/ΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

Ορεστιάδα 22 /07/2014

Αριθ.πρωτ. 102105/8414

Ταχ. Δ/ση : Ραιδεστού 9  
Ταχ. Κώδικας: 682 00, Ορεστιάδα  
Πληροφορίες : Σ. Δερνεκζή  
Τηλέφωνο : 2552081717  
FAX : 2552021330  
2552081723  
E-mail : [u15510@minagric.gr](mailto:u15510@minagric.gr)  
: [dernektsi@pamth.gov.gr](mailto:dernektsi@pamth.gov.gr)

ΠΡΟΣ: ( ΟΠΩΣ Π.Α. )

**ΘΕΜΑ: 1<sup>ο</sup> ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΩΝ**  
**ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ ΒΑΜΒΑΚΙΟΥ 2014**

Η βαμβακοκαλλιέργεια στην περιοχή μας, βρίσκεται στο στάδιο ανάπτυξης καρποφόρων οργάνων (χτένια) και σε ελάχιστες φυτείες στην αρχή της άνθησης. Λόγω των έντονων βροχοπτώσεων από την άνοιξη μέχρι και σήμερα, παρατηρείται οψίμηση στην πλειοψηφία των βαμβακοκαλλιεργειών, με ελάχιστες εξαιρέσεις, 10 έως και 15 ημερών.

Η υπηρεσία μας, όπως κάθε χρόνο, με σκοπό την έγκαιρη ενημέρωση των παραγωγών της περιοχής ευθύνης μας, έχει τοποθετήσει παγίδες για την παρακολούθηση των πτήσεων του πράσινου και ρόδινου σκουληκιού. Με τον έλεγχο των παγίδων και των βαμβακοφυτειών διαπιστώθηκε ότι οι πτήσεις ακμαίων όσον αφορά το πράσινο σκουλήκι είναι ελάχιστες έως μηδενικές. Υπάρχουν ακμαία του ρόδινου σκουληκιού, χωρίς όμως να παρατηρούνται ζημιές στα καρποφόρα όργανα ενώ παράλληλα κάνουν την εμφάνιση τους ωφέλιμα έντομα τα οποία βοηθούν στη φυσική αντιμετώπιση των παραπάνω εχθρών του βαμβακιού.

Σύμφωνα με τα παραπάνω, συμβουλευόμαστε τους βαμβακοκαλλιεργητές της περιοχής μας, να ελέγχουν τις βαμβακοφυτείες τους για τυχόν προσβολές στα καρποφόρα όργανα των φυτών και να μην προβαίνουν σε προληπτικούς ψεκασμούς.

**Απαραίτητη προϋπόθεση για εφαρμογή χημικών ψεκασμών**, οι πληθυσμοί του πράσινου και ρόδινου σκουληκιού, να ξεπεράσουν τα κατώτατα όρια επέμβασης τα οποία είναι:

1. για το Πράσινο σκουλήκι : στάδιο ανθοφορίας – καρποφορίας – 6 - 8 νεαρές προνύμφες (σκουλήκια 1<sup>ου</sup> & 2<sup>ου</sup> σταδίου, μήκους μέχρι 1 εκατοστό) κατά μέσο όρο ανά 100 φυτά ή μια νεαρή προνύμφη κατά μέσο όρο στα φυτά γραμμής μήκους 1 ενός μέτρου.
2. για το Ρόδινο σκουλήκι : στάδιο ανθοφορίας – προσβολή 20% στα άνθη με την εμφάνιση μορφής ροζέτας

Τονίζουμε ότι, **όπου και εάν κριθεί απολύτως απαραίτητο** οι βαμβακοκαλλιεργητές να επέμβουν με χημικούς ψεκασμούς, αυτοί θα πρέπει να πραγματοποιηθούν αργά τη νύχτα για να είναι αποτελεσματικοί (00:00 – 3:00) και σε κάθε περίπτωση με τα εγκεκριμένα φυτοπροστατευτικά προϊόντα.

**ΜΕΠ**  
**Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ**

**ΔΑΔΟΥΣΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ**

## ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ

1. Γραφείο Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Έβρου  
Καραολή & Δημητρίου 40  
Αλεξανδρούπολη
2. Γενική Διεύθυνση Περιφερειακής Αγροτικής  
Οικονομίας και Κτηνιατρικής ΠΑΜΘ  
Δημοκρατίας 1  
69100 ΚΟΜΟΤΗΝΗ
3. Δήμοι Ορεστιάδας & Διδυμοτείχου  
(για ενημέρωση των ενδιαφερόμενων)  
έδρες τους
4. Περιφερειακό Κέντρο Προστασίας Φυτών  
και Ποιοτικού Ελέγχου Καβάλας,  
Αγ. Λουκάς-Τέρμα Αμυνταίου  
65110 Καβάλα.
5. Καταστήματα περιοχής ευθύνης μας  
έδρες τους