

Γ Ε Ω Ρ Γ Ι Κ Ε Σ Π Ρ Ο Ε Ι Δ Ο Π Ο Ι Η Σ Ε Ι Σ
ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ * ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ

**ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ**

**ΠΕΡ/ΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
ΦΥΤΩΝ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ
ΒΟΛΟΥ**

Ταχ. Δ/ση: Τορούτζια-Νικολαΐδη 38334

Βόλος

**Τηλέφωνο: 24210 66525 Fax : 24210
69545**

**Πληροφορίες: Msc I. Παππά
Δρ. Θ. Μόσχος**

Η αλόγιστη χρήση φυτοφαρμάκων :

- βλάπτει την υγεία των καταναλωτών
- επιβαρύνει το περιβάλλον
- αυξάνει το κόστος παραγωγής

ΠΥΡΗΝΟΚΑΡΠΑ Νο 4 /30.05.2011

ΠΥΡΗΝΟΚΑΡΠΑ

ΕΝΤΟΜΟΛΟΓΙΚΕΣ ΑΣΘΕΝΕΙΕΣ

ΚΑΡΠΟΚΑΨΑ - ΑΝΑΡΣΙΑ (Ροδακινιά, Νεκταρινιά, Βερικοκιά)

Η πρώτη πτήση και των δύο εντόμων είναι σε εξέλιξη. Οι προνύμφες που εκκολάπτονται προσβάλλουν αρχικά την νεαρή βλάστηση και στην συνέχεια τους καρπούς. Συστήνεται ψεκασμός με ένα κατάλληλο και εγκεκριμένο για την καλλιέργεια εντομοκτόνο. Ο ψεκασμός αποβλέπει στην εξόντωση των ακμαίων και των νεαρών προνυμφών που εκκολάπτονται πριν αυτές εισχωρήσουν μέσα στους νεαρούς βλαστούς και στους καρπούς. Η επανάληψη του ψεκασμού θα εξαρτηθεί από το εντομοκτόνο που χρησιμοποιήθηκε, τις καιρικές συνθήκες και το ρυθμό ανάπτυξης του καρπού. Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δοθεί στο διάστημα μεταξύ τελευταίας επέμβασης και συγκομιδής.

ΦΥΛΛΟΔΕΤΗΣ (Ροδακινιά, Νεκταρινιά, Βερικοκιά)

Η πτήση των ακμαίων του εντόμου βρίσκεται σε εξέλιξη. Σε οπωρώνες όπου υπάρχει ιστορικό προσβολών, συνιστάται να γίνει ψεκασμός με ένα κατάλληλο και εγκεκριμένο για την καλλιέργεια εντομοκτόνο.

ΑΦΙΔΕΣ (ΜΕΛΙΓΚΡΕΣ) (Ροδακινιά, Νεκταρινιά, Βερικοκιά, Δαμασκηνιά, Κερασιά)

Σε οπωρώνες που διαπιστώνεται προσβολή από αφίδες να γίνεται ψεκασμός με ένα κατάλληλο και εγκεκριμένο για την καλλιέργεια εντομοκτόνο.

ΚΑΡΠΟΚΑΨΑ ΔΑΜΑΣΚΗΝΙΑΣ

Η πτήση των ακμαίων είναι εξέλιξη στην περιοχή Αρτέμιδος του νομού Μαγνησίας. Οι προνύμφες που εκκολάπτονται προσβάλλουν τους καρπούς. Συστήνεται ψεκασμός με ένα κατάλληλο και εγκεκριμένο για την καλλιέργεια εντομοκτόνο. Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δοθεί στο διάστημα μεταξύ τελευταίας επέμβασης και συγκομιδής.

ΡΑΓΟΛΕΤΙΔΑ (Κερασιά): Το έντομο αναπτύσσεται συνήθως σε μεγάλους πληθυσμούς αυτή την εποχή. Οι προνύμφες προσβάλλουν τους καρπούς στο στάδιο κατά την αλλαγή του χρώματος. Συστήνεται προληπτικός ψεκασμός στο στάδιο έναρξης αλλαγής του χρώματος, με ένα κατάλληλο και εγκεκριμένο για την καλλιέργεια εντομοκτόνο. Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δοθεί στο διάστημα μεταξύ τελευταίας επέμβασης και συγκομιδής

ΜΥΚΗΤΟΛΟΓΙΚΕΣ ΑΣΘΕΝΕΙΕΣ

ΩΪΔΙΟ: (ΡΟΔΑΚΙΝΙΑ-ΒΕΡΙΚΟΚΙΑ)

Κατά τις επιτόπιες επισκέψεις, έχουν παρατηρηθεί προσβολές από την ασθένεια. Για την προστασία των καρπών και της τρυφερής βλάστησης από την ασθένεια, συνιστάται ψεκασμός με ένα κατάλληλο και εγκεκριμένο για την καλλιέργεια μυκητοκτόνο. Οι ψεκασμοί θα πρέπει να επαναλαμβάνονται, ανάλογα με τη διάρκεια δράσης του σκευάσματος και μέχρι το τέλος της περιόδου ευαισθησίας, δηλαδή τη σκλήρυνση του πυρήνα και την ολοκλήρωση της ανάπτυξης των βλαστών.

ΚΟΡΥΝΕΟ (ΡΟΔΑΚΙΝΙΑ - ΝΕΚΤΑΡΙΝΙΑ - ΒΕΡΙΚΟΚΙΑ - ΚΕΡΑΣΙΑ - ΔΑΜΑΣΚΗΝΙΑ)

Κατά τις επιτόπιες επισκέψεις παρατηρήθηκαν όψιμες προσβολές από το παθογόνο. Ο υγρός και βροχερός καιρός καθώς και οι χαμηλές για την εποχή θερμοκρασίες ευνοούν την ασθένεια. Σε κτήματα που υπάρχει ιστορικό προσβολών οι ψεκασμοί με ένα κατάλληλο και εγκεκριμένο για την καλλιέργεια μυκητοκτόνο θα πρέπει να συνεχιστούν, όσο διάστημα διαρκούν αυτές οι ιδιαίτερες συνθήκες.

ΜΟΝΙΛΙΑ (ΚΕΡΑΣΙΑ)

Ο μύκητας προσβάλει τους καρπούς από πληγές (σχισίματα από έντονες βροχοπτώσεις, ακανόνιστα ποτίσματα, χαλαζόπτωση). Επειδή οι καιρικές συνθήκες ευνοούν την εμφάνιση της ασθένειας, συστήνεται προληπτικά ψεκασμός με ένα κατάλληλο και εγκεκριμένο μυκητοκτόνο. Επίσης, συστήνεται η διακοπή των ποτισμάτων μερικές μέρες πριν τη συγκομιδή.

Ακολουθείτε πιστά τις οδηγίες χρήσεως των φυτοπροστατευτικών προϊόντων

Να τηρείται με προσοχή το διάστημα μεταξύ τελευταίας επέμβασης και συγκομιδής

Όλα τα δελτία μας υπάρχουν στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Αγρ. Ανάπτυξης & Τροφίμων στο διαδίκτυο **www.minagric.gr**.

Ο Προϊστάμενος Δ/νσης

Βλειώρας Σπύρος