

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΠΕΡ/ΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΩΝ

ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΒΟΛΟΥ

Ταχ.Δ/ση:Τορούτζια-Νικολαΐδη, 38334 Βόλος

Τηλέφ.: 2421066525-Fax : 2421069545

Η αλόγιστη χρήση φυτοφαρμάκων :

- βλάπτει την υγεία των καταναλωτών
- επιβαρύνει το περιβάλλον
- αυξάνει το κόστος παραγωγής

Πληροφορίες: Δρ Θ. Μόσχος

ΑΜΠΕΛΙ: 5/06.07.2011

### **ΕΧΘΡΟΙ ΚΑΙ ΑΣΘΕΝΕΙΕΣ ΤΟΥ ΑΜΠΕΛΙΟΥ**

#### **ΩΙΔΙΟ**

Μυκητολογική ασθένεια ιδιαίτερα επικίνδυνη την περίοδο αυτή και μέχρι το στάδιο του «γυαλίσματος» των ραγών, διότι οι ζημιές που προκαλεί είναι συνήθως καταστροφικές για την καλλιέργεια. Οι καιρικές συνθήκες που επικρατούν ευνοούν τη δραστηριότητα του παθογόνου και υπάρχει σοβαρός κίνδυνος προσβολών. Συνιστάται η συνέχιση της προστασίας της καλλιέργειας από την ασθένεια σε όλες τις περιοχές, προσέχοντας πάντα να γίνεται πολύ καλή και πλήρης κάλυψη του φυλλώματος και κυρίως των σταφυλιών με το ψεκαστικό διάλυμα. Για την αποφυγή του κινδύνου εμφάνισης ανθεκτικότητας του μύκητα, θα πρέπει τα σκευάσματα που χρησιμοποιούνται να εναλλάσσονται μεταξύ τους ανάλογα με την κατηγορία στην οποία ανήκουν και τον τρόπο δράσης.

Επισημαίνεται, ότι η καταπολέμηση του ωιδίου είναι κυρίως προληπτική, δεδομένου ότι η αντιμετώπιση της ασθένειας στην περίπτωση εκτεταμένης προσβολής είναι εξαιρετικά δύσκολη, έως αδύνατη.

#### **ΠΕΡΟΝΟΣΠΟΡΟΣ**

Οι καιρικές συνθήκες ευνοούν τη δραστηριότητα του παθογόνου και υπάρχει ακόμη σοβαρός κίνδυνος μολύνσεων, ιδιαίτερα σε υγρές περιοχές.

Συνιστάται η συνέχιση της προστασίας της καλλιέργειας από την ασθένεια (ιδιαίτερα σε προσβεβλημένους αμπελώνες) με ένα κατάλληλο μυκητοκτόνο και σε συνδυασμό με την καταπολέμηση του ωιδίου.

#### **ΒΟΤΡΥΤΗΣ**

Σε αμπελώνες που βρίσκονται σε υγρές περιοχές, καθώς επίσης και σε ευαίσθητες στην ασθένεια ποικιλίες, συστήνεται επέμβαση με ένα κατάλληλο και εγκεκριμένο για την καλλιέργεια μυκητοκτόνο, πριν από το «κλείσιμο του σταφυλιού», βλαστικό στάδιο το οποίο θεωρείται ιδιαίτερα κρίσιμο για πιθανή εκδήλωση της ασθένειας.

#### **ΕΥΔΕΜΙΑ**

Στους αμπελώνες των περιοχών Τυρνάβου Ν. Λάρισας και Νέας Αγχιάλου Ν. Μαγνησίας, η δεύτερη πτήση του εντόμου βρίσκεται ακόμη σε εξέλιξη. Συστήνεται η συνέχιση της προστασίας των σταφυλιών από το έντομο, με ένα κατάλληλο και εγκεκριμένο για την καλλιέργεια εντομοκτόνο και σύμφωνα με τις οδηγίες που έχουν δοθεί στο προηγούμενο δελτίο γεωργικών προειδοποιήσεων (ΑΜΠΕΛΙ: 4/15.06.2011).

#### **ΨΕΥΔΟΚΟΚΚΟΙ**

Σε αμπελώνες της περιοχής Τυρνάβου Ν. Λάρισας διαπιστώθηκε προσβολή των σταφυλιών από προνύμφες ψευδόκοκκου. Συστήνεται άμεσα επέμβαση με ένα κατάλληλο και εγκεκριμένο για την καλλιέργεια εντομοκτόνο και σύμφωνα με τις οδηγίες που έχουν ανακοινωθεί στο προηγούμενο δελτίο γεωργικών προειδοποιήσεων (ΑΜΠΕΛΙ: 4/15.06.2011). Επισημαίνεται, ότι η επέμβαση κατά του ψευδόκοκκου καταπολεμεί ταυτόχρονα και την ευδεμίδα.

**ΣΥΣΤΑΣΗ:** Καλούνται οι καλλιεργητές, ιδίως αυτήν την εποχή, να επισκέπτονται όσο το δυνατό συχνότερα τις καλλιέργειες, προκειμένου να διαπιστώνουν έγκαιρα τυχόν προσβολές από φυτοπαράσιτα έτσι, ώστε να είναι εφικτή η αποτελεσματική αντιμετώπισή τους, με το μικρότερο οικονομικό και περιβαλλοντικό κόστος.

**ΠΡΟΣΟΧΗ:** Σε κάθε περίπτωση να τηρούνται αυστηρά οι οδηγίες χρήσης των φυτοπροστατευτικών προϊόντων για την αναλογία χρήσης, την συνδυαστικότητα, τον κίνδυνο φυτοτοξικότητας, το διάστημα μεταξύ τελευταίας επέμβασης και συγκομιδής και τα μέτρα προστασίας για την αποφυγή δηλητηρίασης.

Όλα τα δελτία μας υπάρχουν στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων στο διαδίκτυο [www.minagric.gr](http://www.minagric.gr).

Ο Προϊστάμενος Δ/σης

Βλειώρας Σπύρος