



## Γ Ε Ω Ρ Γ Ι Κ Ε Σ Π Ρ Ο Ε Ι Δ Ο Π Ο Ι Η Σ Ε Ι Σ

ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ \* ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΠΕΡ/ΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΩΝ ΚΑΙ  
ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ

Ταχ.Δ/ση: Τορούτζια-Νικολαΐδη, 38334 Βόλος

Τηλέφ.: 2421066525-Fax : 2421069545

Η αλόγιστη χρήση φυτοφαρμάκων :

- βλάπτει την υγεία των καταναλωτών
- επιβαρύνει το περιβάλλον
- αυξάνει το κόστος παραγωγής

Πληροφορίες: Αννέτα Φωτοπούλου

ΑΜΥΓΔ. : 2/09.04.2012

### ΕΥΡΥΤΟΜΟ ΑΜΥΓΔΑΛΙΑΣ

Το ευρύτομο είναι ο σημαντικότερος εχθρός της αμυγδαλιάς διότι είναι δυνατόν να προκαλέσει μεγάλη απώλεια της παραγωγής.

**Διαπιστώσεις :** Από παρατηρήσεις σε εντομολογικούς κλωβούς υπαίθρου, αναμένεται έναρξη πτήσης των ακμαίων του ευρυτόμου στις 16/4/2012 στις πρώιμες περιοχές Ν. Μαγνησίας (Ν.Αγχίαλος – Μελισσιάτικα- Σέσκλο) και μία εβδομάδα αργότερα στις όψιμες περιοχές (Κανάλια – Ριζόμυλος – Στεφανοβίκειο)

**Συστάσεις :** για την ορθολογική αντιμετώπιση του εντόμου, συνιστάται στους καλλιεργητές να συλλέγουν προσβεβλημένους καρπούς και να τους τοποθετήσουν σε μεγάλα διαφανή βάζα, το στόμιο των οποίων να καλύπτεται από τουλουπάνι ή από άλλο λεπτό ύφασμα. Το βάζο τοποθετείται μέσα στην καλλιέργεια. Ελέγχεται κάθε ημέρα. Έναρξη των ψεκασμών γίνεται αμέσως μόλις εμφανισθούν τα πρώτα ακμαία του ευρύτομου μέσα στο βάζο.

Επανάληψη των ψεκασμών ανά 7-8 ημέρες μέχρι την σκλήρυνση του ενδοκαρπίου. **Οι ψεκασμοί να γίνονται κατά τις μεσημβρινές ώρες της ημέρας, ώρες που έχουμε τη μεγαλύτερη ηλιοφάνεια και τις υψηλότερες θερμοκρασίες, διότι τότε έχουμε το μεγαλύτερο πληθυσμό ακμαίων έξω.**

**Φυτοπροστατευτικά προϊόντα :**

Deltamethrin και άλλα επιτρεπόμενα για την αμυγδαλιά φυροπροστατευτικά προϊόντα.

Όλα τα δελτία μας υπάρχουν στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων στο διαδίκτυο [www.minagric.gr](http://www.minagric.gr).

Ο Προϊστάμενος Δ/σης

Σπύρος Βλειώρας