

Γ Ε Ω Ρ Γ Ι Κ Ε Σ Π Ρ Ο Ε Ι Δ Ο Π Ο Ι Η Σ Ε Ι Σ
ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ * ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ

**ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ
ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
& ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ & ΣΤ. ΕΛΛΑΔΟΣ
ΤΜΗΜΑ: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΩΝ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ
ΕΛΕΓΧΟΥ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ
Ταχ. Δ/ση: Τορούτζια-Νικολαΐδη
Τ.Κ. 38334 Βόλος
Τηλέφωνο: 24210 66525
Fax: 24210 69545
e- mail: fyto12@otenet.gr
Πληροφορίες: Δρ. Φωτεινή Ανδρέογλου**

Η αλόγιστη χρήση φυτοφαρμάκων:
- βλάπτει την υγεία των
καταναλωτών
- επιβαρύνει το περιβάλλον
- αυξάνει το κόστος παραγωγής

ΑΚΡΟΔΡΥΑ Ν° 20 / 18-9-2015

ΦΙΣΤΙΚΙΑ

ΒΟΤΡΥΟΣΦΑΙΡΙΑ (*Botryosphaeria dothidea*)

Τα συμπτώματα της ασθένειας αυτή την εποχή είναι χαρακτηριστικά. Παρατηρούνται ξηράνσεις φύλλων (Εικ. 1 & 2), καρπών και ταξικαρπιών (Εικ. 2), καθώς και ολόκληρων κλάδων (Εικ. 3).



Εικ. 1



Εικ. 2



Εικ. 3

Τα προσβεβλημένα όργανα που απομένουν πάνω στα δένδρα αποτελούν πηγή μόλυσματος για την επόμενη καλλιεργητική περίοδο. Γι' αυτό, συνιστάται:

1. Συλλογή και καταστροφή όλων των προσβεβλημένων οργάνων πριν πέσουν τα φύλλα, γιατί τώρα διακρίνεται η προσβεβλημένη από την υγιή βλάστηση.
2. Απομάκρυνση των ξερών, πεσμένων στο έδαφος φύλλων ή ενσωμάτωσή τους με ελαφρύ φρεζάρισμα. Το μέτρο αυτό θα βοηθήσει και στην αντιμετώπιση της Σεπτορίωσης.

ΣΕΠΤΟΡΙΩΣΗ (*Septoria* spp.)

Οι φετινές καιρικές συνθήκες δεν ευνόησαν την έντονη εμφάνιση της ασθένειας. Παρόλ' αυτά, σε δενδροκομεία που δεν ψεκάστηκαν ή δεν γινόταν σωστή κάλυψη των δένδρων με το ψεκαστικό υγρό, παρατηρούνται σημαντικές προσβολές και φυλλόπτωση (Εικ. 4 & 5).



Εικ. 4



Εικ. 5

Για τον περιορισμό του πρωτογενούς μολύσματος την επόμενη καλλιεργητική περίοδο στα δενδροκομεία αυτά, συνιστάται:

1. Ψεκασμός με ένα ανόργανο χαλκούχο πριν πέσουν τα φύλλα (τέλη Σεπτεμβρίου – αρχές Οκτωβρίου).
2. Μετά την πτώση των φύλλων φρεζάρισμα και ενσωμάτωσή τους στο έδαφος.

ΣΚΟΛΥΤΗΣ (*Acrantus vestitus*)

Την εποχή που το φυτό εισέρχεται σε λήθαργο, τα ακμαία εγκαταλείπουν τις στοές διατροφής και αναζητούν εξασθενημένους βλαστούς ή κλάδους, όπου ορύσσουν στοές αναπαραγωγής, στις οποίες διαχειμάζουν.

Για την μείωση του πληθυσμού του εντόμου που διαχειμάζει, συνιστάται:

1. Άμεση αφαίρεση και καύση κάθε ξηρού, ημίξηρου ή καχεκτικού κλάδου.
2. Τοποθέτηση το φθινόπωρο κοντά στα δένδρα μερικών ξερών και ημίξηρων κλάδων, οι οποίοι ενεργούν σαν παγίδες για την ωστοκία και διαχείμαση των εντόμων. Οι κλάδοι αυτοί πρέπει να συλλέγονται και να καίγονται το Φεβρουάριο.

ΕΥΡΥΤΟΜΟ (*Eurytoma plotnikovi*)

Διαχειμάζει ως ώριμη προνύμφη μέσα σε μумιοποιημένους καρπούς πάνω στο δένδρο ή στο έδαφος. Για την μείωση του διαχειμάζοντος πληθυσμού του εντόμου, συνιστάται η επιμελής συλλογή, απομάκρυνση και καταστροφή των μумιοποιημένων καρπών.

Ένα ποσοστό των καρπών αυτών καλό είναι να ελέγχεται για την παρουσία προνυμφών στο εσωτερικό τους (Εικ.6). Οι καρποί αυτοί θα τοποθετηθούν σε πλαστικά ή γυάλινα διαφανή δοχεία την ερχόμενη άνοιξη, για τον ακριβή προσδιορισμό της εξόδου του εντόμου.



Εικ. 6

- **Ακολουθείτε πιστά τις οδηγίες χρήσεως των φυτοπροστατευτικών προϊόντων.**
- Όλα τα δελτία μας υπάρχουν στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος & Ενέργειας στο διαδίκτυο www.minagric.gr
- **Οι παραγωγοί που ενδιαφέρονται να λαμβάνουν τις γεωργικές προειδοποιήσεις για τα ακρόδρυα, παρακαλούνται να το δηλώσουν με ηλεκτρονικό μήνυμα προς την Υπηρεσία μας, στη διεύθυνση: fyto12@otenet.gr**

Ο Προϊστάμενος του Τμήματος α.α.

Δρ. Λύκας Δημήτριος