

ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ & ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΩΝ
ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ & ΦΥΤΟΪΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

Ταχ. Δ/ση: Καστοριάς 32Α, 71307 Ηράκλειο

Τηλ: 2810.282248, Fax: 2810.225616

Email: pkpfiraklio@minagric.gr

Τα δελτία αναρτώνται στην ιστοσελίδα του υπουργείου
www.minagric.gr και αποστέλλονται μέσω e-mail σε κάθε
ενδιαφερόμενο με αίτημα στο agrodeltiokriti@gmail.com



Εφαρμόζετε πιστά τις οδηγίες χρήσης των φαρμάκων.
Έτσι προστατεύετε εσείς, ο καταναλωτής και το περιβάλλον.

ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΣΤΗΝ ΕΛΙΑ


Πληροφορίες: MSc Μαρία Ζ. Ροδιτάκη

Παρατηρήσεις υπαίθρου: Δρ Αν. Παπαδάκη, Σ. Λούρου, Μ. Ροδιτάκη

No 10



Μαργαρόνια: Ενήλικα σε παγίδα φερομόνης και προνύμφη που προσβάλλει την ακραία βλάστηση και τους καρπούς.



Μαργαρόνια: Έντονη προσβολή τρυφερής βλάστησης σε αυστηρά κλαδεμένο δέντρο.

Ρυγχίτης

ΜΑΡΓΑΡΟΝΙΑ : (<i>Palpita unionalis</i>) Διαπιστώσεις: Οδηγίες:	Στις περιοχές του δικτύου παγίδευσης η δραστηριότητα του εντόμου είναι συνεχής. Οι καλοκαιρινές γενιές αλληλεπικαλύπτονται σε όλες τις ζώνες πρωιμότητας με αυξημένους πληθυσμούς ακμαίων, περισσότερο στην πρώιμη και μεσοπρώιμη ζώνη. Παρατηρούνται έντονες προσβολές σε ελαιώνες χωρίς προστασία, σε δέντρα με ζωηρή βλάστηση όπως νεαρά δενδρύλλια, δέντρα με αυστηρά ανανεωτικά κλαδέματα, αρδευόμενα. Στις περιπτώσεις αυτές οι προνύμφες αφαιρούν κομμάτια φύλλων ή αποδεκατίζουν ολόκληρα φύλλα και αφήνουν τους νεαρούς βλαστούς αποφυλλωμένους. Σε παραγωγικούς ελαιώνες εξάρσεις πληθυσμού της μαργαρόνιας επεκτείνουν τις προσβολές και στους πράσινους καρπούς προκαλώντας μεγάλα φαγώματα στη σάρκα (<i>αδειάσματα</i>), συχνά αφήνοντας μόνο τον πυρήνα. – <u>Συστήνεται συνεχής έλεγχος και προστασία με εγκεκριμένα σκευάσματα κατά των προνυμφών στα νεαρά δέντρα σε φυτώρια και νέους ελαιώνες καθώς και στα δέντρα με κλαδέματα ανανέωσης.</u> – Στους <u>παραγωγικούς ελαιώνες</u> όταν διαπιστώνονται <u>εκτεταμένες προσβολές</u> στη βλάστηση και στους καρπούς συστήνεται επέμβαση με εγκεκριμένα σκευάσματα. Οι προνύμφες όσο μεγαλώνουν γίνονται ανθεκτικές στα εντομοκτόνα. Φροντίζετε να καλύπτονται οι λαίμαργοι βλαστοί στη βάση των δέντρων.
ΡΥΓΧΙΤΗΣ : (<i>μπίμπικας</i>) (<i>Rhynchites cribripennis</i>) Διαπιστώσεις: Ενημέρωση: Οδηγίες:	Διαπιστώνονται φέτος ζημιές με ιδιαίτερη ένταση από αρκετά έντομα που προσβάλουν την ελιά. Στις περισσότερες περιπτώσεις οφείλονται σε χαμηλή θνησιμότητα των σταδίων διαχείμασης των εντόμων ως συνέπεια κλιματολογικών επιδράσεων ενός πολύ ήπιου χειμώνα. Ο ρυγχίτης είναι ανάμεσα σε αυτά, ανέπτυξε μεγάλους πληθυσμούς <u>περιστσιακά</u> και <u>κατά τόπους</u> και προξένησε <u>σοβαρές ζημιές πρόωρης καρπόπτωσης</u>. Αμέσως μετά την καρπόδεση από τα μέσα Μαΐου έως τα μέσα Ιουνίου είχε συστηθεί μέσω των Δελτίων 5^ο/7^ο/8^ο ανά ζώνη πρωιμότητας αντίστοιχα, τακτικός έλεγχος ανίχνευσης πληθυσμού του ρυγχίτη στους ελαιώνες. Λόγω της συχνότητας προσβολών που ακολούθησε έγινε σύσταση ξανά σε όλες τις ζώνες, 9^ο Δελτίο, για περιορισμό του πληθυσμού προτού αρχίσει να ωτοκεί. Περισσότερο επλήγησαν ελαιώνες με μικρή καρποφορία που δεν είχαν καμία προστασία στην περίοδο της καρπόδεσης. <u>Ολοκληρώνεται η περίοδος ωτοκίας του εντόμου, οι προνύμφες εισέρχονται στον πυρήνα και τρέφονται από το περιεχόμενό του.</u> Το φθινόπωρο αφού ωριμάσουν βγαίνουν και πέφτουν στο έδαφος όπου παραμένουν για να διαχειμάσουν για δύο χρόνια. Από την άνοιξη μέχρι τώρα η καρπόπτωση οφείλεται στις τρύπες που ανοίγει το ακμαίο με το ρύγχος του στην επιφάνεια των καρπών για να τραφεί “τροφικά βοθρία”. Η επιβίωση των μικρών πράσινων καρπών εξαρτάται από την ανοχή τους στο βαθμό προσβολής και είναι ανάλογη με το μέγεθός τους. Οι μικρότεροι καρποί δεν αντέχουν πολλά τοιμμήματα τροφικής δραστηριότητας, μαυρίζουν και πέφτουν. Αυτή την περίοδο δεν αντιμετωπίζεται πλέον ο ρυγχίτης. Επεμβάσεις καταπολέμησης άλλων εντόμων στον ελαιώνα περιορίζουν μερικώς την τροφική δραστηριότητα των ακμαίων.

- Χρησιμοποιείτε σκευάσματα φυτοπροστασίας με έγκριση στην καλλιέργεια της ελιάς. Στην ιστοσελίδα του ΥΠΑΑΤ <https://1click.minagric.gr/oneClickUI/frmFytoPro.zul> στις επιλογές: **ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΤΑ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ & ΕΝΤΟΜΟ (Ελθρό)** ή **ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΤΑ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ & ΑΣΘΕΝΕΙΑ** επιλέγοντας την καλλιέργεια της ελιάς μπορείτε να ενημερώνεστε για τα **ε γ κ ε κ ρ ι έ ν α ε ν τ ο μ ο κ τ ό ν α** και **μ υ κ η τ ο κ τ ό ν α** σύμφωνα με τις τελευταίες τροποποιήσεις εγκρίσεων.
- Διαβάζετε προσεκτικά και εφαρμόζετε τις οδηγίες που αναγράφονται στις ετικέτες των σκευασμάτων για να αποφεύγετε κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και για το περιβάλλον.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΑΚΟΚΤΟΝΙΑΣ 2026: Οι ανακοινώσεις του προγράμματος Δακοκτονίας των Διευθύνσεων Αγροτικής Ανάπτυξης και Κτηνιατρικής Χανίων, Ρεθύμνης, Ηρακλείου και Λασιθίου θα αναρτώνται στην ιστοσελίδα: <https://www.crete.gov.gr/dakoktonia>

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΔΕΛΤΙΑ ΑΡΔΕΥΣΗΣ: Μπορείτε να ενημερώνεστε για τα Εβδομαδιαία Δελτία Άρδευσης για την αρδευτική περίοδο έτους 2026 μέσω της ιστοσελίδας της Περιφέρειας Κρήτης <https://www.crete.gov.gr/category/anakoinoseis/enimerosi-agroton/nea-agroton/deltia-ardeysis-2026/>

Η Περιφέρεια Κρήτης έχει εκδώσει **Ενημερωτικό Φυλλάδιο** για την **Ορθολογική Χρήση του Νερού Άρδευσης** όπου παρέχονται αναλυτικές πληροφορίες για τις αρδευτικές ανάγκες, τα κρίσιμα στάδια ανάπτυξης καθώς και τις ενδεικτικές τιμές ελλειμματικής άρδευσης για συγκεκριμένες καλλιέργειες του Νησιού, όπως η ελιά, το αμπέλι, το αβοκάντο και τα εσπεριδοειδή. Γίνεται αναφορά στις βασικές αρχές ορθής άρδευσης, στις προτεινόμενες γεωργικές πρακτικές οι οποίες αυξάνουν την αποδοτικότητα του νερού άρδευσης και δίνονται σχετικές οδηγίες. Το φυλλάδιο είναι αναρτημένο στην ιστοσελίδα της Περιφέρειας Κρήτης στη διεύθυνση: <https://www.crete.gov.gr/wp-content/uploads/2022/06/fylladio-ardeysis.pdf>

Στον σύνδεσμο <https://www.irrigation-crete.gr/> βρίσκεται αναρτημένο το Ολοκληρωμένο σύστημα λήψης αποφάσεων για την άρδευση καλλιεργειών σε επίπεδο Κρήτης με χρήση καινοτόμων τεχνολογιών.