

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΩΝ
ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

Ταχ.Δ/ση : Μ.Γουβερνέτου 17, 71307 Ηράκλειο

Τηλ: 2810224948 ,Fax: 2810225616

Email: pkpfhgpr@otenet.gr

ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ

Χρησιμοποιείτε σωστά τα φυτοφάρμακα.
Έτσι προστατεύονται:

- Ο χρήστης
- Ο καταναλωτής
- Το περιβάλλον

Ε Χ Θ Ρ Ο Ι - Α Σ Θ Ε Ν Ε Ι Ε Σ Α Μ Π Ε Λ Ι Ο Υ
(Π Ρ Ω Ι Μ Ε Σ - Ε Ν Δ Ι Α Μ Ε Σ Ε Σ - Μ Ε Σ Ο Π Ρ Ω Ι Μ Ε Σ Π Ε Ρ Ι Ο Χ Ε Σ)


Πληροφορίες: Νίκος Ι. Μπαγκής- Μαρία Ζ. Ροδιτάκη

19.

ΕΥΔΕΜΙΔΑ : <i>Χρόνος επέμβασης:</i>	Στο δίκτυο παγίδευσης οι συλλήψεις έχουν αυξηθεί. Συνιστάται <u>επαναληπτικός ψεκασμός</u> : - Πρώιμες περιοχές, Ενδιάμεση Ζώνη, Κάτω Μεσσαρά. • Επιτραπέζια : 1 - 2 Αυγούστου • Σουλτανίνες - κρασάμπελα : 2 - 4 Αυγούστου - Μεσοπρώιμες περιοχές • Επιτραπέζια: 2 - 4 Αυγούστου • Σουλτανίνες - κρασάμπελα: 4 - 6 Αυγούστου
<i>Τρόπος επέμβασης:</i> <i>Οδηγίες :</i>	Ψεκασμός ή σκόνισμα. <u>Το φάρμακο να πηγαίνει στα σταφύλια και να τα καλύπτει.</u> Σε αμπέλια που θα τρυγηθούν σύντομα, να χρησιμοποιηθούν σκευάσματα μικρής υπολειμματικής διάρκειας. Να τηρούνται αυστηρά οι χρόνοι αναμονής μεταξύ ψεκασμού και συγκομιδής.
Τ Ζ Ι Τ Ζ Ι Κ Α Κ Ι :	Σε αμπέλια με προσβολές να γίνει συνδυασμένη αντιμετώπιση.
Ψ Ε Υ Δ Ο Κ Ο Κ Κ Ο Σ :	Στις πρώιμες, ενδιάμεσες και μεσοπρώιμες περιοχές, <u>μόνο σε επιτραπέζια σταφύλια</u> με ιστορικό προσβολών, να γίνει συνδυασμένη αντιμετώπιση με την ευδεμίδα.

<p>ΜΥΓΑ ΜΕΣΟΓΕΙΟΥ:</p> <p><i>Διαπιστώσεις:</i></p> <p><i>Οδηγίες:</i></p>	<p>Τα τελευταία χρόνια το έντομο ζημιώνει τα επιτραπέζια σταφύλια. Διάσπαρτες, αλλά σοβαρές προσβολές παρατηρούνται κάθε χρόνο σε αμπέλια της Βόρειας Κρήτης που βρίσκονται κοντά σε άλλους ξενιστές του εντόμου (πορτοκαλιές, αχλαδιές, βερικοκιές, ροδακινιές, συκιές, κ.α.).</p> <p>Συνήθως εμφανίζεται σε καλά σκιαζόμενα αμπέλια τύπου V ή κρεβατίνες με χονδρόρωγα σταφύλια. Οι προσβολές εντοπίζονται σε σταφύλια που πλησιάζουν στην ωρίμανση. Η μύγα τοποθετεί τα αυγά της στις ρώγες κάνοντας ένα χαρακτηριστικό τριγωνικό νύγμα. Οι στοές που δημιουργούν τα σκουλήκια ξεκινούν από το νύγμα, είναι επιφανειακές και ευδιάκριτες.</p> <p>Δεν υπάρχουν εγκεκριμένα σκευάσματα. Επεμβάσεις για την ευδεμίδα με σκευάσματα που έχουν δράση και σε δίπτερα πιθανόν να περιορίζουν τη δραστηριότητα της.</p>
<p>ΩΪΔΙΟ:</p>	<p>Να συνεχιστεί η προστασία των αμπελιών. Η επέμβαση μπορεί να συνδυαστεί με την καταπολέμηση της ευδεμίδας.</p>
<p>ΠΕΡΟΝΟΣΠΟΡΟΣ:</p>	<p>Συνιστάται η προστασία του φυλλώματος σε περιόδους με έντονες νυχτερινές δροσιές, συνδυασμένη με κάποια από τις παραπάνω επεμβάσεις, λαμβάνοντας πάντα υπόψη την υπολειμματική διάρκεια του φαρμάκου και τον χρόνο αναμονής πριν τη συγκομιδή.</p>
<p>ΟΞΙΝΗ ΣΗΨΗ:</p> <p><i>Οδηγίες:</i></p>	<p>Η ασθένεια εμφανίζεται στις τραυματισμένες ρώγες και μεταδίδεται με το έντομο δροσόφιλα (μύγα του ξυδιού). Ευνοείται σε συνθήκες υψηλής υγρασίας. Περισσότερο ευαίσθητα είναι τα πυκνόρωγα σταφύλια.</p> <p>Οι χημικές επεμβάσεις στα επιτραπέζια έχουν περιορισμένα αποτελέσματα. Η αντιμετώπιση βασίζεται κυρίως σε καλλιεργητικά μέτρα:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Τα σταφύλια δεν πρέπει να έχουν τραύματα από αρρώστιες, έντομα ή μηχανικές βλάβες. • Διατήρηση χαμηλής υγρασίας στο αμπέλι (περιορισμένα ποτίσματα μετά το γυάλισμα). • Καλός αερισμός των σταφυλιών. • Απομάκρυνση των προσβεβλημένων ρωγών και σταφυλιών.

ΦΑΡΜΑΚΑ: Να επιλέγονται σύμφωνα με τις λίστες φυτοπροστατευτικών προϊόντων που σας έχουμε αποστείλει. Διαβάζετε και εφαρμόζετε πιστά τις οδηγίες χρήσης.

 Το δελτίο εμφανίζεται σε ηλεκτρονική μορφή στην ιστοσελίδα: www.minagric.gr

Ηράκλειο 28 Ιουλίου 2011
Ο Προϊστάμενος Δ/σης
Τρουλλάκης Γιάννης