



ΕΧΘΡΟΙ - ΑΣΘΕΝΕΙΕΣ ΑΜΠΕΛΙΟΥ ΚΑΙ ΕΛΙΑΣ

ΑΜΠΕΛΙ (ΜΕΣΟΠΡΩΙΜΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ)

Πληροφορίες: Νίκος Ι. Μπαγκής

8.

Στις μεσοπρώιμες περιοχές, η καρπώδεια ολοκληρώνεται στην ποικιλία σουλτανίνα.

ΕΥΔΕΜΙΔΑ:	Η δεύτερη πτήση ξεκίνησε και στις μεσοπρώιμες περιοχές. Προς το παρόν καταγράφονται χαμηλοί πληθυσμοί και διαπιστώνονται αραιές ωτοκίες.
Οδηγίες:	Συνιστάται καταπολέμηση στις παρακάτω ενδεικτικές ημερομηνίες: - Μεσοπρώιμες περιοχές (όπως Αρχάνες, Δαφνές, Αγ.Μύρων, Κυπαρίσσι, Πρ.Ηλίας, Φοινικιά, Επισκοπή, Ασήμι, Γκαγκάλες κλπ) Επιτραπέζια: 1 - 3 Ιουνίου. Σταφιδάμπελα - οινάμπελα: 5 - 6 Ιουνίου. Ψεκασμός ή σκόνισμα. Το φάρμακο να καλύπτει καλά τα σταφύλια. Για τις όψιμες περιοχές θα ενημερωθείτε σε επόμενο δελτίο.
ΤΖΙΤΖΙΚΑΚΙ:	Κατά τόπους παρατηρούνται σημαντικοί πληθυσμοί. Σε αμπέλια που διαπιστώνονται προσβολές να γίνει συνδυασμένη αντιμετώπιση με την ευδεμίδα.
ΨΕΥΔΟΚΟΚΚΟΣ:	Σε <u>επιτραπέζια σταφύλια</u> μεσοπρώιμων περιοχών με προσβολές την περασμένη χρονιά να γίνει συνδυασμένη καταπολέμηση με την ευδεμίδα. <u>Να βρέχονται καλά οι κορμοί και οι βραχίονες.</u> Η αποτελεσματικότητα του ψεκασμού αυξάνει όπου έχει αφαιρεθεί το ρυτίδωμα.
ΩΙΔΙΟ:	Η σημαντικότερη ασθένεια των αμπελιών της Κρήτης. Ευνοείται ιδιαίτερα την φετινή χρονιά και διαπιστώνονται σημαντικές προσβολές σε αμπέλια. Σε αμπέλια που δεν είναι καλυμμένα να γίνει συνδυασμένη επέμβαση με την ευδεμίδα.
ΠΕΡΟΝΟΣΠΟΡΟΣ:	Καταπολέμηση μόνο σε αμπέλια που υπάρχουν συμπτώματα (κηλίδες, εξανθήσεις).

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ: Δεν επιτρέπεται η συγκομιδή αμπελόφυλλων από αμπελώνες στους οποίους έχει γίνει χρήση φυτοπροστατευτικών προϊόντων.

Συνέχεια στην πίσω σελίδα

Ε Λ Ι Α

Πληροφορίες: MSc Μαρία Ζ. Ροδιτάκη

ΒΛΑΣΤΙΚΑ ΣΤΑΔΙΑ: Στις πρώιμες περιοχές ξεκινάει το στάδιο της ξυλοποίησης του πυρήνα των καρπών. Στις μεσοπρώιμες ολοκληρώνεται η καρπόδεση με ανομοιομορφία κατά περιοχές. Οι όψιμες περιοχές βρίσκονται στο στάδιο της άνθησης - πτώσης πετάλων των ανθέων

ΠΥΡΗΝΟΤΡΗΤΗΣ: <i>Διαπιστώσεις:</i> <i>Οδηγίες:</i>	<p>Στις μεσοπρώιμες περιοχές η πτήση της καρπόβιας γενιάς του πυρηνοτρήτη ξεκίνησε στα μέσα Μαΐου και εξελίσσεται με υψηλούς πληθυσμούς στο δίκτυο παγίδευσης. Παρατηρήθηκαν ωτοκίες στους μικρούς καρπούς.</p> <p>Υπενθυμίζουμε ότι σε αυτή τη γενιά οι νεαρές προνύμφες εκκολάπτονται πάνω στον κάλυκα και κατευθύνονται μέσα στον καρπό. Στόχος της καταπολέμησης είναι η θανάτωση των προνυμφών κατά την εκκόλαψη ή λίγο μετά την εκκόλαψη.</p> <p>– Στις μεσοπρώιμες περιοχές να γίνει ένας ψεκασμός κάλυψης με κατάλληλα εγκεκριμένα εντομοκτόνα: 31 Μαΐου – 2 Ιουνίου.</p> <p><u>Μεγαλύτερη ανάγκη προστασίας έχουν ελαιώνες με μέτρια καρποφορία.</u> Για τις όψιμες περιοχές θα ενημερωθείτε σε επόμενο δελτίο.</p>
ΜΑΡΓΑΡΟΝΙΑ: <i>Συστάσεις:</i> <i>Χρόνος επέμβασης:</i>	<p>Στις όψιμες περιοχές ξεκίνησε η 1^η γενιά του εντόμου. Οι προνύμφες προσβάλουν την νεαρή ακραία βλάστηση. <u>Σε αυτή τη γενιά ανάγκη προστασίας έχουν μόνο οι νεαρές φυτείες και τα φυτώρια.</u></p> <p><u>Συνιστάται ψεκασμός μόνο στις όψιμες περιοχές: 2 - 5 Ιουνίου.</u></p>
ΡΥΓΧΙΤΗΣ: (Μπιμπικας) <i>Ζημιές:</i> <i>Οδηγίες:</i>	<p>Οι ανοιξιάτικες προσβολές είναι περιφερειακά φαγώματα στα τρυφερά φύλλα και στις βλαστικές κορυφές από τα ενήλικα. Μετά το τέλος της καρπόδεσης τρέφονται στους καρπούς και αργότερα ωτοκοούν σε αυτούς. Οι προνύμφες προσβάλουν μόνο τον πυρήνα των καρπών προκαλώντας πρόωρη καρπόπτωση το φθινόπωρο.</p> <p>Σε ελαιώνες που παρατηρήθηκαν ζημιές τα δύο προηγούμενα χρόνια και διαπιστώνονται ανοιξιάτικες προσβολές στο φύλλωμα, να γίνει ένας ψεκασμός των δέντρων <u>αμέσως μετά την ολοκλήρωση της καρπόδεσης.</u> Με την εκλογή κατάλληλου εντομοκτόνου (ντιμεθοείτ) γίνεται συνδυασμένη αντιμετώπιση με τον πυρηνοτρήτη.</p>
ΩΤΙΟΡΥΓΧΟΙ: <i>Ζημιές:</i> <i>Οδηγίες:</i>	<p>Είναι νυχτόβια σκαθάρια που ανεβαίνουν στα δέντρα από τον κορμό τις νυχτερινές ώρες. Προκαλούν αποφύλλωση, πτώση ανθοταξιών και καρπόπτωση. Χαρακτηριστικός είναι ο τρόπος που κατατρώγουν περιφερειακά τα φύλλα (πριονωτά) όπως και η καρπόπτωση που συντελείται μαζί με τον ποδίσκο του καρπού.</p> <p>Όπου παρατηρούνται έντονες προσβολές να γίνει ψεκασμός του λαιμού και των κορμών των δέντρων με ένα εγκεκριμένο για την καλλιέργεια εντομοκτόνο μεγάλης υπολειμματικής διάρκειας.</p>

ΠΡΟΣΟΧΗ: Οι επεμβάσεις κατά των εχθρών και ασθενειών του αμπελιού και της ελιάς πρέπει να γίνονται με την επιλογή των κατάλληλων φαρμάκων από τις λίστες των εγκεκριμένων δραστικών ουσιών που σας έχουμε αποστείλει.

Ηράκλειο 28 Μαΐου 2012
Ο Προϊστάμενος Δ/σης
Τρουλλάκης Γιάννης