

ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΩΝ
ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
Ταχ. Δ/ση: Καστοριάς 32Α, 71307 Ηράκλειο
Τηλ: 2810224948, Fax: 2810225616
Email: pkpfhgpr@otenet.gr



Τα δελτία διανέμονται δωρεάν στους ενδιαφερόμενους
και δημοσιεύονται στην ιστοσελίδα www.minagric.gr

Εφαρμόζετε πιστά τις οδηγίες χρήσης των φαρμάκων.
Έτσι προστατεύετε τον καταναλωτή και το περιβάλλον

ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΑ ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΡΘΗ ΣΥΓΚΟΜΙΔΗ - ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΤΗΣ ΠΑΤΑΤΑΣ (ΟΡΟΠΕΔΙΟ ΛΑΣΙΘΙΟΥ)

Φέτος, δεν υπήρξαν σοβαρά προβλήματα φυτοπροστασίας στο χωράφι (απουσία περονοσπόρου, μειωμένος δορυφόρος κ.α.). Ωστόσο, **ιδιαίτερη προσοχή** πρέπει να δοθεί **κατά τη συγκομιδή και αποθήκευση των κονδύλων** για την αποφυγή προσβολών **κυρίως από τη φθοριμαία**. Τα προτεινόμενα καλλιεργητικά μέτρα είναι:

- Η συγκομιδή της πατάτας θα πρέπει να ξεκινά όταν η φλούδα της έχει «ψηθεί» και δεν αποσπάται εύκολα από την σάρκα. Χρονικά αυτό συμβαίνει περίπου 10-15 μέρες μετά την ξήρανση του υπέργειου πράσινου μέρους των φυτών είτε με φυσικό τρόπο (γήρανση και πέσιμο των φυτών) είτε με τεχνητό (εφαρμογή εγκεκριμένου ζιζανιοκτόνου). Δεν πρέπει να γίνεται συγκομιδή ενώ υπάρχουν ακόμα πράσινα μέρη, διότι η φλούδα της πατάτας είναι ακόμα αδύνατη και αποκολλάται εύκολα.
- Ελαφριά ποτίσματα πρέπει να συνεχίζονται και μετά την ξήρανση των φυτών, τόσο για την αύξηση του βάρους των κονδύλων όσο και για τη μείωση των προσβολών στο χωράφι από φθοριμαία. Κατά τη συγκομιδή το έδαφος θα πρέπει να είναι στο ρώγο του. Δεν συγκομίζουμε σε υγρό αλλά ούτε και σε ξηρό έδαφος όπου υπάρχει κίνδυνος να τραυματιστούν οι κόνδυλοι.
- Επίσης, κατά τη συγκομιδή πρέπει να γίνεται προσεκτική διαλογή των υγιών από τους προσβεβλημένους - τραυματισμένους κονδύλους. Τα στελέχη των φυτών κι οι κόνδυλοι που θα παραμείνουν στο χωράφι θα πρέπει να παραχωθούν στο έδαφος σε βάθος τουλάχιστον 5 cm. Έτσι επιτυγχάνεται η μείωση των πληθυσμών της φθοριμαίας για την επόμενη χρονιά.
- Για τη μείωση των προσβολών από φθοριμαία κατά την αποθήκευση, θα πρέπει **οι πατάτες να διαλέγονται πριν μπουν στην αποθήκη**. Το μέτρο αυτό πρέπει να εφαρμόζεται οποσδήποτε κι είναι ιδιαίτερα σημαντικό για την περιοχή σας όπου οι αποθήκες δεν έχουν ελεγχόμενες συνθήκες θερμοκρασίας - υγρασίας. **Το έντομο πάει να δραστηριοποιείται σε θερμοκρασίες μικρότερες από 10° C**. Σε περίπτωση παρατεταμένης επικράτησης υψηλών θερμοκρασιών το φθινόπωρο μπορούν να σημειωθούν σοβαρές ζημιές. **Προληπτικά κατά την αποθήκευση να εφαρμόζεται Βάκιλλος της Θουριγγίας με σκόνισμα των κονδύλων σε στρώσεις**.
- Οι αποθήκες θα πρέπει να είναι σκοτεινές, **να καθαρίζονται σχολαστικά** πριν από την αποθήκευση των κονδύλων και **να προφυλάσσονται τα ανοίγματα με πυκνό δικτυωτό πλέγμα (σίτα)**.
- Τέλος, σε όλες τις περιπτώσεις που οι πατάτες αποθηκεύονται προσωρινά σε σωρούς στο χωράφι, καλό είναι να σκεπάζονται με πανί ή κατάλληλο χαρτί κι όχι με πατατόφυλλα.

Εικ. Προσβολή κονδύλων από καρκίνο της πατάτας (*Synchytrium endobioticum*)



Τα παραπάνω συμπτώματα αντιστοιχούν στο μύκητα *Synchytrium endobioticum* και εμφανίστηκαν στο Ν.Δράμας το 2011. Παρακαλούμε τους πατατοπαραγωγούς σε περίπτωση που διαπιστώσουν συμπτώματα των παραπάνω φωτογραφιών να επικοινωνήσουν με την υπηρεσία μας.

Ηράκλειο 9 Αυγούστου 2012
Ο Προϊστάμενος Δ/νσης
Τρουλλάκης Γιάννης