

ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΩΝ
ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
Ταχ. Δ/ση: Καστοριάς 32Α, 71307 Ηράκλειο
Τηλ: 2810224948, Fax: 2810225616
Email: pkpfhgpr@otenet.gr



Τα δελτία διανέμονται δωρεάν στους ενδιαφερόμενους
και δημοσιεύονται στην ιστοσελίδα www.minagric.gr

Εφαρμόζετε πιστά τις οδηγίες χρήσης των φαρμάκων.
Έτσι προστατεύετε τον καταναλωτή και το περιβάλλον

ΕΧΘΡΟΙ - ΑΣΘΕΝΕΙΕΣ ΑΜΠΕΛΙΟΥ ΚΑΙ ΕΛΙΑΣ

Α Μ Π Ε Λ Ι (Το δελτίο του αμπελιού αφορά μόνο μεσοπρώιμες και όψιμες περιοχές)

Πληροφορίες: Νίκος Ι. Μπαγκής

12.

<p>ΕΥΔΕΜΙΔΑ:</p> <p>Οδηγίες:</p> <p>Τρόπος επέμβασης:</p>	<p>Η δραστηριότητα του εντόμου ευνοείται από τις καιρικές συνθήκες. Στο δίκτυο παγίδευσης η πτήση της ευδεμίδας συνεχίζεται.</p> <p>– Συνιστάται επαναληπτικός ψεκασμός στις όψιμες περιοχές:</p> <p>Επιτραπέζια: 22 - 24 Ιουνίου</p> <p>Σταφιδάμπελα - κρασάμπελα: 24 - 26 Ιουνίου</p> <p>Στις μεσοπρώιμες περιοχές καταγράφονται ακόμα πληθυσμοί και ωοτοκίες της δεύτερης πτήσης που δικαιολογούν άμεση προστασία, ιδιαίτερα σε σταφύλια που προορίζονται για επιτραπέζια χρήση. Ενδεικτικές ημερομηνίες επέμβασης:</p> <p>– Μεσοπρώιμες περιοχές : 22 - 25 Ιουνίου.</p> <p>Ψεκασμός ή σκόνισμα. Το φάρμακο να κατευθύνεται στα σταφύλια.</p>
<p>Τ Ζ Ι Τ Ζ Ι Κ Α Κ Ι:</p>	<p>Σε αμπέλια με συμπτώματα να γίνει συνδυασμένη επέμβαση.</p>
<p>ΨΕΥΔΟΚΟΚΚΟΣ:</p> <p>Διαπιστώσεις:</p> <p>Οδηγίες:</p> <p>Τρόπος επέμβασης:</p>	<p>Με την άνοδο των θερμοκρασιών το τελευταίο δεκαήμερο παρατηρείται έντονη δραστηριότητα του εντόμου κάτω από το ρυτίδωμα και διαπιστώνεται μετακίνηση νεαρών και ενήλικων νυμφών προς το φύλλωμα και τα σταφύλια.</p> <p>Ελέγχετε συστηματικά τα αμπέλια που προορίζονται για επιτραπέζια χρήση. <u>Η έντονη παρουσία μυρμηγκιών προδίδει τους πληθυσμούς του.</u> Σε επιτραπέζια σταφύλια με ιστορικό προσβολών ή με εμφάνιση πληθυσμών να γίνει συνδυασμένη επέμβαση με την ευδεμίδα και οπωσδήποτε πριν το «κλείσιμο» των σταφυλιών.</p> <p>Ψεκασμός στο φύλλωμα και στα σταφύλια. Διαβροχή μέχρι απορροής στους κορμούς και στους βραχίονες.</p>
<p>ΩΙΔΙΟ:</p> <p>Οδηγίες:</p>	<p>Η έντονη παρουσία της ασθένειας στη φύση, οι ευνοϊκές καιρικές συνθήκες για την περαιτέρω εξάπλωση του και η ευαισθησία των σταφυλιών την περίοδο αυτή επιβάλλουν συνέχιση της προστασίας.</p> <p>Να γίνει συνδυασμένη επέμβαση με την ευδεμίδα.</p> <p>Υπενθυμίζεται η εναλλαγή σκευασμάτων με διαφορετικό τρόπο δράσης για την αποφυγή της ανθεκτικότητας του ωιδίου.</p>

Ε Λ Ι Α

Πληροφορίες: MSc Μαρία Ζ. Ροδιτάκη

ΛΕΚΑΝΙΟ:	Είναι κοκκοειδές που προσβάλλει βλαστούς και φύλλα της ελιάς. Ευνοείται από υψηλή σχετική υγρασία που συχνά συναντάται όταν το φύλλωμα είναι πυκνό. Έντονες προσβολές ευνοούνται σε περιοχές ιδιαίτερα υγρές το καλοκαίρι (ρεματιές, παραθαλάσσιες, κλειστές και απάνεμες περιοχές) ή σε ελαιώνες ποτιστικούς και ακλάδευτους. Στα μελιτώδη εκκρίματα του αναπτύσσονται μύκητες που προσξενούν το μαύρισμα στα φύλλα (καπινιά) με αποτέλεσμα την εξασθένηση των δέντρων. Οι προσβολές περιορίζονται με κατάλληλο κλάδεμα ώστε το εσωτερικό των δέντρων να λιάζεται και να αερίζεται και με την αποφυγή υπερβολικών ποτισμάτων και αζωτούχων λιπάνσεων.
Διαπιστώσεις:	Στις <u>πρώιμες περιοχές</u> οι εκκολάψεις αυγών των μητρικών λεκανίων ολοκληρώνονται. Σε δέντρα που παρατηρούνται σοβαρές προσβολές συνιστάται καταπολέμηση. Το λεκάνιο έχει αρκετά παράσιτα και αρπακτικά που συνήθως κρατούν τον πληθυσμό του σε χαμηλά επίπεδα. Συστήνεται να χρησιμοποιηθούν εντομοκτόνα χαμηλής τοξικότητας για την προστασία των ωφέλιμων αυτών εντόμων.
Χρόνος επέμβασης:	- Πρώιμες και παραλιακές περιοχές : 25 - 28 Ιουνίου. Μεσοπρώιμες και όψιμες περιοχές θα ενημερωθούν σε επόμενο δελτίο.
ΠΟΛΛΙΝΙΑ:	Σε ελαιώνες <u>πρώιμων και μεσοπρώιμων περιοχών</u> που διαπιστώνονται σοβαρές προσβολές να γίνει καταπολέμηση στις ίδιες ημερομηνίες με το λεκάνιο ή αν συνυπάρχουν και τα δύο κοκκοειδή να γίνει συνδυασμένη καταπολέμηση.
Οδηγίες:	Υπενθυμίζεται ότι δέντρα που θα ψεκάστούν με παραφινικό λάδι <u>πρέπει να είναι ποτισμένα μια εβδομάδα πριν τον ψεκάσμό και η θερμοκρασία δεν πρέπει να ξεπερνάει τους 32°C</u> . Η επέμβαση να γίνεται πρωινές ώρες ή αργά το απόγευμα.
ΜΑΡΓΑΡΟΝΙΑ:	Σε <u>πρώιμες και μεσοπρώιμες περιοχές</u> παρατηρείται στο δίκτυο παγίδευσης μια νέα γενιά με χαμηλούς πληθυσμούς.
Διαπιστώσεις:	Το έντομο παρουσιάζει κατά τόπους εξάρσεις πληθυσμών και ζημιών από χρονιά σε χρονιά. Το καλοκαίρι και το φθινόπωρο οι προνύμφες προσβάλουν εκτός από τα φύλλα και τους καρπούς. Η αντιμετώπιση είναι δύσκολη επειδή οι προνύμφες προστατεύονται μέσα στα τυλιγμένα φύλλα ή στη σάρκα του καρπού και επιπλέον όσο μεγαλώνουν γίνονται περισσότερο ανθεκτικές.
Συστάσεις:	Όπου παρατηρείται έντονη προσβολή στην τρυφερή βλάστηση ή και στους καρπούς να γίνει επέμβαση φροντίζοντας να λούζονται και οι λαιμαργοί στη βάση του δέντρου. Ιδιαίτερα <u>στα φυτώρια και στα νεαρής ηλικίας δέντρα</u> , η μαργαρόνια μπορεί να προκαλέσει αξιόλογη ζημιά καταναλώνοντας μεγάλο μέρος των φύλλων και καταστρέφοντας τα εμβόλια.
Χρόνος επέμβασης:	- Πρώιμες και μεσοπρώιμες περιοχές : 23 - 26 Ιουνίου. Για τις όψιμες περιοχές θα ενημερωθείτε σε επόμενο δελτίο.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Οι επεμβάσεις κατά εχθρών και ασθενειών του αμπελιού και της ελιάς πρέπει να γίνονται με την επιλογή των κατάλληλων φαρμάκων σύμφωνα με τις λίστες των εγκεκριμένων δραστικών.

Ηράκλειο 20 Ιουνίου 2012

Ο Προϊστάμενος Δ/νσης

Τρουλλάκης Γιάννης