

# ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

## ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΩΝ  
ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ  
Ταχ. Δ/ση: Καστοριάς 32Α, 71307 Ηράκλειο  
Τηλ: 2810224948, Fax: 2810225616  
Email: pkpfhgpr@otenet.gr



Τα δελτία διανέμονται δωρεάν στους ενδιαφερόμενους  
και δημοσιεύονται στην ιστοσελίδα [www.minagric.gr](http://www.minagric.gr)

Εφαρμόζετε πιστά τις οδηγίες χρήσης των φαρμάκων.  
Έτσι προστατεύετε τον καταναλωτή και το περιβάλλον

			
Σχηματισμός έλκους σε κλαδίσκο. Το βακτήριο διαχειμάζει στα έλκη.	Προνύμφη σέζιας σε βραχίονα μηλιάς.	Νύμφη σέζιας. Μέσα στις στοές βρίσκεται καλυμμένη σε προστατευτικό περίβλημα.	Πληθυσμοί ματόψειρας σε προστατευμένη θέση κλαδίσκου.

## ΕΧΘΡΟΙ - ΑΣΘΕΝΕΙΕΣ ΤΩΝ ΜΗΛΟΕΙΔΩΝ

Πληροφορίες: Νίκος Ι. Μπαγκής

6.

<p><b>ΒΑΚΤΗΡΙΑΚΟ ΚΑΨΙΜΟ:</b> (ΜΗΛΙΑ -ΑΧΛΑΔΙΑ)</p> <p>Οδηγίες :</p>	<p>Έντονες οι προσβολές τη φετινή περίοδο σε αχλαδιές όλων των περιοχών. <u>Δεν υπάρχουν θεραπευτικά σκευάσματα. Η αντιμετώπιση του βασίζεται σε καλλιεργητικά μέτρα και προληπτικές επεμβάσεις.</u></p> <p>Συνιστάται μετά τη φυλλόπτωση και με ξηρό καιρό:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Επιμελημένο και προσεκτικό κλάδεμα <b>και κάψιμο</b> των προσβεβλημένων κλαδίσκων και κλάδων του δέντρου <u>μαζί με υγιές τμήμα τουλάχιστον 20 εκ.</u> Εφόσον διαπιστώνετε προσβολές και σε χοντρά μέρη του δέντρου (βραχίονες, κορμό) να αφαιρείτε προσεκτικά την προσβεβλημένη περιοχή μέχρι την εμφάνιση υγιούς ξύλου και να επαλείφετε τις πληγές με βορδιγάλεια πάστα ή με πυκνό διάλυμα έτοιμου βορδιγάλειου πολτού του εμπορίου. Η αναλογία θειικού χαλκού - ασβεστόπετρας - νερού για την βορδιγάλεια πάστα είναι 6 - 13 - 100. <u>Υπενθυμίζεται ότι τα εργαλεία θα πρέπει να απολυμαίνονται συνεχώς με φωτιστικό οινόπνευμα.</u></li> <li>Να ακολουθήσει άμεση επέμβαση με χαλκούχο σκεύασμα στη μεγαλύτερη συνιστώμενη δόση. Η παραπάνω επέμβαση να γίνει προληπτικά σε όλα τα κτήματα της περιοχής.</li> </ul>
<p><b>ΦΟΥΖΙΚΛΑΔΙΟ:</b> (ΜΗΛΙΑ -ΑΧΛΑΔΙΑ)</p>	<p>Η ασθένεια εκδηλώθηκε την άνοιξη κυρίως σε αχλαδιές. Όπου σημειώθηκαν σοβαρές προσβολές προτείνεται μετά την φυλλόπτωση το παράχωμα των πεσμένων φύλλων στο έδαφος. Στις αχλαδιές θα πρέπει να αφαιρεθούν και να καούν και οι προσβεβλημένοι βλαστοί. Τα παραπάνω μέτρα συμβάλλουν στη μείωση του μολύσματος για την επόμενη άνοιξη.</p>

<b>Σ Ε Ξ Ι Α :</b> (ΞΥΛΟΦΑΓΟ ΕΝΤΟΜΟ) (ΜΗΛΙΑ –ΑΧΛΑΔΙΑ)	<p>Σημαντικές προσβολές διαπιστώνονται κάθε χρόνο. Συνιστώνται:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Όψιμο κλάδεμα αργά την άνοιξη που μειώνει τις προσβολές.</li> <li>• Αφαίρεση και κάψιμο των ξηρών και εξασθενημένων κλάδων.</li> <li>• Ψεκασμός του κορμού και των βραχιόνων με μίγμα θερινού ορυκτέλαιου και chlorpyrifos στο πρώτο δεκαήμερο του Νοέμβρη. Οι βιοκαλλιεργητές να χρησιμοποιήσουν μόνο ορυκτέλαια ή άλατα καλίου λιπαρών οξέων.</li> </ul>
<b>ΜΑΤΟΨΕΙΡΑ</b> <b>ΜΗΛΙΑΣ :</b> (Εριόσωμα)	<p>Διαπιστώθηκαν σημαντικές προσβολές σε μηλιές του οροπεδίου Κρουσώνα.</p> <p>Η παραπάνω επέμβαση για τη Σέξια, την περίοδο αυτή, μειώνει τους πληθυσμούς που διαχειμάζουν.</p>

**ΦΑΡΜΑΚΑ** : Να επιλέγονται σύμφωνα με τις λίστες που σας έχουμε αποστείλει.

*Ηράκλειο 25 Οκτωβρίου 2012*

*Ο Προϊστάμενος Δ/σης*

*Τρουλλάκης Ιωάννης*