

ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΩΝ
ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
Ταχ. Δ/ση: Καστοριάς 32Α, 71307 Ηράκλειο
Τηλ: 2810224948, Fax: 2810225616
Email: pkpfhgpr@otenet.gr



Τα δελτία διανέμονται δωρεάν στους ενδιαφερόμενους
και δημοσιεύονται στην ιστοσελίδα www.minagric.gr

Εφαρμόζετε πιστά τις οδηγίες χρήσης των φαρμάκων.
Έτσι προστατεύετε τον καταναλωτή και το περιβάλλον



ΕΧΘΡΟΙ - ΑΣΘΕΝΕΙΕΣ ΤΟΥ ΑΜΠΕΛΙΟΥ

Πληροφορίες: Νίκος Ι. Μπαγκής.

2.

Οι χαμηλότερες μέσες θερμοκρασίες κατά 1,5 – 3 °C από τον κλιματικό τύπο του νησιού καθώς και οι συχνές και υψηλές βροχοπτώσεις που σημειώθηκαν ιδιαίτερα τους μήνες Ιανουάριο - Φεβρουάριο, χαρακτήρισαν το χειμώνα που πέρασε.

Η εκβλάστηση των αμπελιών είναι όψιμη και μόλις το τελευταίο δεκαήμερο ξεκίνησε στην παραλιακή ζώνη. Στην ποικιλία σουλτανίνα, στην πρώιμη – παραλιακή ζώνη καταγράφεται έναρξη σταδίου D (έξοδος φύλλων), στην μεσοπρώιμη τα μάτια αρχίζουν να φουσκώνουν ενώ στην όψιμη ζώνη τα μάτια είναι ακόμα σε λήθαργο.

Με την έναρξη της βλάστησης έχουμε και τις πρώτες επεμβάσεις.

ΦΟΜΟΨΗ:	-Η επικράτηση βροχερού και υγρού καιρού την περασμένη άνοιξη έδωσε σημαντικές προσβολές. Παρατηρούνται συμπτώματα σε κληματίδες (μικρά μαύρα στίγματα) και επάρκεια μολύσματος (πυκνίδια).
Διαπιστώσεις:	-Οι μολύνσεις πραγματοποιούνται στα πρώτα βλαστικά στάδια D και E όταν το μήκος της βλάστησης είναι 1-3 εκ. και ευνοούνται με υγρό καιρό.
Οδηγίες:	Αντιμετωπίζεται αποτελεσματικά με δύο προληπτικούς ψεκασμούς, ο πρώτος στην έξοδο των φύλλων (στάδιο D) και ο δεύτερος όταν αρχίσουν να εμφανίζονται τα πρώτα φύλλα (στάδιο E). <u>Παρακολουθείτε τα δελτία καιρού.</u> Σε περίπτωση απουσίας βροχών μπορείτε να κάνετε μία επέμβαση μεταξύ των σταδίων D και E.

<p>ΩΙΔΙΟ: (χολέρα)</p> <p><i>Οδηγίες:</i></p>	<p>Η προστασία πρέπει να αρχίζει από τα βλαστικά στάδια Ε , F.</p> <p>Η πρόωπη αντιμετώπιση του, μειώνει τα αρχικά μολύσματα και περιορίζει σημαντικά τις θερινές προσβολές.</p> <p>Κατάλληλος χρόνος αντιμετώπισης, όταν η βλάστηση έχει μήκος 5 - 6 εκατοστά (στάδια Ε και F).</p>
<p>ΘΡΙΠΕΣ:</p>	<p>Οι προσβολές αρχίζουν από τα εκπυσώμενα μάτια. Σε αμπέλια που παρουσιάστηκαν συμπτώματα την περασμένη χρονιά να γίνει προληπτική συνδυασμένη αντιμετώπιση με το ωίδιο.</p>
<p>ΖΙΖΑΝΙΟΚΤΟΝΙΑ:</p> <p><i>Οδηγίες:</i></p>	<p>Στην πλειονότητα των αμπελώνων επικρατεί η ξινήθρα. Δημιουργεί ένα φυσικό χειμερινό χλοοτάπητα που επιδρά ευνοϊκά ιδιαίτερα στα επικλινή εδάφη (προστατεύει από τη διάβρωση, αυξάνει τη συγκράτηση και τη διείσδυση του νερού, βελτιώνει την υφή του εδάφους και το κάνει προσβάσιμο μετά από βροχή). Δεν ανταγωνίζεται τα αμπέλια και περιορίζει την ανάπτυξη άλλων θερινών ζιζανίων.</p> <p>Μην καταστρέφετε την ξινήθρα. Σε αμπέλια με ξινήθρα συνιστάται ζιζανιοκτονία μόνο κατά μήκος των γραμμών κι εφόσον υπάρχουν επιζήμια ζιζάνια.</p>

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ: Σας αποστέλλουμε τις λίστες των εγκεκριμένων δραστικών ουσιών των εχθρών και ασθενειών του αμπελιού για το έτος 2012, τις οποίες παρακαλούμε **να κρατήσετε σε αρχείο.** Κατά τη διάρκεια της καλλιεργητικής περιόδου επιλέγετε τα κατάλληλα σκευάσματα από τις λίστες αυτές.

Ηράκλειο 20 Μαρτίου 2012
Ο Προϊστάμενος Δ/σης
Τρουλλάκης Γιάννης