

ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ & ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΩΝ
ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ & ΦΥΤΟΪΓΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
Ταχ. Δ/ση: Καστοριάς 32Α, 71307 Ηράκλειο
Τηλ: 2810.282248, Fax: 2810.225616 Email: pkpfhgpr@otenet.gr



Τα δελτία αναρτώνται στην ιστοσελίδα του υπουργείου www.minagric.gr
και αποστέλλονται σε κάθε ενδιαφερόμενο μέσω e-mail με αίτημα στο
agrodeltiokriti@gmail.com

Εφαρμόζετε πιστά τις οδηγίες χρήσης των φαρμάκων.
Έτσι προστατεύετε εσείς, ο καταναλωτής και το περιβάλλον.

ΕΧΘΡΟΙ ΜΗΛΙΑΣ - ΑΧΛΑΔΙΑΣ

Δελτίο Νο 7

(Το δελτίο αφορά τις ορεινές περιοχές καλλιέργειας μηλοειδών)

(ΛΙΒΑΔΙ ΚΡΟΥΣΩΝΑ – ΔΑΜΑΣΤΑ – ΟΡΟΠΕΔΙΟ ΛΑΣΙΘΙΟΥ)

ΚΑΡΠΟΚΑΨΑ : (*Carpocapsa pomonella*)

Μηλιά - Αχλαδιά



Γενικές πληροφορίες - Διαπιστώσεις :

- Στις ορεινές περιοχές παρακολούθησης του εντόμου (Λιβάδι Κρουσώνα, Δαμάστα, οροπέδιο Λασιθίου) η δεύτερη γενιά είναι σε εξέλιξη.

Οδηγίες :

- Συνιστάται συνέχιση της προστασίας των καρπών στις ορεινές περιοχές (Λιβάδι Κρουσώνα, Δαμάστα, οροπέδιο Λασιθίου κ.α.).

- Ενδεικτικές ημερομηνίες αντιμετώπισης :

- Λιβάδι Κρουσώνα, Δαμάστα : **25 - 26 Ιουλίου.**
- Οροπέδιο Λασιθίου : **30 - 31 Ιουλίου.**

Φάρμακα : Χρησιμοποιείτε σκευάσματα από τις λίστες εγκεκριμένων φυτοπροστατευτικών προϊόντων.
Σε κάθε περίπτωση διαβάζετε προσεκτικά και εφαρμόζετε πιστά την ετικέτα.

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΙΚΡΗ ΚΗΛΙΔΩΣΗ



Πικρή κηλίδωση. Ξεκινά εσωτερικά και κάτω από την επιδερμίδα του καρπού. Στα αρχικά στάδια εξωτερικά διακρίνονται υδατώδεις κηλίδες συνήθως στην κορυφή του καρπού.



Πικρή κηλίδωση. Αργότερα οι κηλίδες εξωτερικά είναι καστανές – μαύρες, ελαφρά βυθισμένες και εσωτερικά φελλοποιημένες.

Είναι μη παρασιτική ασθένεια των μήλων που οφείλεται σε διαταραχή από ανεπαρκή εφοδιασμό των καρπών με ασβέστιο.

Διαπιστώνεται κυρίως κατά την αποθήκευση, μπορεί όμως να εμφανιστεί και πριν τη συγκομιδή. Εντονότερα εμφανίζεται:

- σε νεαρά δένδρα, ιδιαίτερα αν έχουν μικρή καρποφορία,
- σε μεγάλου μεγέθους καρπούς,
- σε καρπούς που συγκομίζονται πρόωρα,
- σε ακανόνιστες αρδεύσεις,
- σε υπερβολική αζωτούχο λίπανση και
- σε αυστηρό κλάδεμα

Εφαρμογές με εγκεκριμένα σκευάσματα ασβεστίου, **ιδιαίτερα σε μήλα που προορίζονται για αποθήκευση**, περιορίζουν τα συμπτώματα.

Αριθμός εφαρμογών: 2 εφαρμογές ανά 15 ημέρες με την τελευταία 2 εβδομάδες πριν τη συγκομιδή.

Χρόνος εφαρμογής: Αργά το απόγευμα.

Ηράκλειο 23 Ιουλίου 2018

Η Προϊσταμένη Τμήματος

Κληρονόμου Ευφροσύνη