

# ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

## ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ  
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ  
Δ/ΝΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ & ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΩΝ  
ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ & ΦΥΤΟΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

Ταχ. Δ/ση: Καστοριάς 32Α, 71307 Ηράκλειο

Τηλ: 2810.224948, Fax: 2810.225616

Email: [pkpfiraklio@minagric.gr](mailto:pkpfiraklio@minagric.gr)

Τα δελτία αναρτώνται στην ιστοσελίδα του υπουργείου  
[www.minagric.gr](http://www.minagric.gr) και αποστέλλονται μέσω e-mail σε κάθε  
ενδιαφερόμενο με αίτημα στο [agrodeltiokriti@gmail.com](mailto:agrodeltiokriti@gmail.com)



Εφαρμόζετε πιστά τις οδηγίες χρήσης των φαρμάκων.  
Έτσι προστατεύετε εσείς, ο καταναλωτής και το περιβάλλον.

## ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΣΤΑ ΕΣΠΕΡΙΔΟΕΙΔΗ

Πληροφορίες: MSc Μ. Ζ. Ροδιτάκη

4.

Παρατηρήσεις υπαίθρου: Σ. Λούρου, Ρ. Οικονομάκη, Μ. Ροδιτάκη.

(Φωτογραφίες: Περιφερειακό Κέντρο Προστασίας Φυτών, Ποιοτικού & Φυτοϋγειονομικού Ελέγχου Ηρακλείου)



Κόκκινη ψώρα



Παρλατόρια ή Μαύρη ψώρα



Μυτιλόμορφη ψώρα



**Διαλευρώδης:** Προνυμφικά στάδια στην κάτω επιφάνεια φύλλου.  
Καπνιά και μελιτώματα σε έντονα προσβεβλημένα φύλλα.



**Ψευδόκκοκος:** Προσβολή στα σημεία  
επαφής μεταξύ των καρπών.

<p><b>ΜΥΓΑ ΜΕΣΟΓΕΙΟΥ:</b> (<i>Ceratitis capitata</i>)</p> <p>Οδηγίες:</p>	<p>Καταγράφονται μέτριοι πληθυσμοί στο δίκτυο παγίδευσης (Αγυιά και Βαρόπετρο Χανίων, Σίσσες Ρεθύμνου, Φόδελε Ηρακλείου).</p> <p>– Να συνεχιστεί η προστασία στις όψιμες ποικιλίες που δεν έχουν συγκομισθεί. <u>Οι προσβεβλημένοι από τη μύγα καρποί πρέπει να απομακρύνονται και να καταστρέφονται.</u></p>
<p><b>ΚΟΚΚΙΝΗ ΨΩΡΑ</b> (<i>Aonidiella aurantii</i>)</p> <p><b>ΠΑΡΛΑΤΟΡΙΑ</b> Μαύρη ψώρα (<i>Parlatoria zizyphi</i>)</p> <p><b>ΜΥΤΙΛΟΜΟΡΦΗ ΨΩΡΑ</b> (<i>Lepidosaphes beckii</i>)</p>	<p>Παρατηρούνται τα ευαίσθητα στη χημική αντιμετώπιση βιολογικά στάδια των προνυμφών της δεύτερης γενιάς των κοκκοειδών.</p> <p>– Κλάδεμα και καθαρισμός των δένδρων περιορίζουν την ανάπτυξη επιβλαβών πληθυσμών.</p> <p>– Σε δέντρα σοβαρά προσβεβλημένα συστήνεται άμεσα επέμβαση με εγκεκριμένα σκευάσματα.</p> <p><b>Να προτιμηθούν σκευάσματα με περιορισμένη δράση στα ωφέλιμα έντομα.</b> Τα <u>παραφινικά λάδια</u> χρησιμοποιούνται αυτή την περίοδο με προσοχή μόνο σε δέντρα ποτισμένα που βρίσκονται σε καλή θρεπτική κατάσταση και όταν η θερμοκρασία είναι μικρότερη από 32°C.</p>
<p><b>ΨΕΥΔΟΚΟΚΚΟΣ:</b> (<i>Planococcus citri</i>)</p> <p>Συμπτώματα:</p> <p>Οδηγίες:</p>	<p>Διακρίνεται από τις αποικίες που σχηματίζει, καλυμμένες με άφθονα λευκά κηρώδη νήματα. Βρίσκεται στα υγρά και σκιερά σημεία του δέντρου, συνήθως στα σημεία επαφής των καρπών μεταξύ τους ή με κλαδιά και φύλλα. Εκκρίνει μελιτώματα ευνοώντας έτσι την ανάπτυξη μυκήτων της καπνιάς. Προκαλεί υποβάθμιση της ποιότητας των καρπών και φυλλόπτωση.</p> <p>– Έλεγχος των δέντρων για τη διαπίστωση προσβολών. Αυτή την περίοδο, αν η προσβολή των καρπών ξεπερνά το ποσοστό 5-10% συστήνεται επέμβαση.</p> <p>Όπου συνυπάρχει με κοκοειδή γίνεται συνδυασμένη αντιμετώπιση.</p>
<p><b>ΔΙΑΛΕΥΡΩΔΗΣ:</b> (<i>Dialeurodes citri</i>)</p> <p>Οδηγίες:</p>	<p>Παρατηρούνται νέες προσβολές σε δέντρα με πλούσια τρυφερή βλάστηση και πυκνό φύλλωμα όπου υπάρχει αυξημένη σχετική υγρασία. Τα μελιτώδη εκκρίματα ευνοούν την ανάπτυξη μυκήτων της καπνιάς που ρυπαίνουν τα δέντρα και υποβαθμίζουν εμπορικά τους καρπούς.</p> <p>– Οι προσβολές περιορίζονται σημαντικά με <u>καλλιεργητικούς χειρισμούς</u> (αφαίρεση και απομάκρυνση λαίμαργων βλαστών, ισορροπημένες αρδεύσεις, περιορισμένες αζωτούχες λιπάνσεις).</p> <p>– Στα προσβεβλημένα δέντρα συστήνεται επέμβαση με εγκεκριμένα σκευάσματα στο διάστημα: <b>8 - 12 Αυγούστου.</b></p>

Τα Τεχνικά Δελτία για την Π.Ε. Χανίων εκδίδονται σε συνεργασία με τη ΔΑΟΚ Χανίων και τον ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ.

- Χρησιμοποιείτε μόνο φυτοπροστατευτικά σκευάσματα με έγκριση στην καλλιέργεια των εσπεριδοειδών. Στις ιστοσελίδες του ΥΠΑΑΤ [http://www.minagric.gr/syspest/syspest\\_ENEMY\\_crops.aspx](http://www.minagric.gr/syspest/syspest_ENEMY_crops.aspx) και [http://www.minagric.gr/syspest/syspest\\_bfuncs\\_crops.aspx](http://www.minagric.gr/syspest/syspest_bfuncs_crops.aspx) , επιλέγοντας την καλλιέργεια μπορείτε να ενημερώνεστε για τα ε γ κ ρ ι μ έ ν α ε ν τ ο μ ο κ τ ό ν α και μ υ κ η τ ο κ τ ό ν α αντίστοιχα των εσπεριδοειδών, σύμφωνα με τις τελευταίες τροποποιήσεις των εγκρίσεων.
- Εφαρμόζετε τις οδηγίες που αναγράφονται στην ετικέτα της συσκευασίας και τηρείτε αυστηρά το χρόνο που αναγράφεται μεταξύ τελευταίας επέμβασης και συγκομιδής.
- Προτιμάτε φυτοπροστατευτικά με περιορισμένη δράση στα ωφέλιμα έντομα (αρπακτικά και παρασιτοειδή). Για τη διατήρηση των ωφέλιμων εντόμων εφαρμόζετε την πρακτική των απέκαστων ζωνών που αποτελούν το 15-20% του συνόλου των δέντρων της καλλιέργειας και εναλλάσσονται από χρονιά σε χρονιά μέσα στον αγρό.

Ηράκλειο 7 Αυγούστου 2020

Η Προϊσταμένη Τμήματος

Κληρονόμου Ευφροσύνη