

ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ & ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΩΝ
ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ & ΦΥΤΟΪΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

Ταχ. Δ/ση: Καστοριάς 32Α, 71307 Ηράκλειο

Τηλ: 2810.224948, Fax: 2810.225616

Email: pkpfiraklio@minagric.gr

Τα δελτία αναρτώνται στην ιστοσελίδα του υπουργείου
www.minagric.gr και αποστέλλονται μέσω e-mail σε κάθε
ενδιαφερόμενο με αίτημα στο agrodeltiokriti@gmail.com



Εφαρμόζετε πιστά τις οδηγίες χρήσης των φαρμάκων.
Έτσι προστατεύετε εσείς, ο καταναλωτής και το περιβάλλον.

ΑΣΘΕΝΕΙΕΣ ΚΑΙ ΕΧΘΡΟΙ ΑΧΛΑΔΙΑΣ - ΜΗΛΙΑΣ Δελτίο Νο1

(Ορεινές περιοχές)

ΒΛΑΣΤΙΚΑ ΣΤΑΔΙΑ

Γενικά, στις ορεινές περιοχές, επικρατούν τα παρακάτω βλαστικά στάδια :

- Στις αχλαδιές : καρπίδιο.
- Στις μηλιές : άνθηση – πτώση πετάλων.

ΦΟΥΖΙΚΛΑΔΙΟ :

(*Venturia inaequalis*)-(Μηλιά)
(*Venturia pirina*)-(Αχλαδιά)



Γενικές πληροφορίες - Διαπιστώσεις:

- Οι βροχοπτώσεις και οι διυγράνσεις που σημειώθηκαν στο πρώτο δεκαήμερο του Απριλίου έχουν ευνοήσει μολύνσεις του μύκητα και τις τελευταίες ημέρες εκδηλώνονται συμπτώματα στις ορεινές περιοχές (οροπ. Λασιθίου, Λιβάδι Κρουσώνα, Δαμάστα), κυρίως στις αχλαδιές.
- Η καιρική αστάθεια ευνοεί νέες μολύνσεις του μύκητα.

Οδηγίες:

1. Λόγω της καιρικής αστάθειας των ημερών ([προγνωστικοί χάρτες βροχόπτωσης ΕΜΥ](#)) συνιστάται άμεσα προστασία.
2. Μετά την πρώτη εβδομάδα του Μαΐου να γίνονται συστηματικοί έλεγχοι για εντοπισμό συμπτωμάτων. Σε οπωρώνες που εμφανίζουν συμπτώματα να συνεχίζεται η προστασία:
 - πριν από πιθανή βροχή ή
 - το συντομότερο μετά από βροχή (εντός 24 - 48 ωρών).

ΩΙΔΙΟ :

(*Oidium farinosum*) - (Μηλιά)



Γενικές πληροφορίες:

- Ο μύκητας δραστηριοποιείται με την έναρξη της βλάστησης.
- Η τρυφερή βλάστηση είναι ευαίσθητη σε όλη την καλλιεργητική περίοδο ενώ οι καρποί προσβάλλονται κυρίως σε νεαρό στάδιο.

Οδηγίες:

- Στις ευαίσθητες ποικιλίες μηλιάς συνιστάται προστασία.
- Η προστασία μπορεί να συνδυαστεί με αυτήν για το φουζικλάδιο.

ΒΑΚΤΗΡΙΑΚΟ ΚΑΨΙΜΟ :

(*Erwinia amylovora*)
(Αχλαδιά)



Γενικές πληροφορίες :

- Η ποικιλία κρυστάλλι είναι αρκετά ανθεκτική ενώ η ποικιλία κοντούλα είναι πολύ ευαίσθητη.

Οδηγίες :

Η προστασία μετά την καρπώδεση βασίζεται σε καλλιεργητικά μέτρα. Συνιστάται να γίνεται τακτικός έλεγχος στις αχλαδιές.

Τα συμπτώματα εμφανίζονται σε φύλλα, νεαρούς βλαστούς και καρπούς που μοιάζουν σαν να είναι “καμένα” από φωτιά. Με ξηρό καιρό, αφαιρούνται μαζί με υγιές τμήμα τουλάχιστον 20 - 25 εκ. και απομακρύνονται άμεσα. Το βακτήριο μεταδίδεται με τα εργαλεία αφαίρεσης και γι’ αυτό καλό είναι να απολυμαίνονται τακτικά.

ΚΑΡΠΟΚΑΨΑ :

Μηλιά - Αχλαδιά - Καρυδιά

Γενικές πληροφορίες - Διαπιστώσεις - Οδηγίες :

- Στις ορεινές περιοχές η πτήση του εντόμου δεν έχει ξεκινήσει. Δεν χρειάζεται ακόμα καμία αντιμετώπιση.

Φυτοπροστατευτικά προϊόντα (ΦΠΠ) :

- Χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα σκευάσματα για την καλλιέργεια, για τον εχθρό ή την ασθένεια και για το βλαστικό στάδιο της εποχής.
- Εγκεκριμένα ΦΠΠ ανά καλλιέργεια και ασθένεια/εχθρό στην ιστοσελίδα του ΥΠΑΑΤ [πατώντας εδώ](#)

Συνιστάται να επιλέγετε σκευάσματα με τους λιγότερους κινδύνους για τον χρήστη και το περιβάλλον. Τα «χημικά» φυτοπροστατευτικά δεν είναι ακίνδυνα.

Θυμηθείτε πριν την εφαρμογή να ελέγχετε τη σήμανση κινδύνου, τις δηλώσεις επικινδυνότητας - προφύλαξης και να παίρνετε απαραίτητως μέτρα προστασίας.

Σε κάθε περίπτωση διαβάστε προσεκτικά και εφαρμόζετε πιστά την ετικέτα.



ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΤΙΣ ΜΕΛΙΣΣΕΣ !!!

Από τα τέλη του περασμένου αιώνα παρατηρείται μια σταδιακή κατάρρευση του παγκόσμιου πληθυσμού των μελισσών (ήμερων και άγριων). Σήμερα σε πολλές χώρες το ποσοστό μείωσης έχει ξεπεράσει το 35%. Επισημαίνεται ότι:

- Περίπου το 90% των φανερόγαμων φυτών (φυτά με άνθη)
- Το 70% των καλλιεργειών

- Το 35% της παγκόσμιας αγροτικής παραγωγής, εξαρτώνται άμεσα από την επικονίαση που εξασφαλίζουν οι μέλισσες και άλλα έντομα. Η προστασία τους είναι επιβεβλημένη και νομικά κατοχυρωμένη.

[Πηγή : 2016, Intergovernmental Science-Policy Platform on Biodiversity and Ecosystem Services \(IPBES\)](#)

Συστάσεις:

- Μη χρησιμοποιείτε εντομοκτόνα ή άλλα μελισσοτοξικά σκευάσματα σε καλλιέργειες που βρίσκονται στο στάδιο της άνθησης.
- Διατηρείτε την αυτοφυή βλάστηση και αποφεύγετε τη χρήση ζιζανιοκτόνων κατά τη διάρκεια της άνθησης.
- Διαβάζετε τις οδηγίες χρήσης των φυτοφαρμάκων, ιδιαίτερα σε ότι αφορά την τοξικότητα τους στις μέλισσες και στους άλλους επικονιαστές.
- Η ενημέρωση των μελισσοκόμων και το κλείσιμο των κυψελών πριν τους ψεκασμούς, είναι μέτρα μειωμένης προστασίας και δεν προφυλάσσουν την άγρια εντομοπανίδα των επικονιαστών.

Τέλος δεν πρέπει να ξεχνάμε, ότι η επικονίαση είναι κορυφαία φυσική λειτουργία, αναντικατάστατη και άρρηκτα συνδεδεμένη με την επιβίωση του ανθρώπου.

Νομοθεσία για την προστασία των μελισσών :

Στην [Κ.Υ.Α Αριθμ. 9269/246316 \(ΦΕΚ 4032 Β'/21-09-2020, αρθ.16, παρ.3\)](#) ορίζονται οι υποχρεώσεις των επαγγελματιών χρηστών φυτοπροστατευτικών προϊόντων σχετικά με την προστασία των μελισσών.

Ηράκλειο 30 Απριλίου 2025

Η Προϊσταμένη Τμήματος

Κληρονόμου Ευφροσύνη