

ΕΣΠΕΡΙΔΟΕΙΔΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

ΦΥΤΩΝ & ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

Ταχ. Διεύθυνση: Οδός Σταύρου Νιάρχου(τέρμα)

Τ.Θ. 02 ,Τ.Κ. 45003 Ανατολή Ιωάννινα

Πληροφορίες: Ν. Μέτσιος, Α. Καμπλέτσας,

Τηλέφωνο : 26510 40707 , 26510 44055

FAX : 26510 41902

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Α. Καμπλέτσας, Ν Μέτσιος.

1. 9 / 05 / 2011

ΑΦΙΔΕΣ (ΜΕΛΙΓΡΕΣ)

Η υγρασία και οι μέτριες θερμοκρασίες ευνοούν τις προσβολές από αφίδες. Συνιστάται να γίνεται εξέταση της ακραίας βλάστησης (ορισμένοι βλαστοί περίπου στο 10% των δένδρων) και εάν διαπιστωθεί ότι είναι προσβεβλημένοι το 25% των νεαρών βλαστών από την μαύρη αφίδα ή το 10 % από την πράσινη αφίδα (5% για τις κλημεντίνες) να γίνει ψεκασμός με το πέρας της άνθησης με ένα από τα κατάλληλα φάρμακα:

Συνιστώμενα φάρμακα : ακεταμιπρίντ, δελταμεθρίν, πυρεθρίνη, φλουβαλινίτ ,θιαμεθοξάμ αλατα καλίου λιπαρών οξέων,ορυκτέλαια. παραφινέλαια, πυμετροζίν, χλωρπιριφός και χλωρπιριφός μεθύλ δ.σ.

ΠΑΡΑΜΟΡΦΩΤΙΚΟΣ ΑΚΑΡΙ ΤΗΣ ΛΕΜΟΝΙΑΣ

Προκαλεί την παραμόρφωση καρπών, ανθέων και φύλλων κυρίως στη λεμονιά. Συνιστάται να γίνεται δειγματοληψία τεσσάρων κλαδίσκων /δένδρο της τελευταίας βλαστικής περιόδου από κάθε σημείο του ορίζοντα. Η επέμβαση γίνεται μόνο όταν από το 10% των δειγματοληπτικών δένδρων το 30% των οφθαλμών φέρει κινητές μορφές ανεξάρτητα από τον αριθμό που φιλοξενούν.

Συνιστώμενα φάρμακα: φενμπουταντίν οξάιντ, ορυκτέλαια, παραφινέλαια

ΚΟΚΚΙΝΟΣ ΤΕΤΡΑΝΥΧΟΣ

Προσβάλλει φύλλα, βλαστούς και καρπούς. Συνιστάται να γίνονται δειγματοληψίες φύλλων και επεμβάσεις όταν υπάρχουν 3 κινητές μορφές ανά φύλλο νέας βλάστησης ή κινητές μορφές στο 20-30% των φύλλων.

Συνιστώμενα φάρμακα: ακριναθρίν, ασεκουινოსύλ, ετοξαζόλ, κλοφεντεζίν, μιλμπεμεκτίν, πυρινταμπέν (πορτοκαλιά), σπιροντικλοφέν (πορτοκαλιά και λεμονιά), τεμπουφενπυράντ, φεναζακουίν, φενμπουταντίν-οξάιντ, φενπιροξιμέιτ, θερινά λάδια.

Τα ασεκουινოსύλ, κλοφεντεζίν, μιλμπεμεκτίν, σπιροντικλοφέν πρέπει να χρησιμοποιηθούν μια φορά την ίδια καλλιεργητική περίοδο

Η χρήση ενός εκ των πυρινταμπέν, φεναζακουίν, φενπιροξιμέιτ, δεν επιτρέπει την χρήση των άλλων δύο την ίδια καλλιεργητική περίοδο.

ΚΟΚΚΙΝΗ ΨΩΡΑ –ΨΕΥΔΟΚΟΚΚΟΣ

Να μη γίνει κανένας ψεκασμός αυτή την εποχή. Θα ενημερωθείτε για την κατάλληλη στιγμή ψεκασμού σε επόμενο δελτίο μας.

ΠΡΟΣΟΧΗ :

1. Οι ψεκασμοί την περίοδο της άνθησης μπορεί να αποβούν μελισσοτοξικοί. Για τον λόγο αυτό οι επεμβάσεις να γίνονται είτε προ της 9^{ης} πρωινής είτε μετά τις 6³⁰ το απόγευμα.
2. Να χρησιμοποιείτε μόνον εγκεκριμένα γεωργικά φάρμακα, να διαβάζετε προσεκτικά την ετικέτα της συσκευασίας και να τηρείτε σχολαστικά τις οδηγίες που αναγράφονται σε αυτήν, μη κάνετε υπέρβαση των δόσεων και να ελέγχετε την συνδυαστικότητα των γεωργικών φαρμάκων.



Ο Προϊστάμενος
Του Π.Κ.Π.Φ.&Π.Ε.Ιωαννίνων α.α

ΙΩΑΝΝΑ Γ ΧΟΥΛΙΑΡΑ
Γεωπόνος

Όλα τα δελτία μας υπάρχουν στο διαδίκτυο (www.minagric.gr).