

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
ΦΥΤΩΝ & ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ
ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

Ταχ. Διεύθυνση: Οδός Πανεπιστημίου (τέρμα)
Τ.Θ.02 Τ.Κ. 45003 Ανατολή Ιωάννινα
Τηλέφωνο : 26510 40707 , 26510 44055
FAX : 26510 41902

ΑΜΠΕΛΙ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Κ. Βάντζιος.

6. 14 / 6 /2012

Βλαστικό στάδιο: Άνθιση (Ζίτσα), Καρπόδεση έως πριν «Κλείσιμο» τσαμπιού (Κέρκυρα, Λευκάδα, Σακελλαρικό).

ΠΕΡΟΝΟΣΠΟΡΟΣ

Η πίεση προσβολής είναι μηδενική. Έχουν αναφερθεί μόνο σπάνιες μεμονωμένες κηλίδες. Στο εξής να γίνουν μόνο 1-2 ψεκασμοί με χαλκούχα σκευάσματα (κυρίως για την σκλήρυνση της βλάστησης). Στο ερχόμενο δεκαήμερο δεν αναμένονται βροχοπτώσεις.

ΩΙΔΙΟ (ΜΕΛΟΥΔΑ)

Οι συνθήκες που επικρατούν είναι άριστες για την εξάπλωση του παθογόνου. Να συνεχιστεί η προστασία σε όλες τις περιοχές μέχρι και το «γυάλισμα» του σταφυλιού. Οι ψεκασμοί (ή τα σκονίσματα με θείο) πρέπει να ανανεώνονται αμέσως με το πέρας της διάρκειας δράσης του σκευάσματος. Να γίνονται εναλλαγές ανάμεσα στις κατηγορίες των σκευασμάτων Βλ ΔΓΠ 4/10-5-2012 & ΔΓΠ 5/21-5-2012.

Κατάλληλα φάρμακα: βλ Λίστα που σας έχει σταλεί.

ΒΟΤΡΥΤΗΣ

Στα βλαστικά στάδια πριν το «κλείσιμο» του τσαμπιού και στο «γυάλισμα» του σταφυλιού, να γίνουν ψεκασμοί με ειδικό βοτρυδιοκτόνο σε όλες τις ευαίσθητες ποικιλίες (π.χ. Ντεμπίνα κ. α.) και στα αμπέλια που σημειώνονται σαπίσματα κάθε χρονιά. Οι εφαρμογές σκευασμάτων μπορεί να στοχεύουν μόνο την ζώνη των σταφυλιών. Ο ψεκασμός μπορεί να συνδυαστεί με την καταπολέμηση του ωιδίου (σ' αυτήν την περίπτωση η εφαρμογή γίνεται σε όλη την βλαστική επιφάνεια).

Κατάλληλα φάρμακα: βλ Λίστα που σας έχει σταλεί.

ΕΥΔΕΜΙΔΑ

Η πτήση της δεύτερης γενιάς εξελίσσεται. Οι πληθυσμοί είναι πολύ μικροί, κανένας ψεκασμός δεν είναι επιβεβλημένος σε καμία περιοχή.

ΘΡΙΠΑΣ

Στην περιοχή της Ζίτσας, σε ορισμένους μόνο αμπελώνες παρατηρήθηκαν προ-ανθικά, ζημιές από Θρίπα και αντιμετωπίστηκαν με τοπικούς ψεκασμούς. Μαυρίσματα, καφετιάσματα στους βότρες, σε ορισμένα πρέμνα του αμπελιού, οφείλονται στο μικρό αυτό εχθρό.

Με τίναγμα των ανθοταξιών σε μία μαύρη επιφάνεια μπορούμε να επιβεβαιώσουμε την ύπαρξη του Θρίπα και να εκτιμήσουμε τον πληθυσμό τους. Δεν είναι απαραίτητο να ψεкаστούν με εντομοκτόνο όλοι οι αμπελώνες, αλλά να παρακολουθούμε τον πληθυσμό.

Είμαστε μακριά από τα όρια για ψεκασμό, να μην εφαρμοστούν εντομοκτόνα χωρίς λόγο για να προστατευθούν τα ωφέλιμα έντομα .

ΔΙΑΦΟΡΑ ΣΤΑΔΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥ ΕΝΤΟΜΟΥ

Το μήκος του εντόμου είναι περίπου **0,8 Χιλιοστά**. Μπορούμε να τα δούμε τινάζοντας τον βλαστό σε μία σκούρα επιφάνεια.

Οι πληθυσμοί πρέπει να εκτιμώνται από νωρίς, από το στάδιο D-E.

Αυτήν την περίοδο το όριο (για ψεκασμό), είναι 25 θρίπες ανά βλαστό, και φαίνεται να είμαστε μακριά από αυτό σε όλους σχεδόν τους αμπελώνες.



ΠΡΟΣΟΧΗ :

Να χρησιμοποιείτε μόνον εγκεκριμένα γεωργικά φάρμακα, να διαβάζετε προσεκτικά την ετικέτα συσκευασίας και να τηρείτε σχολαστικά τις οδηγίες που αναγράφονται σ' αυτήν.



ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

ΣΙΝΤΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ
ΔΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ

Η Προϊσταμένη
Του Π.Κ.Π.Φ.&Π.Ε.Ιωαννίνων α.α.

Ιωάννα Γ. Χουλιάρα
Γεωπόνος

Το δελτίο παράγεται με βάση τοπικές παρατηρήσεις και γενικά μετεωρολογικά δεδομένα. Παρέχει μια τάση της περιφερειακής κατάστασης και δεν μπορεί να μεταφερθεί ως έχει σε κάθε αγροτεμάχιο. Οι αμπελουργοί καλούνται συνεπώς, για τις αποφάσεις που λαμβάνουν να ενσωματώνουν τις δικές τους παρατηρήσεις στηριζόμενοι στα ενημερωτικά δελτία Όλα τα δελτία μας υπάρχουν στο διαδίκτυο (www.minagric.gr).