



Τ. Δ. : Τέρμα Αμυνταίου – Άγιος Λουκάς  
 Τ. Κ. : 651 10 Τ.Θ.: 1235  
 Τηλ. : 2510 600421-3  
 Fax: 2510 600430  
 E mail : [miliadou@minagric.gr](mailto:miliadou@minagric.gr)

Το παρόν δελτίο εκδίδεται μόνο ηλεκτρονικά σε συνεργασία με τις ΔΑΟΚ ΑΜΘ και τη ΔΑΟΚ Σερρών

**No 10/18-04-2019**

Πληροφορίες : Στέλλα Σπύρογλου, Δημήτρης Συρόπουλος, Μαρία Ηλιάδου.

## **ΑΜΥΓΔΑΛΙΑ**

### **Ευρύτομο Αμυγδαλιάς**

#### **Διαπιστώσεις:**

Από επιτόπιους ελέγχους και παρατηρήσεις που έγιναν σε κλωβούς με προσβεβλημένα αμύγδαλα, διαπιστώθηκε ότι είναι ήδη σε εξέλιξη η έξοδος του ευρύτομου της αμυγδαλιάς στις περιοχές Άμπελοι Τριανταφυλλιά ν. Σερρών και ξεκίνησε στην περιοχή Ορφανίου.



Η έξοδος του εντόμου και η δραστηριότητά του διαρκεί 20 - 25 ημέρες ή και περισσότερο. Το ευρύτομο θεωρείται από του σπουδαιότερους εχθρούς της αμυγδαλιάς και η μη έγκαιρη αντιμετώπισή του μπορεί να επιφέρει μεγάλη οικονομική ζημιά στους αμυγδαλοπαραγωγούς.

#### **Συστάσεις:**

Επειδή τα εξειδικευμένα διασυστηματικά εντομοκτόνα για την αντιμετώπιση του ευρύτομου της αμυγδαλιάς στο στάδιο της νεαρής προνύμφης έχουν ανακληθεί, θα πρέπει η καταπολέμηση του εντόμου να γίνει στοχεύοντας στα ενήλικα πριν αυτά προλάβουν να ωστοκήσουν στους καρπούς. Συνεπώς συνιστάται στους παραγωγούς να ψεκάσουν τις επόμενες ημέρες στις πρώιμες περιοχές και στη συνέχεια την επόμενη εβδομάδα στις όψιμες με ένα κατάλληλο, εγκεκριμένο φυτοπροστατευτικό προϊόν για την αντιμετώπισή του.

Οι ψεκασμοί θα πρέπει να γίνονται κατά τις θερμές ώρες της ημέρας όπου παρατηρούνται μεγαλύτεροι πληθυσμοί ενηλίκων ατόμων με επανάληψη μετά από δύο εβδομάδες μέχρι το στάδιο της σκλήρυνσης του ενδοκαρπίου εκτός από την περίπτωση των βιοκαλλιεργητών όπου οι ψεκασμοί θα πρέπει να επαναλαμβάνονται κάθε εβδομάδα με την εφαρμογή του aluminium silicate.

Ιδιαίτερη προσοχή να δοθεί στην ποικιλία Τέξας που θεωρείται ότι είναι πιο ευαίσθητη στην προσβολή του ευρύτομου της αμυγδαλιάς και μπορεί να προκαλέσει πρόωρη καρπόπτωση.

**Εγκεκριμένες δραστικές ουσίες :** deltamethrin (2 εφαρμογές / 14 ημέρες), phosmet (έγκριση για χρήση ήσσονος σημασίας, 2 εφαρμογές / 14 ημέρες) και aluminium silicate (kaolin) (έγκριση για χρήση ήσσονος σημασίας, 4 εφαρμογές / 7 ημέρες).

Η εφαρμογή γεωργικών φαρμάκων πρέπει να γίνεται από κατόχους πιστοποιητικού γνώσεων Ο.Χ.Γ.Φ.


Να εφαρμόζονται οι οδηγίες χρήσης με έμφαση στη δοσολογία, συνδυαστικότητα και την τήρηση μέτρων προστασίας του ψεκαστή.

Οι καλλιεργητές μπορούν να συμβουλευούνται για τα εγκεκριμένα φυτοπροστατευτικά προϊόντα ανά καλλιέργεια και παθογόνο την ηλεκτρονική διεύθυνση του Υπ.Α.Α.Τ.

[http://www.minagric.gr/syspest/syspest\\_bfuncs\\_crops.aspx](http://www.minagric.gr/syspest/syspest_bfuncs_crops.aspx)

+ Αποστολή του δελτίου στην ηλεκτρονική διεύθυνση των ενδιαφερομένων μπορεί να γίνει μετά από αίτημα τους στις ηλεκτρονικές διευθύνσεις [miliadou@minagric.gr](mailto:miliadou@minagric.gr), [dsyropoulos@minagric.gr](mailto:dsyropoulos@minagric.gr), [sspyroglou@minagric.gr](mailto:sspyroglou@minagric.gr).

+ το δελτίο αναρτάται στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων **[www.minagric.gr](http://www.minagric.gr)**



Η Προϊσταμένη Τμήματος

Μαρία Ηλιάδου