



Τ. Δ. : Τέρμα Αμυνταίου – Άγιος Λουκάς  
 Τ. Κ. : 651 10 Τ.Θ.: 1235  
 Τηλ. : 2510 600421  
 Fax: 2510 600430  
 E mail : [miliadou@minagric.gr](mailto:miliadou@minagric.gr)

Το παρόν δελτίο εκδίδεται μόνο ηλεκτρονικά σε συνεργασία με τις ΔΑΟΚ ΑΜΘ και τη ΔΑΟΚ Σερρών

№ 17/07-06-2019

Πληροφορίες : Μαρία Ηλιάδου, Δημήτρης Συρόπουλος, Στέλλα Σπύρογλου  
 και κατά τόπους ΔΑΟΚ

## ΕΛΙΑ

### Βλαστικό στάδιο

Στις πρώιμες περιοχές η ελιά βρίσκεται σε βλαστικό στάδιο όπου ο καρπός έχει μέγεθος μεγαλύτερο από 3 χιλιοστά. Στις μεσοπρώιμες περιοχές η ελιά βρίσκεται στο στάδιο πτώσης πετάλων και στις όψιμες στο στάδιο ολοκλήρωσης της άνθισης.



### Πυρηνοτρήτης

Η πτήση της καρπόβιας γενεάς του εντόμου έχει ξεκινήσει στις πρώιμες και μεσοπρώιμες περιοχές. Στο στάδιο όπου ο καρπός έχει μέγεθος 3 – 5 χιλιοστά πρέπει να γίνει ο πρώτος ψεκασμός. Στις επιτραπέζιες ελιές ο ψεκασμός επαναλαμβάνεται μετά από περίπου 15 ημέρες.

Στις όψιμες περιοχές ο αριθμός των συλλήψεων είναι μικρότερος αλλά αυξανόμενος. Συνιστάται ψεκασμός μετά από 4 - 5 ημέρες.

### Παρλατόρια

Συνιστάται να γίνει καταπολέμηση του εντόμου σε ελαιώνες όπου το πρόβλημα ήταν έντονο κατά την προηγούμενη χρονιά σε συνδυασμό με την αντιμετώπιση του πυρηνοτρήτη. Εάν έγινε καταπολέμηση της παρλατόριας προανθικά με εντομοκτόνο (ρυθμιστής ανάπτυξης), δεν απαιτείται να γίνει εκ νέου κάποιος ψεκασμός.

## Ακάρεα

Στις επιτραπέζιες ποικιλίες και όπου δεν έγινε αποτελεσματική καταπολέμηση θα πρέπει να γίνει άμεσα ένας ψεκασμός με ένα κατάλληλο εγκεκριμένο φυτοπροστατευτικό προϊόν για την αντιμετώπιση των ακάρεων. Η αντιμετώπιση των ακάρεων στο στάδιο καρπόδεσης (αύξησης μεγέθους καρπού) είναι πολύ σημαντική ιδιαίτερα στις επιτραπέζιες ποικιλίες.

### σημείωση :

- Όταν γίνεται συνδυασμένη καταπολέμηση να χρησιμοποιείτε φυτοπροστατευτικά προϊόντα που αντιμετωπίζουν περισσότερους εχθρούς και να ελέγχετε την συνδυαστικότητά τους.
- Επιλέγετε τα κατάλληλα γεωργικά φάρμακα από τις λίστες των φυτοπροστατευτικών προϊόντων που σας αποστέλλουμε και εφαρμόζετε τις οδηγίες χρήσης των φυτοπροστατευτικών προϊόντων.

### σημείωση :

- Όταν γίνεται συνδυασμένη καταπολέμηση να χρησιμοποιείτε φυτοπροστατευτικά προϊόντα που αντιμετωπίζουν περισσότερους εχθρούς και να ελέγχετε την συνδυαστικότητά τους.
- Εφαρμόζετε τις οδηγίες χρήσης των φυτοπροστατευτικών προϊόντων.

Οι καλλιεργητές μπορούν να συμβουλευόνται για τα εγκεκριμένα φυτοπροστατευτικά προϊόντα ανά καλλιέργεια και παθογόνο την ηλεκτρονική διεύθυνση του Υπ.Α.Α.Τ.

[http://www.minagric.gr/syspest/syspest\\_bfuncs\\_crops.aspx](http://www.minagric.gr/syspest/syspest_bfuncs_crops.aspx)

✚ Αποστολή του δελτίου στην ηλεκτρονική διεύθυνση των ενδιαφερομένων μπορεί να γίνει μετά από αίτημα τους στις ηλεκτρονικές διευθύνσεις [miliadou@minagric.gr](mailto:miliadou@minagric.gr), [dsyropoulos@minagric.gr](mailto:dsyropoulos@minagric.gr), [sspyroglou@minagric.gr](mailto:sspyroglou@minagric.gr).

✚ το δελτίο αναρτάται στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων [www.minagric.gr](http://www.minagric.gr)



Η Προϊσταμένη Τμήματος

Μαρία Ηλιάδου