



Το παρόν δελτίο εκδίδεται μόνο ηλεκτρονικά σε συνεργασία με τις ΔΑΟΚ της ΑΜΘ και τη ΔΑΟΚ Σερρών

Τ. Δ. : Τέρμα Αμυνταίου – Άγιος Λουκάς

Τ. Κ. : 651 10 Τ.Θ.: 1235

Τηλ. : 2510 600431, 2510 245684.

Fax: 2510 600430

E mail: dpvrgiotou@minagric.gr

Πληροφορίες : Δ. Πυργιώτου, Θ. Μαρκόπουλος, Θ. Γεωργιάδου.

No 34/12-08-2021



ΑΜΠΕΛΙ (για όλη την περιοχή ευθύνης) **Ευδεμίδα (*Lobesia botrana*)**

Με βάση τα στοιχεία που καταγράφουν οι φερομονικές παγίδες η πτήση της τρίτης γενεάς του εντόμου συνεχίζεται με αυξημένους αριθμούς συλλήψεων. Τονίζεται ότι στα σημεία όπου αναπτύσσονται οι προσβολές της ευδεμίδας στις ράγες αναπτύσσονται δευτερογενώς διάφορες σήψεις, με κυριότερες αυτές του βοτρύτη και της όξινης σήψης.

Σε συνέχεια των οδηγιών που παρείχαμε με τα προηγούμενα Δελτία Γεωργικών Προειδοποιήσεων που εξέδωσε η υπηρεσία μας, προτείνεται η διενέργεια επαναληπτικού ψεκασμού στις περιοχές Άμπελοι και Τριανταφυλλιά του Ν. Σερρών στις 14-15 Αυγούστου, ενώ στις υπόλοιπες περιοχές στις 18-19 Αυγούστου με τη χρήση κατάλληλου προνυμφοκτόνου εντομοκτόνου. Στην περίπτωση που επιλεγεί η χρήση ωοκτόνου εντομοκτόνου ο ψεκασμός θα πρέπει να πραγματοποιηθεί 2-3 ημέρες νωρίτερα αντίστοιχα, ακολουθώντας σε κάθε περίπτωση, λόγω και της πολυπλοκότητας του θέματος, πιστά τις οδηγίες της συνταγογράφησης που παρέχει ο αρμόδιος για αυτήν, γεωπόνος. Ο ψεκασμός, ανάλογα με το χρόνο συγκομιδής δύναται να επαναληφθεί μετά μία εβδομάδα, (κατά μέσο όρο).



Τονίζεται, επίσης, ότι λόγω της χρονικής εγγύτητας με την ωρίμανση και συγκομιδή των σταφυλιών οφείλεται να αποδίδεται ακόμη υψηλότερη προσοχή στο χρονικό όριο ημερών τελευταίας εφαρμογής κάθε σκευάσματος πριν την συγκομιδή (phi) και έτσι συνιστάται να χρησιμοποιούνται σκευάσματα

μικρής υπολειμματικής διάρκειας ή / και εντομοκτόνα με βάση τον βάκιλο θουριγγίας (*Bacillus thuringiensis*). Συνιστάται, επίσης, ο ψεκασμός κατά της ευδεμίδας, αυτή την εποχή, να κατευθύνεται μόνο στην ζώνη των σταφυλιών και να λαμβάνεται μέριμνα για την καλή κάλυψη αυτών.

Βοτρύτης (*Botrytis cinerea*)

Συνιστάται διενέργεια ψεκασμού μόνο όπου σημειωθεί προσβολή.

Όξινη σήψη (Σακχαρομύκητες και βακτήρια)

Συνιστάται μόνο σε περίπτωση εκδήλωσης της προσβολής και όχι προληπτικά, να διενεργείται, καθαρισμός των προσβεβλημένων ραγών και ψεκασμός με ένα κατάλληλο εντομοκτόνο.

Επιπλέον είναι απαραίτητο όλοι οι αμπελουργοί να καταβάλλουν κάθε δυνατή προσπάθεια έτσι ώστε:

- όλα τα παραγόμενα σταφύλια να μην έχουν καμία επιβάρυνση από δραστικές ουσίες σκευασμάτων φυτοπροστατευτικών προϊόντων πέραν των ορίων που προβλέπει η νομοθεσία,
- να τηρούν όσα προβλέπονται από τις προαιρετικές πιστοποιήσεις, οι οποίες κατά περίπτωση υλοποιούνται - &
- να καταπολεμούν, σύμφωνα με τις παρεχόμενες οδηγίες, τα παθογόνα των ασθενειών και τους εχθρούς ώστε τα παραγόμενα (επιτραπέζια) σταφύλια να παρέχουν την καλύτερη δυνατή εικόνα προς τους καταναλωτές.

Οι καλλιεργητές μπορούν να συμβουλευούνται για τα εγκεκριμένα φυτοπροστατευτικά προϊόντα ανά καλλιέργεια και παθογόνο την ηλεκτρονική διεύθυνση του Υπ.Α.Α.Τ.

http://www.minagric.gr/syspest/syspest_bfuncs_crops.aspx



Αποστολή του δελτίου στην ηλεκτρονική διεύθυνση των ενδιαφερομένων μπορεί να γίνει μετά από αίτημα τους στις ηλεκτρονικές διευθύνσεις dpyrgiotou@minagric.gr, thmarkopoulos@minagric.gr, thgeorgiadou@minagric.gr,

Το παρόν δελτίο αναρτάται στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων

www.minagric.gr



ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ



Το παρόν δελτίο παρέχεται και διά μέσω της εφαρμογής **i-agric** του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων για κινητά τηλέφωνα.

Η Προϊσταμένη Τμήματος

Μαρία Ηλιάδου